

Claudii Gal. Pergameni de Locis Patientibus Libri Sex, cum Scholiis Francisci Vallesii Couarruuiani, in Schola Complutensi professoris publici.

Libreria del Dr Chinchilla

LVGDVNI,

Per CLAVDIVM Pontanum Typographum. Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.



Veneunt Compluti apud Ludouicum Gutierrez Bibliopolam.

*Holero in Cura apoplexy ait: potest aut esse
depletio humorum & tunc erit manifesti p[ro]p[ri]et[us]
ut in i[st]o p[er] Venere in modum p[er]m[an]ens v[er]um
q[uod] in Coitu multu[m] spiritus Vitalis expendit*

Illustrissimo ac Re-
 VERENDISSIMO PRAE-
 fuli domino Francisco Mendocio Cardi-
 nali, & Episcopo Burgenfi, Franciscus Va-
 lesius perpetuam fœlicitatem.



VULTI, mihi Cardinalis illustrissime,
 tuas insignes laudes retulerant, & te
 magno ingenio, singulariq; cruditione
 esse dixerāt atq; vttalē virū in clarissi-
 ma domo natū decet, studiosorū omniū
 benignissimū mœcenatem. Quæ fama
 magnam de te opinionem concipere fecerat, & animum
 meum tibi magnopere conciliauerat, verum cum anno su-
 periori Burgis me acersiri, ignotum hominem, eo solum a-
 nimo quo in studiosos omnes esse soles, iussisti, excepistiq;
 benignissime, facile intellexi, opinionem quam concepe-
 ram, tuis veris laudibus esse inferiorem. Nam cū multa
 me de nostra academia esses percontatus, de veteri aca-
 demici, & ratione studendi incidit sermo, atq; tu tam do-
 ctē & acriter disputasti, tam constanti memoria multa ad-
 rem spectantia retulisti, vt me ingenij doctrinæq; tuæ, &
 facundie admiratio cœperit. Subijt statim in animum nul-
 lum esse cui, si quod alios libros (edideram enim iam tunc
 libros controuersiarum) in lucem essem emissurus, melius
 dicari possent, vt in viri imaginibus maiorum, & digni-
 tate

ate, & rebus gestis illustrissimi, simulq; doctissimi appa-
reret. Quæ enim ornamenta in mæcenate desiderari possunt
quæ in te non sint cumulatißima? certe quæ de tuis ma-
ioribus, & tuæ dignitatis amplitudine dici possunt, igno-
rat nemo: quæ de rebus strenuè gestis & Romæ & in Hi-
spaña leget posteritas apud multos historiographos. Ta-
men nõ possum tacere eo studio te semper incubuisse Latino,
Græco et Hebraico sermoni, et vtriq; iuri, ac postremò sa-
cris literis ut id præstiteris, quod haud scio an alius præsti-
terit, non eorũ solum qui tibi sunt fortuna pares (tales. N-
citò solent labori parcere) sed ne aliorũ quidem, tam assi-
duam operam, tantum in laboribus perseuerantium, ut
cùm Salmantica multos annos studuisses felicissimè, atq;
magnam iuris peritiam esses affecutus, cui tu Latinum &
Græcum sermonẽ (quod illis præcipuè tẽporibus erat ra-
rissimũ) adiunxeras, cũq; iam Episcopus Goriensi ecclesiæ
præ esses, præter multos alios viros doctos quos alebas
singulis annis, cùm studia vacant, Alfonso Zamoram
qui Hebraicæ linguæ erat eo tempore Compluti prima-
rius professor ad te vocares, retineresq; magna mercede
eam linguam discendi cupidus, utpote quam ad sacras li-
teras necessariam esse intelligebas, quæ in discendo dili-
gentia, viri, ingerendo iam episcopatum occupatißimi. mul-
torum memoria adhuc in Complutensi hac academia cele-
bratur. Adiunxisti itaq; tuæ variæ literaturæ sermonem
Hebraicum, atq; his omnibus adiumentis tantos in sacris li-
teris fecisti profectus, ut omnia priora studia superaue-
ris. Quid ergo non debent tibi studiosi omnes, quorũ tam
amantißimũ te semper præstitisti ut cùm omnes fere cri-

stianæ reip. prouincias, cùm Cæsaris, tùm etiã ecclesiæ ne=
 gotia agens peragraueris, visendi tantum viros doctos
 causa, profectus esse videreris. Accedit, quod me ma=
 gnopere deuincit, contigisse te, non sine magna eius fœ=
 licitate, meæ patriæ sanctissimum & diligentissimum E=
 piscopum. Ego illustrissimè Cardinalis satis intelligo
 quàm sit exiguum munusculum hoc, vt tibi sine
 rubore possit offerri, tamen si exiguum
 hoc qua soles benignitate receperis
 me ad maiora proculdubio ani=
 mabis, & vt modo habes,
 habebis semper de=
 uinctissimum.

Vale.

AD LECTOREM.

OPVS hoc de locis patientibus Galeni candidelētor, omnium eorum quæ ab illo viro scripta extant, mihi crede, est vtilissimum. Nam eam doctrinam continet quæ in arte est difficillima, dignitionem inquam internorum malorum, & quæ in alto corpore delitescent. Pars hæc artis non logica est aut ad contemplationem solum spectans, sed vere medica, & praxi admodum coniuncta. Tamen vt est vtilissima, ita & difficillima profectò. Nam desiderat anatomes peritiam & vsus omnium particularum, & morborum omnium ac simpt. differentias & causas & præter hæc, ipsa ratio dignoscendi partium internarum mala, est difficillima. Proinde ego cùm superioribus annis hoc opus enarrandum suscepissem, ita me comparaui vt nullius particulæ labores dicere aggrededer, quin illius formationem totam & ipse contemplerer & discipulis meis ob oculos ponerem, industria & opera cuiusdam Ximenij amicissimi mei qui nuper è Valētia complutum vt discifecandi artem cuius erat peritissimus profiteretur venerat, neque multò post hic agens vita defunctus est. Ille suam operam ponebat vt ego me discipulo'sque meos multum exercere possem. Ego reliqua addebam. & ea quæ in relectionibus notatu digna aut saltem ad rem necessaria videbantur

fuis locis notabam, ex quibus hæc scholia excapi,
 satis elaborata atque in codice latino ex versione
 Copi, quæ mihi forte fortuna erat ad manus, Græ-
 cos codices consulens innumera loca emendaui,
 vt possis certo scire hunc quem Latinum do-
 vere esse Galenum. Tu difficillimum o-
 pus & apri-^{mè} necessarium ne con-
 temne, sed amice recipe, &
 frueri, & laborem
 meum boni
 consule.



¶ EMANVELIS PHAVORINI MEDICI
 Galli Epigramma. A. D. Franciscum
 Valesium Doctorem Medicum
 celeberrimum.

*Corporis affectus varios, morbosq; latentes,
 Ingenij tanta dexteritate doces.
 Sic varios nodos, medicesq; anigmata soluis,
 Sic veterum scriptis dogmata vera probas.
 Vt nisi conscripta hæc à te fateare Valesi,
 Iurarim antiquos surripuisse tibi.*

P R O E M I V M.



VANDO QUIDEM opus hoc Gal. (quod de locis affectis à plerisque nuncupatur) vtilissimum est, & ad curationem apprimè necessarium : visum est, ita discipulis efflagitantibus, non prætereundum sine aliqua enarratione. Sed quoniam longissimum etiam est, & minime obscurum, non videntur sine multo legentium tedio & nullo commodo integra commentaria illi cumulari posse. Proinde ab in vtili labore me subtrahens, studiosos volens iuuare haud quaquam onerare. Decreui, reliquis dimissis necessaria solum ad locorum quorundam perspicuitatem scholia ex meis relectionibus eximere, & in hunc librum reponere, atque capita quibundam relectiunculis distinguere, & interim quæ in versionibus copi & aliorum quæ circum

8 DE LOC. PATI. G. CVM SCHOL.
feruntur corrupta sunt, restituere. Nam hac
ratione opus euadet breuissimum, & nulla
alia possit euadere utiliùs, quantumuis ego
scribendo, & alii legendo, conficiamur.

CAP. I.

Relectiuncula.

*Primum omnium dicit Gal. quos soleant medici locos
appellare, commendatq; praesens opus, ut ad curationem uti-
lissimum, & dicit quae sint ad illud necessaria, nempe scire
usus particularum, & anatomen. Deinde refert. 4. modos
cognoscendi patientem locum. Primum ab essentiae proprie-
tate. 2. ab his quae in particula aliqua continentur, naturali-
ter. 3. ab adnatis patienti loco. 4. ab his quae praeter natu-
ram in parte generantur occasione huius 4. modi. Mentio-
nem facit quarundam questionum ab Archigene in lib. quos
de patientibus locis ante Gal. ediderat, discussarum. An
particula in qua praeter naturam aliquid continetur, ut la-
pis in vesiqua, patiat: an ipsa nihil patiente, ledatur nihi-
lominus actio & an actio ledatur cum à lapide supprimi-
tur vrina, an non ledatur, sed impediatur. Verum has quae-
stiones logicas esse dicit, & nihil ad curationem facientes.
Quod ut monstret, ponit puero cuidam suppressam esse va-
rinam, exercetq; deinde lectores persistens in eadem hy-
pothesi, & inuestigans causas per signa, interimq; docens
modum curationis. Tandem inquit. 2. questionem pro-
pius accedere ad hanc tractationem.*

Non

NON solum recentiores medici sed
 veterum quoque non pauci corpo-
 ris particulas locos nominare con-
 sueuerunt, ac quam diligentissimè affectus
 ipsis euenire solitos dignoscere studuerunt,
 quia pro locorū differentia curationē quo-
 q̃ mutari contingit. Sed quā uilis ad cu-
 rationē sit huiusmodi notitia eo lib. quē de
 curandi ratione scripsimus, videre est. nunc
 autem solūm quomodo aliquis cognosce-
 re poscit patientes particulas constitutum
 est speculari. Ergo partes in superficie con-
 stitutæ vna cum suarum passionum specie
 facile sensibus deprehendūtur, quæ vero in
 primo corpore latent, exercitatæ cognitio-
 nis virum desiderāt, cū in practicis actio-
 nibus, & utilitatibus tūm vel maxime in ea
 quæ hæc præcedit, corporum dissectione,

*apud
 ad loci affectu
 filia ad curatio-
 nem necessaria est
 quæ pro corpore
 ventis uariationem
 curari contingit*

*ad loci affectu
 ad curatio-
 nem necessaria
 est curatio*

locorum

utilitas

an affectu

SCHOLIUM.

DO CET ipsemet Gal. libello de differentia
 morborum nomina hæc *πάθος* & *πράγμα* la-

10 DE LOCIS PATIEN. CUN SCHO
tine passio: & hæc παθῶν id est pati, & παθόντα id
est patientia, & πεπονθῶτα id est perpeſſa, aut qua
passa sunt: cum eis exacte utimur significare affe-
ctionem que fit, ut distinguitur ab affectu: quæ di-
ctio permanentem iam significat qualitatem. cum
vero minus exacte eis utimur significare omne ge-
nus rei quæ præter naturam in nobis consistit, siue
sit passio siue affectus. hoc secundo modo. utitur
hic nominibus, cum de patientibus aut de perpeſ-
sis locis scribit: & cum inquit quomodo aliquis pa-
tientes particulas possit dignoscere, constitutum
est considerare. non. N. opus præsens est de solis
partibus quæ patiuntur, affectæ autem non sunt sed
& de patientibus & de male affectis, atq; proinde
censeo Gal. in lib. titulo non participio præsentis
sed præteriti vsum esse, dicentem non πρὶ παθόν-
των, sed πρὶ πεπονθότων. quia omnis affectus na-
scitur ex passione, & quod modo male affectum est
prius subiit passionem. Ergo locus, & pars, & parti-
cula, & membrum, hoc loco eandem rem signifi-
cant.

*Stat q. equis
e. a. h. m. n. e. c. c.
ria. f. i. t. a. d. i. c. i. a.
in. a. p. p. o. r. i. o. n. e. m.
ad. e. t. e. s. s. e. n. t. i. a.
r. u. d. i. c. a. t. e. m.*

QUIPPE hæc nos docuit cum a-
lia per multa, tum cuiuslibet partis
essentiæ proprietatem. Nam quæ
in pulmonibus sunt asperæ arteriæ, corpo-
re quodam constant cartilagineo (Græci

Βρονχία

βρογχίον appellant) cuius proprietatem huiusmodi taxat qui ipsum viderunt cognoscere possunt. Si aliquando tussiendo spuatur, maximum vlcus vel ab erosione, vel putredine, in pulmone esse existimamus. Quamquam. N. inter pharyngem & pulmonem eiusmodi naturæ corpus per totum columnum pertinet, tam grandis tamen ulceratio in ipso haud quanquam fieri potest : quin prius mors animal præoccupet. in pulmone vero talis fieri potest, ut pote qui ob humiditatem & facile putrescere, & a vitiosis humoribus promptè erodi cōsuevit : adde quòd bronchia in ipso exigua admodum sint. Quocirca pars ipsorum putrescere non potest, quimpotius totum bronchium reiici necesse est : membranosis vinculis, quæ ipsum cum aliis coniungunt, à sua cōtinuitate exolutis, quæ ipsis bronchiis multo celerius patiuntur. hæc. N. & cartilaginea, & dura & crassa sunt, membranæ vero quæ

quæ ipsa coniungunt, tenues & infirmæ

*et qd dicit mag
ni tubinem cu
pofa dicit multa
exempla*

Quinetiam frustrum quoddâ vasis haud
ita, paruum tussiendo reici vidimus, quod
expulmone fuisse deductum plane intelli-
gebant dissectoriæ artis non imperiti pro-
fessores quotquot. N. ad asperam arteri-
in collo perueniūt vasa omnia capillorum
fere speciem referunt. Proinde non solum
essentiæ proprietas sed magnitudo quoq;
sepenumero affectum locum haud obscu-
rè indicare potest sic. N. cū intestini, tuni-
cam per dysenteriam deiectam conspex-
ris, sitq; & latitudine & crassitudine iis quæ
tenuia cōstituunt, multo maior, non abs-
coniciēs vlcerationem increasis intestini
consistere. Ita cum adolescentulum tussien-
do tunicam vilcosam crassâq; reicere vide-
remus, coniecimus eam ex interna summa
gutturis parte, que etiam ligulam (Græci
γλωττίδα vocant) cōstituit, fuisse resolutam,
ac sanatus est adolescentulus, quamuis id

*impla esse pro
statif*

non admodum speraremus, mansit tamen
 vox vitata. Præterea per essentiæ proprie-
 tatem à vesicæ vlceribus ea quæ in renibus
 consistunt distingui possunt. Scripsit. N. in
 Aphorismis, Hypp. Si ea quæ cum vrinis
 excernuntur lammæ speciem referunt,
 à vesicæ vlcus esse scire licet: si vero carun-
 culis similia sint, id erit in renibus.

*ut hoc exemplum ad-
 cit ut p. 2. h. g. m. m.
 anatomicæ h. g. m. m.
 essentia proprietate*

SCHOLIUM.

VBI INQVIT Ga. quanquã. N. inter pharyn-
 ga & pulmonem eius modi naturæ corpus per
 totum collum pertinet, censent pleriq; cum quibus
 Leonhartus Fuchsius aut vitiatum esse codicem
 Græcum, aut Gal. locutum esse ambiguit: legendūq;
 esse, inter fauces & pulmonem, quia hæc lectio
 interpharinga & pulmonem est corpus cartilagi-
 neum, vult significare pharynga ipsum nō esse car-
 tilagineum, quod tamē falsum est. Itaq; cum fauces
 sint interprete ipso Gal. 4. Aph. 34. Partes ipsius
 oris quæ inter larynga & gulam sunt, inter quas &
 pulmo, est etiam ipse larynx, videtur illis melior
 ea lectio sed ego non video quid opus sit sua ani-
 maduersione. Nam intelligi potest inter pharinka
 & pulmonem est tale corpus, non exclusis terminis.

Nam

Nam & in ipso pulmone sunt tales cartilagines quam dicitur inter pulmonem & fauces. Adde verba hæc istius modi, naturæ corpus, referre bronchion, bronchion vero appellari non quascunque cartilagines, sed annulos illos non integros quales in reliqua arteria sunt, non tamen in larynge hic. N. ex tribus cartilaginibus constat, alterius figura & aliter compactis, vt licet tibi videre apud Gal. 7. de usu partium cap. 11. Quod si ita intelligi non placet, constat multis in locis Gal. & Hypp. hoc nomen pharynx, quo hic vtitur, non significare idem quod larynx, sed fauces. 3. pro Ga. com. 18. Ita scriptum est, ὅτι φάρυγγα τῷ προκειμένῳ χώρῳ σωμαίου τὸ καὶ λάρυγγος ὀνομάζει διήλθεσι. Id est constat illum pharinga vocare partem quæ est inter gulam & laryngem. Ergo vbi nos legimus γλωττίδα Græci vocant, in codice græco habetur ἐπιγλωττίδα, sed nō est dubium corruptum illum esse, legendumq; hic γλωττίδα nam à Gal. appellari solet γλωττίς pellicula quædam quæ intra laryngem est proprium vocis instrumentum. ἐπίγλωττίς vero operculum quoddam laryngis, quod illi de super incumbit & ad radicem linguæ nascitur. Atqui quæ de substantia & usu eius quæ ab illo dicitur γλωττίς scripsit, quadrant quam maximè cum ea particula, quam iuuenis præsentis hystoriæ reiecit, cōtra quæ de seu & substantia & usu epiglottidis scripsit minime quadrant. Nam cap. 13. libr. 7. de usu partium ita habetur. Glottidis corpus membranofum extitit

it humidum autem est, simulq; viscosum & pin-
 guæ. cap. 10. eiusdem libr. idem docetur. cap. etiam
 huius primi de locis patientibus ita occurret scri-
 ptum. Est præterea in gutture summo glottis hæc,
 proprium vocis instrumentum. Verum epiglottis
 cap. 17. lib. 7. de usu partium alius est scriptus, &
 usus & substantiæ modus. est. N. extrinsecus in par-
 tibus oris, quare minime opus erat tussî vt expuere
 tur, si semel esset excissa tamē hic iuuenis tussien-
 do reiecit. Confert epiglottis ne, cibus & potus eat
 in asperam arteriam haud quaquam ad vocem,
 nam ex dicto Gal. loco constat, hanc inter loquen-
 dum stare rectam, quare quamquam eiecta esset,
 vox non multum esset vitata, sed si quid, sermo po-
 tius. Est præterea rotunda & cartilaginea, minime
 tamen viscosa, qualem dixit esse glottidem, & qua-
 lem dicit reiecisse adolescentulū. Itaq; legendū hic
 est vt nos legimus. Ergo affirmat hoc loco Gal. ex
 mixtis carunculis cognosci per substantiæ proprie-
 tatem vlcus renum, tamen negat. 4. part. aph. com.
 76. vidisse se affectionem per quam mingantur ca-
 runculis similia, quæ renum substantiæ partes sint,
 sed ea inquit esse sedimentū orobinū ex assato san-
 guine factū, quod si est, cōstat cognitionē sedis affe-
 ctæ quæ per illa fit non esse ea substantiæ proprie-
 tate, sed potius ex his quæ in loco aliquo præter na-
 turam continentur: quem locum referet statim
 ordine quartum: quare haud scio an hic Gal. obli-
 tus sit eorum quæ illic negavit se vidisse, an modo
 contra-

contrarium opinetur. an ex Hypp. sententia exemplum hoc acceperit. ego. N. haud quaquam sententia in opinabile, fieri posse, vt renis ipsius frustrula mingatur quandoquidē in hominum renibus videre licet quasdam carunculas, partim substantiæ ipsorum renum, partim adenibus similes, erumpentes, in secundum sinum, per quas vrina percolatur possunt ergo eæ carunculæ à percolanda vrina corrodæ cum ea prodire.

*de cat. contentis
22. m. h. r. a. m.*

NEq̃ non à rebus in particulis quibusdam contentis creberrime sedes affecta deprehenditur, nam Mytylenis adolescens quidam secundum sedem vulneratus gladio, vulnere satis profundo tribus primis diebus neq̃ cibum neq̃ potum ingessit: quarta vero die, adhibitis prius remediis cibum sumpsit, ac bibit quoq̃: deinde occidente sole iterum adhibita curatione vrinæ quatuor fere cotylas per vulnus excreuit, cum antea ex quo vulneratus erat nil vrinæ reddidisset: tum vero ab onere, quo circa pubem grauabatur se perfectè liberatum esse dixit. Itaq̃ proculdubio constabat

stabat vesicam fuisse vulneratam. Quem-
admodum vbi sterco per vulnus excerni-
tur intestinorum alicui vulnus esse illatum
haud dubium est. Sic etiam cum cibus egre-
ditur in ventriculo vulnus esse manifestum
est. Iam, ortum supra in guina tuberculum
ac suppuratū, cum medicus incideret, ster-
cus subsecutū in colo abscessum esse decla-
rauit. Atq; in hoc genere continetur, spiri-
tus efflatus vulnerato thorace, & sanguis
ab arteria profluens. Nam cum interdum
vulneratum corpus sensu deprehendi non
potest, exactam ab his consequimur noti-
ciam. Ergo vt ex thorace efflatus inter res-
pirandum spiritus, membranam costas suc-
cingentem vulneratam esse significat. Ita
sanguis saliendo eiectus, arteriam. Sed &
ceteris protinus, eo qui exrenis erumpit & ca-
pidior, & tenuiorum partium, & flauior ef-
flic dignoscitur. at veluti horum non incer-
tæ sunt notæ sic eodem modo, si aliquan-
do

do omentum, aut intestinorum aliquod excidere per vulnus videatur, peritoneum, mēbranam, aluū, & intestina omnia amplectentem discissam esse nemo ambigere debet. Si vero pulmonis aliquis apex extremam sui partem à vulnere excernere videatur, thoracem confossum esse ostendit. Atqui nil refert siue succingentem mēbranam vulneratam, siue thoracem confossum, esse dixeris.

SCHOLIV M.

*hemina caput
cy mētras.*
PLERIQUE vbi Gal. inquit cotylas vertunt in heminas non tamen sine errore. Nā hemina est nomen mensuræ Italicæ, quæ continebat alteram partē sextarij Romani, proindeq; capiebat decem vncias. quòd vero cum cotylæ dicit Gal. intelligi vellit atticam capientem nouem vncias, intelligi ex his quæ ab eodem scripta sunt primo de comp. medic. secundum genera. cap. 18. quæ habent hō modo olei cotylas tres. Atticas puto ipsum scribere, aut certe scripsisset libras. Vides vt Gal. docet, cum cotylas dicitur intelligi debere atticas. *Attica attico*

lem verò atticam continere nouem vncias dixit

statim

statim eodem loco his verbis. Ex multis pharmacis quondam conscriptis priusquam romanorum res eo potentiae creuissent conieci, quam illi vocarent cotylem esse æqualem vncijs nouem libræ Romanæ hodiernæ. Itaq; vbi Gal. scribit *κοτύλην*, melius erit seruari nomen Græcū transcribiq; cotylem, quam pro illo nomen mensuræ non exacte respondentis substitui, aut si latina dictione uti vis dic heminam atticam ut significetur altera pars sextarij attici qui capit vncias. 18. hic ergo ita dicendum est, adolescentem reieciſſe vrinæ quatuor ferè cotylas, aut quatuor fere heminas atticas. Nam præter dicta haud parum est minxisse fere. 36. vncias tribus diebus quibus præcipuè neq; potum sum pſerat, quinta maiores intelligas mensuras. Verū hæc quæ ad mensuras & pondera attinent a Geor-
et Laurentius Gal. de ponderibus petri in iurisdisputat

gio agricola vellem peti, nullus. N. quantum ego intelligo eruditius aut diligentius de illis scripsit. Ergo vbi nos legimus tuberculū legit Copus pannū tamen fallitur nam Græcā habetur *φύμα*, & Cornelius Celsus, a quo responsus latinarum dictionum cum Græcis peti debet, lib. 5. cap. 28. *φύμα* reddit tuberculum *φυγέθλον* panem aut panum. Neq; verò indifferens est ita aut aliter dicere: nomina. N. sunt diuersorum tumorum. Nam quanquam omnia hæc bubon, phyma & phygethlon, nomina sunt tumorum glandularum dicente ipso Gal. cap. 1. lib. 2. de ratione curandi ad Clauconē, tamen diuersa tumorū species sunt: quas Celsus dicto loco distinguit.

Nimirum phygethlon est tumor quidam in inguinibus oboriri solitus dimidij oui magnitudinem non excedens habensq; crustam quandam panis similem. Phyma crustam non habet & plerunq; patet latius. Solet etiam phyma vniuersim accipi pro quocunq; tumore præter naturam atq; ita tuberculum latine & Hispanice nascido. Itaq; legi debet tuberculum. Sed qua ratione ex tuberculo suppurato & inciso stercus subsecutum abscessum esse in colo declarauit? An non potuit esse in recto intestino aut ceco (omnino. N. in intestinorum aliquo esse erat necessarium) videtur sanè cum cecum intestinum vsq; ad inferiora pertingat, occupans in ilio dextro totam eam regionem quam ren dexter vt pote superior reliquerat vacuam. Docet Gal. lib. 6. huius operis cap. 2. & 4. de vñ partium cap. vltimo. Verum Gal. videtur meritò malum illud in colū reieciſſe, quia vt videbimus cap. citato. 6. lib. colum circum voluitur atq; ad superiores reuertitur partes, & ambo ilia præter vehitur, ita vt hac causa dolores ad quamcunq; ventris inferni partem pertineant probabiliter in colum reijciantur. Accedit quod imminet alijs intestinis cæco inquam & recto, id est habet anteriorem sedē & seipſo peritoneo occurrit ante ilia, quare causa huius situs coniectandum est suppurationem habuisse in colo eū, cui incisum erat suppuratum tuberculum. Quamquam video te iam dicere hoc argumentum non esse ab eo quod in particula naturaliter cōtinetur, sed

sed à partis situ tamen respondeo, cognouisse Gal.
aliquod intestinorum fuisse perforatum ab eo quod
in parte continetur, tamen vt cognosceret, quod
esset illud intestinũ accessisse argumētũ à situ. Quã-
quam accedit dictis ratio alia cognoscendi colum
tuisse perforatum, nimirum stercus subsecutum es-
se, idq; iam à cibis enim separatũ valde, talen. nō est
ante colum. Nam in cæco nondum est tam exucce.
Itaq; iam idem argumentum docuit affectum esse
intestinum, & quod intestinum. Ergo dictũ est san-
guinem arteriarum continuo esse calidorem & te-
nuiorum partium & magis flauum, videtur hinc
fieri vt & magis biliosus sit, nam hæc ipsa sunt bi-
liosi sanguinis indicia, quare recte cōiecerit Auic.
Pulmonem vt potè qui à corde accipit tenuem
sanguinem ad nutritionem calidum & siccum esse
ac biliosum, cū particula quæuis habeat nutri-
mento suo similem naturam. Hac de re diffusè satis
disputauimus primo lib. controuersiarum mōstran-
tes pulmonem esse membrum per se humidum, mo-
do illud vnum dicimus sanguinem arteriarum om-
nium minime esse biliosum nam est purissimus san-
guis verò biliosus prauus est & excremēto plenus,
& qui eo abundat est cacochimus. Quare male iam
gratiā rependere cor pulmoni, vt dicitur. 6. de
vsu part. pro aëre respirationis præstans biliosum
alimentum: non est itaq; talis sed purissimus à bile
vtraq; secretissimus & cum minima pituita vt po-
tè optimè concoctus proinde calidior est, quia sci-

licet magis concoctus, est quam alius sanguis, & quia multo spiritu substantia calidissima admixtus est. Eadem ratione tenuior (est. N. spiritus tenuissimus, & quia à crassis facibus est expurgatissimus, hæc eadem causa est qua magis flauus dicitur: non quidem verè est flauus quod cum flauo aliquo succo permixtus sit sed flauus videtur, quia splendens rubedo flauiciei præstat quandam phantasiā: maxime cum accedit causa aliqua speciem candoris solens efficere: nam ex albo & rubro species flauiciei prodit, talis causa est flatus aut substantia spirituosā cum succo permixta: Nam ita aquæ substantiæ alioqui de coloris spuma alba videtur. Ita inquit Plato in dialogo de natura pituitam ex quocunq; cibo albam fieri. Itaq; sanguis per se ruber est & splendens multi spiritus admixtione flauiciei quodammodo imitatur.

*Scet adnata
in huiusmodi
autem cum
in huiusmodi
f.*

IAM vero ex iis etiam quæ adnascuntur rebus affectæ sedis notæ petuntur.

Quippe res adnascētes essentiæ proprietatem obtinent, quemadmodum fungi, si fracto capite, meninx læsa fuerit, atq; rursus alia proprietas conspicitur esse particulæ cuiuspiam vitiatæ. Huius præterea generis est crustula quædam (ἐφελκίς Græce vocatur)

tur) quæ eius particulæ à qua excerni videtur vlcus portendit. Vt meatuum vrinæ, si cum vrina spiritualium instrumentorū, si tuſſiendo, gulæ ac ventriculi, si vomendo excernatur. Quemadmodum si cum alui excremētis deiicitur, intestinorum aliquod vlcus esse significat.

SCHOLIUM.

FUNGVS vt docet Gal. 3. epidemicon part. 3. com. 49. non est tantum qui ex vulnerata meninge pullulat vt videtur hic innuere, sed omnis excreſcentia, quæ materiæ craſſitudine in quacunque parte vulnerata fit. Cū verò confractum est caput si quis fracto craneo extuberat fungus, certum est ex vulnerata menynge esse. Nam ex vitiatō offe alia proprietas conſpicitur: nimirum generatur callus siue por⁹. Ergo vbi dicitur ἐφελκίς melius vertit Copus quem ego hac in parte secutus sum, crustula quædam, quam Fuchsius qui vertit ramentum: nam quanquam nomen ἐφελκίς vtrunq; significet, quia vtrunq; ex vlcere abraditur, tamen ramentum quod fit, cū exulceratur primū particula, quæ neq; super crescentem carnem neq; extuberantiam aliquam habebat, non significat male affectam sedem quia adnatum, sed primo modo, id est,

24 DE LOC. PAT. G. CVM SCHO.
ob essentię proprietatem. Itaq; hunc locum non intellexit Fuchsius in quo tamen mire se exercuit.

*dictum de pro
nre possunt q; per
e aut yllam e
nem ex ueris
præter natura
partibus contenta*
EST præterea ex indiciis quibusdam
alius noticiæ modus, quum videlicet in
alieno loco aliquid præter naturā con
tinetur ut in renibus aut vesica lapis, aut
pus in thorace, aut sanguinis grumus ubi
cunq; contineatur, aut alius quidam succus
molestus in animalis corpore genitus, aut
extrinsecus ei adueniens. Vnde iuniorum
medicorum complures quæstionem ad
medicę artis opera nil conferentem sed dia
lecticam potius habentem contemplatio
nem mouere solent. Vtrum huiusmo
*necht 20m par
capitis*
di res in nobis præter naturam genitæ ex
affectis sint sedibus an loco nequaquam af
fecto animal à causa præter naturam patia
tur, sed quod inutilis ut dixi sit huiusmodi,
quæstio cognitu facile est: si quis sit in arte
notarum vltus cognoueris. Subiiciamus er
capitis
go aliquem tribus diebus nil vrinæ reddi
disse

gandorum discere sit. Ergo exempli gratia

tumor aliquis in pube, satis euidenter in c

cunscriptioe vesicam impletam esse oste

dens, nilq; excernatur nunquid plane con

stat, aut excretoriam vrinae actionē necess

riore solutam, aut vrinae fistulam esse con

stipatā. In primis ergo id considerandū est

num fieri potuerit vt resolutae facultati

nomine id acciderit: si prius meminerimus

quomodo per bonam valetudinem volen

tibus nobis vrina excernatur muscolum. re

ficae ceruicē circundantē ab actione quic

scit, fungente tunc vesica suo munere mus

culi aut actio voluntatis nostrae imperium

imitatur at vesica naturaliter agens volun

tati haud quaquam obedit, nam in com

mentariis de naturalibus facultatibus iam

declaratum est, in omnibus ferē corporis

particulis esse vim qua excrementa secer

nantur, haec quanquam semper ipsis acci

dit non tamen vtuntur ea nisi cū vrgentur

excre-

ut fumentes
ica seu impletam
in vno et autno
accidit in adu
nta set manibz
reditur, na sen ex
ermitet hoc m to
significat de uita
em expultrici
aut n nec man
et compressa exar
at congesta
vine fistulam fig
ficat
vtrat galium qua
fit quid sit flexu
et quando congti
to fistula

ius autem nobis
p. cat quo yu n
uolenti huius
excer nati

Semper datur
vlio, vni q
ante vrgent
excrementis.

excrementis: quæ si aliquando fuerit, affe-
cta fieri potest, ut vrina supprimatur. Ve-
rum si hominem ita figuraueris ut decli-
uis sit ceruicis vesicæ positus, ac mani-
bus tumorem præter naturam compresse-
ris, expelletur vrina. Quod si ita nil profe-
ceris à causâ qua resoluta vis esse putabatur
deliste. Atq; vrinæ fistulam constipatam
esse suspicari oportet, ipse musculus ei
circundatus si resoluatur ipse nõ cohibet
sed præter voluntatem emissæ vrinæ cau-
sa est.

*si vesica inquit
facta de huiusmodi
materia qd in prope red
est de uisibilibus
hinc*

*si compressa non
dat fistulam vrina
ria exstinguitur
et hinc non hinc
rum aut*

SCHOLIUM.

CAUTE admodum Gal. docens modum quo
mictio fit per bonam valetudinem dixit. Non
quidem musculum qui prius constringebat dilata-
li, & Vesicam ipsam constringi, sed vesicam mune-
re suo fungi, idest expellere, & musculum cessare.
Nimirum dilatio musculi non est eius actio, sed
inflatio, dilatatur nempe, non quod facultate sese
dilatat, sed qd facultas à constringendo desistat. Nul-
lus namq; musculo possunt inesse duo contrarii mo-
us, sed vnicus, versus radicem. Tamen non sine
causa

28 DE LOC. PAT. G. CVM SCHO.
causa hærebit aliquis videns hoc loco Gal. dicen-
per mictum naturalem musculum circūdantem co-
uicem vesicę ab actione quiescere, cum idem auto-
s. de usu part. cap. vltimo dicat: hunc musculum
differre a musculo ani, quod non solum sit ad clau-
dendum comparatus, vt ille, sed potius vt contra-
ctus vndiq; depelleret quidquid in meatu contineretur, secundario autem vt ipsum etiam clauderet.

Itaq; hic musculus est protensus per colem ipsum
& habet fibras transuersas, cumque mictio fit la-
xat eas quę in ipso vesicę collo sunt, reliqui au-
tem iuuant cum vrinę impetum qui intrinsecus e-
icitatus inceptus q; est. Hic musculi motus facit v-
mictio non paulatim aut guttatim fieri, sed repen-
te, & continuato fluxu. Non itaq; cessat ab actio-
ne, vt hic docetur videtur dicendum, cum muscu-
li huius sint duo vsus, & duę actiones, (Quanquam
ambę aguntur eodem impetu, vt explicuimus) ali-
retentio, alia expulsio, ab illarum vna puta reten-
tione cessare musculum, aliam verò. hic Gal. Non
respexisse quandoquidem causas suppressę vrinę
erat propositum in vestigare. Motus autē ille quem
inter meiendum musculus habet, non facit quominus
vrina supprimatur, sed quominus mingatur pau-
latim. quia ergo. Vt vrina non supprimatur, sed red-
datur, latis est fēbras vesicę constringi, & muscu-
lum illum laxari, & si nil præterea moueretur (nam
musculus ille si resoluatur, non cohibet sed præ-
ter voluntatem emissę causa est) noluit hic motus
pressionem sequi. Vesicę clausurę

us quem. 5. de vſu partium dixit, meminiffe, ni-
rum vbiq; loquitur iuxta institutum. Ergo ſed
dixerit paulò poſt, monſtratum eſſe in commen-
ijs de facultatibus naturalibus, in omnibus ferè
poris particulis eſſe vim qua excrementa ſecer-
tur quorſum inquã adiecit diſtinctionem fere: cum
illa pars corporis fit, quæ alendi facultate non fit
edita, quam ſtatim vt habet, quatuor naturales
ultates, quarum vna expultrix eſt, neceſſe eſt ha-
at. Duorum alterum dicendum eſt. Aut recen-
i hic inter partes ea quoq; quæ noſtris corpori-
s adnaſcuntur excrementis genita, ſine facultate
rice ornatus aut vtilitatis gratia cuiuſmodi, bar-
& coma & extremi vngues (nã & ab Ariſt. in ope
de partibus animalium horum mentio fit) aut
c vim excreticem dici, non quamcunq; ſed eam
ntum, quæ operatur motu manifeſto talis. N. in
erisq; partibus eſt. Nam in ventriculo, vtero, inte-
nis, vtraq; veſica, hepate, liene, cerebro, corde,
ilmone, & venis omnibus atq; arterijs: non tamen
t in omnibus partibus: Neq; N. os aut ſimplex ca-
o manifeſtis motibus expellunt, ſed occultis. Ergo
oculdubio Gal. hic recēſens cauſas ſuppreſſæ vri-
æ vnā omiſit, quam lib. 6. cap. 4. addet, puta ſen-
um veſicæ reſolutum. Nam cum dictum hoc ipſo
loco ab eo ſit, membra non vt expultrice ante-
uam irritentur, conſtat perinde eſſe vim excreti-
em reſolui, aut ſenſum, quod attinet ad vrinę ſup-
reſſionem. cauſæ tamē ſunt ſatis diuerſæ. Nam vt
ipſe-

30 DE LOC. PATI. G. CVM SCHOL.
ipſemet lib. 6. dicet, accidit propter obtuſum ve-
cæ ſenſum vt non reddatur, vrina, citra tamen e-
pultriciſ facultatiſ læſionem, ſi proprij veſicæ ne-
ui afficiantur.

remore aliquo

ITAQVE quot modis contingat vri-
næ meatum ſtipari, deinceps conſideran-
dum eſt. Equidē tres in vniuerſū eſſe cen-
ſeo. Aut N. corpus ipſuſ in tantū tumorem
præter naturam attollitur, vt meatus inde
occupetur. / Aut aliquid ei præter naturam
vt vel caruncula vel calluſ innaſcitur. / Aut a-
re quapiā obſtruitur meatus. / Corpus ipſi-
uſ ad inſignem tumorem attollitur, ſi vel
inflammatione vel ſcirrho vel abſceſſu, vel
alio quouis tumore fuerit affectū. / In mea-
tu caro quidem oritur, ſi præceſſerit vlcuſ.
alia verō reſ lōgo temporis ſpatio ex craſ-
ſo lentōque ſucco paulatim naſci poteſt.
obſtruitur meatus vel à lapide vel grūmo,
vel purē vel craſſo lentōque ſucco. / Ergo
hæc omnia diſtinguere oportet. non ſolūm

Adnata re aliqua

et in herente

*more ut in fla-
tione. f.*

*adnata utſi adna-
ta caro. f.*

*herente re aliqua
+ lapide aut cū ur-
+ pure aut craſſo
ut ſi humore*

x præsentibus accidentibus, sed etiam ex ^{si hoc si in his reat}
 is quæ præterierunt. Age ergo subiicia ^{si hoc si in his reat}
 nus ut puer laboret, apparuerint verò an- ^{signa qd in}
 ea calculi indicia, ^{ut si urina ingruat}
 vrina quidem aquæ si- ^{dit}
 milis, in qua subsident sabulosa quædam, ^{si si dicitur pudendum}
 pse insuper assiduè pudendum scalpat, ^{si hoc si in his reat}
 dque vel laxum vel intentum præter ratio ^{preter rationem}
 nem postea vrina repentè supprimatur. ^{si urina repente}
 Nunquid optima ratione conieceris huic ^{si hoc si in his reat}
 alculum in vesicæ ceruicē me idisse: itaq; ^{si hoc si in his reat}
 upino figurato puero ut crura reliquo cor- ^{si hoc si in his reat}
 pore multò sint sublimiora, multifariam ^{si hoc si in his reat}
 psum cōcuties, hoc curans ut lapis ex mea- ^{si hoc si in his reat}
 u recedat, quibus peractis iube ut puer ^{si hoc si in his reat}
 rinam reddere tentet, id si bene succeffe- ^{si hoc si in his reat}
 rit, profluâtque vrina, præter exactam cau- ^{si hoc si in his reat}
 æ notitiam curationis quoq; modum in- ^{si hoc si in his reat}
 uenisse te haud dubia erit cōiectura. ^{si hoc si in his reat}
 Quod ^{si hoc si in his reat}
 i nihilominus vrina supprimitur, rursus cō- ^{si hoc si in his reat}
 ute sed vehementius atq; si sic quoq; per- ^{si hoc si in his reat}
 manserit, tunc demisso cathetere simul & ^{si hoc si in his reat}
 lapidem

lapidem à vesicæ ceruice repelles & urinam
 euocabis. At nulla calculi nota retentam v-
grummi in herat
lum significat
anguis est fluxu rubro
modum præcedens
grummi
 trinam præcedente si sanguis effluxerit, par-
 est, vt grummi vesicæ fistulam obstrueret,
 at fieri potest, vbi vlcerata est vesica, vt pau-
 latim in ipsa grummi concresecat, vel non
 præcedente sanguinis fluore. / Accidit au-
aut in præcedente
fluxu sanguinis in
ulcerata est vesica
in quibus reuertit
 tem vt sanguis è renibus per vtreteras in ve-
 sicam defluens grummi efficiat, atq; in
inest hanc ulcerati
line sanguis ab huius
fistula per urethram
in vesicam grummi
spituit
 huiusmodi coniecturis magnus est æneæ
 fistule vsus haud secus ac cum vel pus vel
 crassum lentumq; succum meatum obstru-
 xisse suspicamur. In huiusmodi verò con-
 iecturam ex præcedentium noticia hoc pa-
 cto inducemur. & N. siue vesica, siue re-
 nes, antea morbo aliquo laborauerint, per
 quem tale tantumq; pus colligi potuerit
 vt pars sit ab ipso meatum fuisse obstru-
 ctum, probabiliter conicies, hanc ob cau-
 sam urinam suppressam / aut si etiam in par-
uenit cum genit
 te aliqua renibus superiore fuerit abcessus

quo

ctum à grūmo, si ita contingerit aut lapide. At quærere vtrum male affectū esse meatū, an causam suppressę vrine in meatu continere dicendū sit, nil ad artē vtilitatis cōferre potest. Itaq; Archigenē satis mirari nō possum, quinō solūm in huiusmodi quęstionibus multus sit, verū etiam, de iisdem adeo obscurè scribat, vt intelligatur à nemine.

SCHOLIVM.

VIDETVR à Gal. missa quarta compressio-
nis viæ illius causa. Nam conuulso eo muscu-
lo qui volentibus nobis claudit, fiet inuoluntaria
conclusio, cū conuulsio sit inuoluntarius motus
similis voluntario, venientibus. scil. musculis præter
naturam ad eundem situm ad quem secundum na-
turam perueniebant, cap. 2. lib. 2. de causis sympto-
matum. Profectò videtur mihi hæc ratio firmissi-
ma proindeq; ego quartam hanc causam addide-
rim, nisi velis cōuulsionem ex siccitate huic muscu-
lo causa humiditatis loci, non posse accidere, aut
si quando accidat eam non repentē. Hicq; sermo-
nem esse de repente suppressa vrina. Cōuulsionem
verò. ex repletionē sub tumoribus præter natu-
ram intelligi, eo quòd succus membrum distendat.

Sed

Sed hoc quoq; videtur falsum, nam Gal. hic loquitur de tumore replente meatum, nil tamen prohibet succum incidere non in ipsum musculi caput prope vrinae viam, sed in nerui qui in illum inferitur exortum, vbi nihilominus conuellit muscolum, tumor verò viam nō comprimet. Itaq; fortasse fuerit melius quatuor causas recensere, Hancq; vt rarissimè contingentem putare fuisse à Gal. Prætermissam. Ergo lapis in vesica accidit crebrius pueris quàm adultis, vt ab Hyppo. dictum est. 6. cpidemicom part. 3. his verbis, post mictum, concretio in pueris magis. Proinde Gal. in Hypothesi præsentis puerum finxit laborantem. Ergo quòd quidem à renulæ ante lapidem mingantur nil est miri. concre- *nota* scit si quidem lapis ex arenulis. Vrina aquea prædit gratia obstructionum, quæ in angustis alioqui vijs sunt, dum lapis generatur. Neq; verò oblitus sum eorum quæ lib. 3. controuersiarum dixi, putà nullum succum posse colatura fieri re vera tenuiorem quàm antea. Neq; in hoc loco quicquam est illi sententiæ repugnans. Nam non idèò vrina aquæ similis apparet quòd serum ipsum reuera tenuius sit quàm cōsuevit, sed quòd cùm eo nil descendat eorum quæ sunt crassiora. Ergo pruritus his accidit, quia arenulæ & ipse lapis interius scalpant est illis pudendum, aut laxum prætermodum, aut prætermodum intentum, nunquàm vt in bona valetudine solet, quia cum arenulæ, & lapis mouentur, faciunt pruritum, pruritus facit sensum quendam lentiginis,

36 DE LOC. PAT. GAL. CVM SCHO.
nis, cum verò. hæc non fiunt, gratia ipsius morbi &
ponderis illius alieni, demissum prætermodum est
membrum, quæ ad curationem huius affectionis at-
tinent sunt loci huius.

*quæ app. mit. fuit
effluuine dñm
i. b. f. a. p. f. a. q. u.
d. i. t. p. r. o. p. t. e. r. h.
v. r. e. m. m. a. n. i. f. e. s. t.*

*na. n. p. s. f. m. t.
a. n. t. h. e. m. u. r. e.
x. a. h. a. c. d. o. l. o. r. e.
i. n. a. s. c. i. t. q. u. i.
e. s. t. c. a. u. s. a. c. o. n. t.
p. r. o. f. i. c. i. o. n. i. s.*

ERGO rursus propositū sermonem
esumentes consequētia tractemus quo
modo scilicet. Tum ex præcedentibus tū
præsentibus accidentibus causā cur vrina
reddi non possit deprehendatur. Percussus
ergo validè quidam in ea parte quæ semen
appellatur inflammatione sub orta in vulne-
re vrinam reddere nō potuit, ac vesica ipsa
vt pote plena manifestè secundum circun-
scriptionem intenta videbatur, huic ne irri-
taretur inflammatio æneam fistulam adhi-
bere noluius, sed aqua calida infusa oleo
per ungere satius esse putauimus cumq; tri-
bus horis sic eum tractassemus tumore nō
parum laxato ac dolore vt ipsemet fateba-
tur non ita grauiter infestante iussimus vt
vrinam reddere tentaret : interim cum nos
vesicæ

vesicæ tumorem ad inferiorès partes im-
pellendo sensim premeremus, iuuenis vri-
nam reddidit. Atque in his qui simul patiū-
tur causa suppressæ vrinæ facile deprehēdi-
tur quanuis in aliis quibusdā non adeò ma-
nifestè dignoscatur. In quibus artificiosa cō-
iectura ab omnibus vocata nobis perquam
utilis est, vt pote quæ inter exactam noticiā
& omnifariam ignorantiam media quo-
dammodo putatur, proinde fieri non po-
test, vt in omnibus morbis colligantur no-
tæ, quæ concursus affectuum indices ab
empiricis nominantur. Sed verissimū est
id quod Erasistratus dicere solebat. Opor-
tet inquit hominem exercitissimum ra-
tione esse, qui voluerit non solum affectus
ipsius qualitatem, sed affectum quoq; locū
probè dignoscere. Verū vt ad huiusmo-
di exercitationem dicentes perueniamus
haud quaquam quærendum est, an dicere
oporteat vesicæ ceruicem, si vel à lapide

*non est neces-
sario maximam
exercitationem
fieri solum affe-
ctum ut empiri-
ce sit id cui affectus
ad curatiōnem
noscere velimus*

Nota

*sed ut exercitissimus
admodum significat
perdiscimus est
sacrum ut dicitur
solum putare
an obliquum ut ap-
pella si ci de uero
aut quod obli-*

ut qd p. n. affec-
parta actio p. h. h.
impedita
 vel grummo obstruatur affectā esse aut i-
 planon affecta actionem ipsius lædi. Ergo
Quam quæstio
ab d. cebant ac
non esse
in fiqui d. m. q. u.
amenda i. l. l. a. f. u.
d. p. p. d. i. t. a.
 in huiusmodi quæstionibus ad artem om-
 nino superuacaneis, Archigenes versari cō-
 suevit. Alii verò ultra hæc procedentes ne-
 cedi quidē actionē dicunt fieri N. ipsa vide-
 tur mulculo qui vesicæ ceruicem cōstringit
 laxato. Vesica autē vrina in se contenta cir-
in ante sententia
h. u. l. i. t. i. p. d. i. c. a. f.
et in g. r. u. m. e. n. d. i.
u. a. t. o. s. e. d. p. a. r. i. u. l.
mentum d. l. u. e.
q. i. n. t. e. l. i. g. e. r. e. n. o.
in g. r. a. f. i. t. u. e. n. t. i. a.
h. u. l. i. t. i. p. d. i. c. a. f.
u. a. t. o. s. e. d. p. a. r. i. u. l.
 cundata ac circa eam contracta, musculis
 verò abdominis simul exprimētibus. Cum
 itaq; & vesica citra noxam munere suo fun-
 gatur, & musculi voluntatis imperio sic o-
 bediunt vt superiores intendantur, is verò
 qui ceruicem circundat laxetur, quomodo
 (inquiunt) rectē poterit aliquis suspicari no-
 xam esse actioni illatam. Quapropter sup-
 primi vrinam dicere cogūtur, non læsa sed
 impedita meiendi actione tāquam arti me-
 dicinæ opem ferant, si vocabulum lædi
 transinutantes impediri dixerint. / Sed hu-
 iusmodi quæstiones (vt diximus) ad Diale-
 dicam

sticam pertinent, ad mentisque exercita- ^{hujusmodi autem}
 tionem magis quam vel ad affectus ipsius ^{questiones sunt}
 dignotionem, vel sedis affectæ inuentionē ^{in istis qz}
 accommodantur. Verū ea, quam nuper ^{ubi autem e}
 proposuimus ad institutum opus propriæ ^{maximal peris}
 pertinet. Intelligitur autē ex ipsa quod im- ^{quod dicitur}
 primis per artem secandi corpora accuratē
 cognoscere oportet. qualis sit cuiuslibet
 partis essentia: deinde verō & actionē & so- ^{actionis}
 cietatem quam cum proximis habet: quæ
 etiam impositionis vocabulo comprehen- ^{ubi dicitur seu in}
 ditur intelligere, quinetiam ipse quoq; par-
 tium vsus ad affectorum locorum inuen-
 tionē magnificē cōducit. Actio. N. motus
 est partium factiuus, vsus verò omnibus ^{quid sit et a}
 insunt vel nil agentibus. Ergo quod ad vri- ^{ex cognitione}
 næ redditionem pertinet, excretionis actio
 fit à vesicę contractione concurrente inter-
 dum musculorū abdominis auxilio: cū
 videlicet admodum exiguam continet vri-
 nam aut vesica ipsa infirma est. Reliquæ
 verò

verò partes omnes vtilis sunt ad actionem.
 Nisi. N. vesica ipsa cū toto spacio sic figu-
 rata fuisset ac ceruix ipsius tota fuisset perfo-
 rata & vterus obliq; implātati in ipsā fuisset,
 frustra habuisset cōprimendi motū ex
 horū itaq; noticia & affectæ partes & affe-
 ctus ipsarū deprehēdi possunt, nō ex ea que-
 stione qua inuestigatur utrū dicere oport-
 eat obstructū instrumētū esse affectum an
 omnino noxa carere.) Haud absimilis huic

alia quæstio, & quidem de affectis iam par-
 tibus, sed quibus nōdū inest ppropria disposi-
 tio. Vocant autē propriā dispositionē quæ
 separata causa quæ ipsam fecit permanere
 potest, Hac ergo consideratione rursus di-
 cunt nonnulli nequaquam affici caput per
 eos capitis dolores qui à bilioso humore
 in ventriculo contento proueniunt, quod
 per vomitum eiecta bile protinus capitis
 dolor quiescat. Quemadmodum si post
 vomitum nihilominus permanserit, tum
 affici

carat notitia
 i affecti nō
 in ex aliq; quæ
 bus

et huiusmodi
 pparibus
 nem 83. ang
 in sensum pahl
 m d: ci de hant

affici caput, idque multo magis, cum similia suffusioni accidentia oculos infestant cum mulatis in ore ventriculi excrementis. Hæc

N. veluti umbras quasdam esse affectuum in omnibus his quæstionibus plurimum occupati maiores nostri perquam pauca de affectorum locorum noticia scripserunt.

Nos verò diuersa incedentes via exercebimus, aut (vt dixerit quispiam) instruemus studiosos quomodo sedes affectas dignoscere possint. *aut non tumen vesicæ seu Gæ*

Ergo quemadmodum paulo antè propositum quod intenta vesica homo

vrinam reddere non posset, ita in præsentiarum subiiciatur citra vesicæ tumore

vrinam supprimi. Ergo necesse est, eum si *et tunc significat affectu esse ureteris*

retenta est vrina vel vreteras vel renes esse *renes*

obstructos, quapropter vlcus hic intueri oportet, num antequam supprimeretur vrina, aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius cuiuspiam mali præcesserint accidētia

Neque negligēda est vniuersi corporis dispositio

c s litio

fitio vt possimus quoad artificiosa coniectura permiserit, distinguere vtrum in ipsis renibus à lapide vel crassis succis fuerit obstructio. An in vocatis vteribus qui à renibus ad vesicam protenduntur. atq; sunt quædam quæ ad exquisitam perducunt noticiam veluti paulò antè dicebamus de his quæ patientis substantiæ proprietatem declarant. Alia verò artificiosè cōiecturæ inseruiunt, vnde prolixiorē esse disputationem accidit, nisi sophistas valere sinas, quæadmodum hoc loco Asclepiadem negleximus, qui de vrinæ in vesica collectione vt alibi ostendimus absurda scripserit. Porro, ea quæ de principe animæ viscripta sunt ab his qui eam in corde consistere existimant, omnes dissectores iam damnauit, cum tamē Archigenes ab hac opinione haud quaquam dimoueri potuerit. Quæuis ea reprehendatur, cum per alia multa tūm maximè per ea quæ in phreniticorum lethargicorumq;

icorumq; curatione videntur. Verum tū
 ursum tum deorsum sermones suos con-
 fertit vt modo hoc dicat modo illud nil
 omnino declarans. atque huius generis est
 tertius Archigenis liber quem de locis pa-
 tientibus scripsit. Nos verò principem ani-
 mæ vim in libris de Hipp. & Platonis pla-
 titis magna ex parte absoluimus, nunc ve-
 riò hac velut demonstrata patientium par-
 tium cōtemplationem perficiemus, quod-
 ue omnibus partibus & locis commune
 est non Dialectica quæstione sed ad artem
 necessaria persequar.

S C H O L I V M.

AE M E N Græce, *περιουρίον* est locus inter te-
 sticulos & podicem, nil verò mirum inflamma-
 tionem illic subortam vrinæ viam cumprimere ve-
 nit. N. illac ex vesica colis. Ergo coniectura artifi-
 ciosa primò de crifibus cap. 9. est quæ proximè ac-
 cedit ad euidentiā. Ergo per syndromas id est,
 concursus signorum euidentes esse morborum co-
 gnitiones dicebant empirici & re vera si omnes
morbi

44 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
morbi haberent sui generis integras syndromas, & exquisiti essent, omnes cognoscerentur, haud obscure, verum, quia non ita fit, sed aut pauci exquisiti sunt, aut cum alijs permiscerentur, rare omnia signa conueniunt. Deestque tantum integræ cognitioni quantum completæ syndromi. Ergo actio & vsus qua ratione differant, ex definitionibus hic scriptis constat satis. Præterquam quod libro. 17. de vsu partium docetur à Galeno leno apertissimè, & res est haud multum obscura. Nimirum omnium rerum est vsus, quarum est aliqua utilitas, sed non omniaquæ ut cunq; utilia sunt, operantur aut agunt aliquid. non ergo omnium quorum est vsus est actio. est. N. vsus omnium eorum quæ nata sunt operari, & si non operentur, ut crurum non est actio nisi ambulemus, vsus verò est nobis etiam decumbentibus. Sunt etiam nonnulla quæ neq; operantur neq; operari nata sunt neq; in hoc comparata a natura quorum tamè est aliquis vsus, quia est aliqua utilitas, ut ossium nulla est actio, sed est vsus, quia affixi illis musculi habent firmitudinem, & ut semel dicatur, ad quodcunq; opus præstant multo plures partes vsum quam actionem. Ut quod ad vrinæ redditionem attinet, ea fit vesica se se contrahente, interdum auxiliantibus musculis abdominis. Reliquæ verò partes utiles sunt ad actionem. Nam nisi vesica ipsa cum toto spacio sic figurata esset, ac ceruix ipsius tota fuisset perforata, descenderentq; in ipsam oblique vretes, frustra habuisset

abuiſſet cōprimēdi motū quorsū. N. haberet vim
omprimendi, si via deesset qua expelleret aut qua
reciperet? Ergo illa definitio propriæ affectionis
ua dicitur vocant autem propriam affectionem
ua separata causa quæ ipsam efficit, adhuc per-
manet, ex opinione antiquorū est. Nam etsi omnis
passio quæ re vera est per consensum est sine per-
manencia atque vt vmbra cuius omnino nil super-
est ablata causa, & si quid habet permanens & in-
ependens, illud iam propria passio est atque dum
on est tota passio independens à causa, est partim
propria partim per consensum. Tamen multi mor-
i sunt passiones propriæ, & si simul cum causa tol-
antur cuiusmodi sunt morbi omnes in compoſi-
tione, qui ex rei alicuius additione consistunt.

hos N. monstratum est lib. 4. controuersiarum cap.

habere causas continentes. Ergo causis quæ à Ga.
icuntur hic suppressæ vrinæ sine vesicæ tumore
ddi debet alia. scilicet resolutio facultatis trahen-
i renū. Fieri. N. potest, vt nulla vrina reddatur, eo
nullā trahant renes à vena caua, nā ab ipso G. ca.
li. 3. de causis symptomatū dictū est, defectu tractri-
is renū distribui serum in totū corpus fieri; caco-
himū vbi redundās sanguine seroso. Ergo vbi G. in-
uit, neque negligenda est totius corporis disposi-
o vt possimus quoad artificiosè coniectura per-
iferit, distinguere. vtrum in ipsis renibus à lapide
el crassis succis fuerit obstructio an in vocatis
reteribus, ne intelligas ex corporis vniuersi di-
sposi

46 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
spofitione cognofci poffe renes ne an vretes p
tiantur obftructiones (non. N. poteft) fed cognof
an renes patiantur obftructionem à lapide an à fuc
cis craffis atque etiam an vretes fi illæ patiuntur
obftructæ fint à lapide an à fuccis craffis hoc. N. co
gnofcitur ex corporis habitu. Coniectura tamen fin
ne malum illud quacunque ex caufa illud fit in re
nibus an in vrinæ vijs aliunde peti debet , puta ex
patris dolore.

C A P. II.

Relectiuncula.

Vt propositam quæftionem dirimat, et ad hanc tracta
tionem de patientium locorum notitia iaciat fundamentū,
nititur Gal. monſtrare non poſſe actionem ledi quin ali
quo modo patiatur illius inſtrumentum. Nam etiam ſi læ
ſio actionis per conſenſum alterius partis laborantis fiat,
uēhilominus inſtrumentum illius actionis leditur. Quod
confirmat primum tribus exemplis petitis ex Hippocrate
in prog. & aphor. deinde exemplo doloris colici confir
mat, quamquam paſſio ſit in ijs quæ ſimul cum caufa to
luntur, nihilominus dici debere inſtrumentum illius pati
atque docet, ſuccum vitreum eſſe in illo dolore paſſionis
cauſam, ex hoc axiomate, illud quo tangente patimur &
quo abſente quieſcit pathema cauſa eſt. Vtitur etiā argu
mento alio ſumpto ex diſenteria, quæ antequā manifeſtum ve
cus inteſtinorū eſt, ne diſenteriā quidē appellatur. Tamen
antequā id fiat habent ita laborantes in inteſtinis paſſio
nem, quāquam affectum non habent. Tamen non (inquit)
oportet

ortet hic quæ dicuntur per sortem cauillari. est. N. ca-
iosum quoddam argumenti genus, quod in rebus omni-
s ad vitam necessarijs, dubitationem facit (quid sit so-
es dicemus in Scholijs) sed illud vnum liquet, affectum
nem esse præ exiguitate insensibilem antequam sentiri
sit. vt monstratur exemplo guttularum excavantium
pidem. Tamen antequam sit sensibilis non est affectio,
æ ablata causa perseueret. Ergo tunc quoq; cum passio
zul cum causa tollitur, patitur re vera instrumentum.
que concludit Gal. quod proposuit.

ut sit aliquid quod
non est passio per se
sed est affectio an-
tequam sit sensibilis
propter exiguitatem
proprietatis pro se



VAE LIBET in animan-
tis corpore actio peculiarem
habet particulam per quam
perficitur, eoque actionem
lædi necesse est instrumento
tam efficiente quomodolibet patiente.

si actio a ligno
necesse est et quod
instrumentum le-
di debet
si conber sapientia
in causa propina

q; interdum facile passio soluitur, adeo
simul atque opifex causa fuerit separata,
sa quiescat, interdum tanta est soluen-
difficultas vt diutiùs permanere possit,
usa etiam ablata. Accidit autem nonnun-
iam vt efficiens causa pertransiens nõ fir-
ã in particula faciat passionẽ quã Archi-
genes

passio a se
et non a se
et non a se

interdum passio
affectus sit. in pro-
dem reputant. sepa-
Itaque ac causa sepa-
f. paulo p. h. longior
in interdum causa
affectus magis et for-
et sit. passio sit
et sit autem pertran-
sientem pertran-
sientem est. illud au-
tem continet
hanc finem
posita per hunc
m. f. 50. ad h.

videt in lepto
astras qui bus
dam exemplis
primam qd si
hanc laborat
culo qui vultu
deat humorem
inueni aqua
met ad oculos
l. f. h. i. t. f. f. f. f.
in hinc. bene
uit uigis la d. i. t.
apud instrum
in qd mibi i. l.
ipso ascendit
his nō la d. e. r. e. t.

genes cum vmbra morbi comparatur simili
 liter iis qui suffunduntur collecto in ore ven
 triculi tenui excremēto, vnde vapores qui
 dam subleuati deinde circumuenti à viden
 di facultate similes imagines mouent, qua
 les per suffusiones apparere consueuerunt.
 Idq; maximè euenire solet his quibus ocu
 lorū humor exquisite purus est: aur viden
 di facultas quàm facillime sentit. Eandem
 ob causam vbi sanguinis fluor, aut vomit
 us per morbos expectatur huiusmodi acci
 dentia interdum apparēt, de quibus. Hypp.
 in Prog. in hunc modū scripsit. Si cuiquam
 in febre non lethali caput dolet, aut ante
 oculos obscura quædam obuersantur, aut
 ventriculi morsus accidit is bilem euomet.
 ac paulò post. Quibus verò in huiuscemo
 di febre caput dolet, oculi verò obscuras il
 las imagines non vident, sed caligine hebe
 rantur, aut splendentia quædam ipsis obii
 ciuntur, ac pro ventriculi morsu in alteru

tra parte Hypochondria tenduntur neq;
dolore, neq; inflamatione infestante iis pro
vomitu sanguis è naribus effluet. Hæc est
verborum Hypp. series quibus docuit se-
penumero contingere, vt à multis succis
in ventriculo collectis imagines quædam
oculis obiciantur. Quòd si nil omnino à
succis ascendat ad oculos nullum huiusmo-
di accidentium euenire solet, quemadmo-
dum vbi neq; , vel ad aurium, vel narium
meatus, vel etiam ad linguæ corpus quid-
quam transfertur, vnde manifestum est, oportere oculos participes fieri eius dispositio-
nis quæ ventriculum infestat, si vidēdo de-

beat animal errare. cum itaq; rursus dicat

Hypp. quibus deiectiones biliose exeunt

surditate super veniente finiuntur, & qui-

bus surditas præcesserit, desinit, si deiectiones

equuntur biliosæ. Quis est autem adeò de-

mens interpret vt omittat in huius sermo-

nis enarratione aurium passionem, aut tunc

d

dicat

*propterea si bi-
ptum faciens
auditu homo facit
hunc ac hunc
est qz ex infirmitate
hunc audit qz uena
et a legione act
ad legione in
menti*

dicat nasci furditatem cùm bilis quæ antea
per aluum euacuari consueuerat, ad oculos
effleratur. Ergo semper incipere oportet, ab

per qd actio
con le san uide
us colligere qd
est instrumentum
hum postea aut
ut deare an d
stata sit statu
qz forma an
stans qd stans an
causa morbi
parte continet
an per ipsam partem
actionis instrumento, deinde quærere quis
sit noxæ modus, an scilicet dispositio iam
stabilis, & firma an adhuc fiens, ita vt per-
seuerare nondum nata sit. Quòd si nunc
quoq; fiat: utrùm causa quæ morbum fa-
cit in ipsa parte contineatur an per ipsam
transeat, inuestigandum est. &. N. arefacto
immodicè humore quem Cristaloydem
vocant. perseuerans erit noxa, & essentia
ipsius ppria passio. Si verò crassus humor
in pupilla constiterit, essentia quidem non-
dum læditur verùm symptomatis causa in
oculo ipso continetur, sed tunc per ipsum
transire dicitur cum euaporans succus con-
sistit in ventriculo qui verò partem quam
piam tum solum arbitratur pati cum in es-
sentia ipsius permanens fuerit dispositio le-
gislatoris munere qui patriis nominibus
propria

propria significata instituit fungi videtur.
 Nam ubi vehemens dolor intestinum infe-
 stat firmato in vna quapiam parte dolore, *id probat a
ph. ad l. vii
h. n. s. f.*
 vt quasi perforari videatur, quo pacto vel
 nequaquam pati intestinum, vel passionem
 in ipso non esse quis dixerit? Quamuis inter
 dum huiusmodi dolores excreto quodam
 vitreo succo vel vnico temporis momento
 finiantur neq; verò aliud quidpiam dolo-
 rem concitasse putandum est, præter humo-
 rem excretum quo. N. excreto ilico dolor
 sistitur, hoc ex cõmuni hominum opinio-
 ne doloris causam censerì par est. Idq; ob
 naturale quodam axioma, quòd ex seipso
 ad huiusmodi causarum dignotionem fi-
 dem habere videtur. Id. N. quo tangente pa-
 timur & quo separato cessat passio causam
 esse apud omnes homines in confesso est,
 sic. N. & ignem vstionis, & gladium se-
 ctionis causam esse credimus atq; de singu-
 lis aliis eodem modo dicendum. Est ergo
 d a euacua-

euacuatum succum infestantis mali causam fuisse, quo tempore in particula continebatur putandum est. Sed an ob id quod vehemēter infrigidat, aut calfacit, aut in totum per intemperiem partem afficit, aut quia per continuas partes transit, eas ad excretionem vi quadam excitans, aut ob fluctuosum spiritum ab eo exortum qui continentem partem extendere potest, aut quia violenter impactus est aut quia erodit. & mordet nondum ex euacuationis ope manifestum est. Quippe id solum constat quod cum continebatur molestiam inferebat. Ergo non solum putare oportet huiusmodi succum esse causam doloris verum partem quoque in qua cōtinebatur illo tempore pati quo ob succi præsentiā dolore cruciabatur, sic etiam pati aliquem dicimus cum aliquid extrinsecus incidit, vel calfaciens vt ignis vel refrigerans, vt nix vel cōtundēs vt lapis, quo separato protinus fini-

ta fuerit passio nemine propter hoc dicen-
te partem non fuisse perpeffam, quòd in
ipsa nulla sit relictà dispositio. Ergo hoc
vno supposito, quod & nomine passionis,
& verbo pati hoc modo vtamur ita dicen-
dis animum adhibe, quòd vtilitatem tùm in
præfagio, tum in curationis ratione conse-
quaris, quippe nōnunquam à causà quapiã
oritur passio sed ità oritur vt separata cau-
sa haud quaquam permanentem habeat
dispositionem interdum autē partim iam
factus est partim etiam dum fit, sepe nu-
mero conquiescit abeunte causà iam verò
perseuerans manet dispositio veluti in di-
senteria, mordax succus causa est affectus
vt potequi ab initio, & absterget, & abra-
dit, deinde temporistractu vlcera intesti-
num. Quòd si antequam vlcus induxerit
in intestina influere desinat passio ipsa nō-
dū dysenteria dicetur: si verò vlcere præoc-
cupet intestinum quamuis succus finiatur

*volat exen-
si fenterie*

54 DE LOC. PATI. G. CVM SCHO.
non tamen simul finitur passio.

SCHOLIUM.

QVAEVIS actio animantis est particulæ aliquius, vt visio est oculi, incessus crurum, loquela linguæ, & partes cuius sunt actiones dicuntur illarum instrumenta. Tamen cum instrumenta hæc multiformia & compolita sint, nō omnes in illis particulæ par momētum præstant ad actiones, sed vnica pars est, cuius propriè est ea actio, reliquæ sunt illi subseruientes, & ad eam actionem præstantes aliquē vsum, vt nuper dicebamus de partibus quibus mictio agitur, in oculo cristallinus succus est visionis proprium instrumentum. Tunica & reliqui succi habent ad hanc actionem suos vsus, quod docuit Galc. idest libr. de causis Sym. luculentissime. Ergo actio leđitur ea particula, quæ est propriū instrumentum, læsa vtcunq;: addidit verò Gal. vt cumq; quia non opus est proprium instrumentum proprio aliquo malo laborare, sed satis est per consensum alterius partis pati, per sese minime affectum. Nam quæcunq; pars vsum præstans vitietur actioni accidit in commodum. Verū id fit, quia aliarum quauis affecta instrumentum proprium quodammodo patitur, per consensum scilicet. Ergo ex his quæ Gal. hic scribit, non est quòd quisquā vellit elicere, morbos fientes habere continentes causas

causas. Nam quāquam dicit interdum facile passio soluitur adeò vt simulac opifex causa fuerit separata ipse quiescat, interdum tanta est soluendi difficultas, vt diutius permaneat, & postmodum procedente cap. quippe nonnunquam à causa quapiam oritur passio, sed ita oritur, vt separata causa haud quaquam permanentem habeat affectionem, interdum autem partim iam facta est, partim etiam dum fit saepe, quanquam fieri desinit ablata causa, perseverans tamen manet affectio. & si (inquam) hæc Gal. dicit non tamen ita loquitur, vt qui hodie de causa continente disputant. video. N. illos tam rigide de ea loqui, vt quæstionem logicam potius quam medicam disputent. Si quidem quod ex causa continente pendet sublata causa ne momento quidem temporis potest manere, neq; magnitudine insensibile. Galenum verò nō ita disputare modo sed medicè magis, palam facit vltima capitis pars, nā illic inquit eum morbum simul tolli cū causa qui ea sublata non eget propria curatione, sed curatur ab ipsa natura. Quid sit continens causa quidq; de ea, & morbo firmissimis rationibus demonstrari possit, scripsi lib. 4. controuersiarum. Vbi monstratum est nullum morbum temperamenti talem causam habere, quosdam tamen eorum habere qui in compositione sunt. Hic satis sit locum præsentem enarrasse. Ergo qui perspicacioris, visus est citius patitur suffusionem ascendentibus in oculos vaporibus, quam qui hebetioris, vt dictum etiam est ab ipso

Gal. Primo de causis Sympt. quia ijs quæ hebetiorē fugiunt perspicacior visus perturbatur. Neq; verò est quod mirere, quod optimum est, & maximè secundum naturam, in causâ esse vt lædatur actio modo illud ex accidenti fiat. Nam læsio illa visionis re vera, & perse à morbo fit, is tamen morbus alterius actionem non læderet huius lædit. Id quod vsu venit in ijs malis quorum symptomata ad sensus pertinent, quia qui acrioris sensus natura est à leuioribus causis dolet, quàm qui est hebetioris. Ergo vbi dicitur si verò crassus humor in pupilla consistenterit, essentia quidem nondum læditur, verum accidentis causa in oculo ipso continetur. Ne intelligas finistre, non esse in oculo affectum aliquem à quo actio lædatur. Quod nonnulli intelligentes, morbos compositionis à vera morbi ratione volunt excludere. Sed intelligo, humorem cristallinum non habere proprium affectum, vt cum est arefactus, sed pati per consensum totius oculi, qui habet in sese duplicem causam symptomatis illius, idest læsæ visionis, alterâ proximam & perse, morbum scilicet ipsum compositionis, alteram causam morbi perse, & symptomatis per aliud, puta humorem. Hæc sunt consona veritati, & his quæ docentur à Gal. idest. de sympt. causis. Quidquid aduersus illum garriat Argenterius quem li. 4. controuersiarum refutauimus. Ergo vbi dicitur interdum huiusmodi dolores excreto vitreo quodam succo vel vnico temporis momento finiantur, ne intelligas momen-

momentū (Græce καίρος) significare quod appellare solēt instans, indiuisibile temporis punctum ita significantes, sed tempus præ breuitate insensibile. Nam dolor non potest tolli in instanti, & si euacuatus succus sit, quanquam. N. dolor actio quædam læsa est quocirca ei non repugnat pendere ex continenti causa, tamen quia succus vitreus nō facit dolorem per se, sed per affectum aliquem, qui vt alibi ostendimus est vlcus, aut in temperies, hic verò affectus non potest tolli in instanti, & si sublata causa sit, fit vt neq; dolor in instanti tolli possit ex creto succo, quod si fiens adhuc pathema est, breuissimo tempore, atq; adeo insensibili tollitur, id quod significans Gal. dixit, vnico momento. Ergo vbi dicitur id. N. quo tāgente patimur, & quo separato quiescit passio causam esse apud omnes homines in confesso est. Intelligunt nonnulli cōtineri finitionem causæ continentis, atq; perinde esse ac si Gal. dixisset, causa cōtinēs est qua posita ponitur, & qua sublata tollitur effectus, sed tamen vt lib. 4. controuer. diximus, ad causæ continentis essentiam non opus est vt duo hæc ad sint, sed satis est vt sublata causa tollatur effectus, ita vt sine ea ne momēto tēporis dureret. Non est autem hoc in loco quidquam meæ sententiæ aduersum. Neq; N. Gal. hic de causa continente agit, neq; est hæc definitio: sed discerens de causa in significato latiori, accipit hanc dignitatē, aut hanc propositionem, id quo tangente patimur & quo separato quiescit passio causam esse apud

homines in confesso est. Non esse hic sermonem de causa continenti, declarant exempla quæ appositæ sunt, neque N. ignis vitionis neque gladius sectionis causa continens est.

NEQVE est quod nos ad præsentia sermo ex minutatim coaceruatis contristet, quem & Sorytem nominat, communiscōtingit ex ipso dubitatio, in multis ad vitam pertinentibus de quibus, tum à pharmacopolis tum à medicis, ante medicū est quæ de causa superfluū erit, meminisse illorū mihi volenti quidē in hac ipsa artis parte ostendere dubitationē. Quòd. N. tempore ad affectuum generationem sit opus inter omnes conuenit, an verò quemadmodum cum domus sit nondum est domus sed totum hoc simul fiens domus, eodem etiam pacto, quilibet affectus dum fit fiens quidem fit, nondū tamen existat, haud ab re quæritur? Neque N. omnium quæ fiunt eadem ratio est. Quippe, res similes nullam naturalem figuram requirentes protinus

protinus ab initio eadem constant essentia. dissimilares verò & quibus varia est forma essentiam generatione posteriorem habere possunt. Neque. N. cùm domus construatur, simul fiunt fundamenta, parietes, fastigium, tegulæ, ianuæ, fenestræ, ex quibus omnibus quodammodo compositis atque in vnâ formam reductis domus ipsius essentia cõposita est. Morbus verò & calidus & frigidus & humidus & siccus protinus ab initio cùm primũ corpus tẽperaturæ quæ bonæ valetudini debetur limites excesserit, eandem sibi ipsi naturam habet. Quauis. N. interdum adeò sit exiguus vt neque à nobis cognosci neque laborantium sensu percipi possit, nihilominus tamen propriam habere speciem censetur. Haud aliter inflammatio quoque, in quacunque animalis parte constiterit, siue maxima siue minima fuerit vnus atque idem erit affectus non specie quidem sed magnitudine

tudine varius. Cæterum, quod possint aliquæ affectiones in corpore consistere adeò exiguæ vt non appareant argumento est gutta longo temporis tractu saxum excavans, de qua arte carmen hoc prodictum est, mollior assiduis saxū cauat ictibus vnda Neq. N. vel vnus vel duo vel tres vel quatuor aquæ ictus saxū ferientes ac ne centesimus quidem sensibilibiter videtur saxum excavare neq. N. fieri potest, vt primo nihil efficiente alter aliquid faciat, quippe qui habet eādem quam primus habuit ad saxum rationem. Ergo si secundus ictus in saxum quippiam effecerit ipsum à primo ita mutatum fuisse necesse est, vt non omnino idē quale ab initio fuerat permanferit, & N. si ipsum vndequaq; idem permaneant atq; agens quoque in ipsum causa nempe aquæ stilla, necesse est quemadmodum à primo ictu non affectum est, ita neque à secundo. Quod si fateare neque tertius quoq; ipsum afficiet,

afficiet, quippe eadem ratio est, haud secus de quarto & quinto & reliquis deinceps omnibus dicendū est. Et. N. quoad eodem modo se habente saxo eadē quoque causa accesserit, nihil amplius efficietur, quod si à millesimo ictu sensibilis videatur in saxo cōcauitas, ad singulos ictus affectus in saxo. Nūc primū sensibilibiter apparētis millesima pars referenda est. Cum itaque causæ agūt in corpus, species & affectus ab initio est eadē tamen ob exiguitatem non apparet. At verò huiusmodi affectus qui adeò sunt exigui separatis causis facientibus illico finiuntur, natura videlicet ipsorum sanante. Quippe, illi duntaxat externo egent auxilio, quos ob magnitudinem natura vincere non potest. Ergo eadem quoque ratione cū primum mordax humor aliquod intestinorum de-
raferit quanuis id quod factum est nondum videatur, nihilominus dispositio ipsa sub disenteriae specie continetur. Sed vt natura
parua

parua quædam vlcera quæ nonnunquam eueniunt, ita & intestinorum abrafiones nullo adhibito medicamento sanare potest. Hac ergo ratione falsum omnino est quod à quibusdā dicitur nullum per huiusmodi symptomata in corpore relinqui affectum quod si verum esset, tamen intestinatū fuisse affecta, haud quaquam negandū est cum ab acredine excrementorum ipsa rodentiū dolor notatu dignus euenire percipiebatur.

cognitione la
affecti semper
actione la
explicandum
inde alia signa
percipienda
Hoc ergo ad omnia quæ posthac dicturi sumus veluti elementum quoddam obseruare debetis, sitquè hoc initium methodi qua inueniri debent sedes affectæ. nullam actionem lædi nisi pars quæ ipsam facit afficiatur. Si. N. cum vel dolor vel tumor præter naturam aliquis eam infestat omnino affici dicitur, multo magis eam affici læsa actione fatendum est. Atque iam suprà dictum est, quod ab excrementorum natura affectæ sedis coniecturam facere possumus.

capienter galē
reducit megi
am que dixerat
et forte paucis his verbis melius explicat q̃ tot ver
ambagibus
solum probare voluit anatomicam artem necessariam esse ut
que capite .i. a naturus est in cognitionem veniamus loci affecti
at autē anatomicam artem esse ad hoc necessariā .i. q̃ docet
tium precipue, essentis proprietatem, deinde et contentorū et ad nat
docet q̃ in partibus naturaliter contineant, et quæ etiam solent
Etum est, quod ab excrementorum natura affectæ sedis coniecturam facere possumus. id vero quatuor illa arg̃ta ab exercitiis desumpta quibus meo in solū probare voluit anatomicam artem necessariam esse ut que capite .i. a naturus est in cognitionem veniamus loci affecti at autē anatomicam artem esse ad hoc necessariā .i. q̃ docet tium precipue, essentis proprietatem, deinde et contentorū et ad nat docet q̃ in partibus naturaliter contineant, et quæ etiam solent

confirmat dicto capite & multis exemplis. // et hoc est tibi ga-
nium capitis LIBER I. primi argu 63 mantis. quidquid
id verò bifariam fieri constat vel ab excre-
tae essentiae proprietate vel ab his quæ in i-
pfa parte continentur. Similiter diximus ab
innatis interdum rebus de locis affectis cō-
iecturam sumi posse, est autem hoc ex acci-
dentium genere, quæ quidem non medio-
crem habent inter se differentiam, sed hanc
postea explicabimus.

SCHOLIVM

SORITES est vt lib. 2. de differentia febrium
Scap. 22. diximus, acervalis argumentandi ratio, ea
vtimur cū minutatim addentes aut subtrahentes
& veluti congerentes in cumulum argumentamur.
Diciturq; proinde à dictione σόρος, id est, acervus.
Est argumentandi ratio, quæ omnium maximè vi-
detur redarguere quæcunque non sunt exquisitis
terminis finita. Sed quæ fit vt modum hunc argumē-
tationis damnet, iubeatque cōtemnere Gal. dicens.
Neque est quod nos sermo quem Soritem nomināt
contristet, quippe multa ad vitam pertinentia com-
munem ex eo subeunt dubitationem, tamen cū
hæc dixerit, statim orditur argumētationem ex so-
rite talis. N. plane est ea qua de gutulis excauantibus
saxum differitur. Certè non videntur hæc con-
sona

sona, neque presunt sano homine digna. video locum hunc neque à Fuchio neque ab alio quopiam cuius scripta legerim esse intellectum. Omnes. N. intelligunt Ga. hic damnare Soritem, & despici iubere. Tamen ille vt sequentia indicant aut rem aliam agit, aut non constat sibi. nimirum rem aliam agit. Prestat si quidem in incepto, atque vt confirmet quotiens actio laeditur instrumentum illius pati, addit. neq; est quod ad praesentia Sorites nos contristet. quasi dicat, accedit dictis, quod ad praesentia, ad hæc (inquã) quæ ego doceo nō est quod nos cōtristet Sorites est. N. pro nobis, haud quãquã aduersum nos. Nam sorites solet ostendere ambiguitatem eorum quæ ad vitam pertinentia cū sint à multis tum pharmacopolarū, tum medicorum qui ante me scripserunt, dicta sunt. Ego verò modo proposui in hac parte, iuxta ea quæ ab illis dicuntur esse dubitationem, non ergo contingit quidquam ex sorite contra meā hanc sententiam, sed pro ea his dictis procedit Gal. ad argumentationem ex sorite, quo confirmet exemplo stillarum aquæ excavantium lapide. n. cū membrum aliquod patitur à causa quapiam, etsi affectionem quæ sentiri possit nondū habeat, habere tamen insensibile. Ego vellē verba illa Ga. quippe illi dum taxat externo indigent auxilio, quos ob magnitudinem natura vincere nō potest, à medicis omnibus memoriter disci & in animo haberi, vt iam hinc dicerēt ab aliquibus passionibus abstinere, eis solum admoventes manus, quas

quas non esset verisimile à sola natura curatum iri, ac non potius vt solent, aduersum leuissimos morbos grauioribus instantes remedijs vires deprimerent. Ergo ad calcem capitis vtitur Gal. epilogo & transgressione ad caput sequens, incipit hæc pars à verbis illis, atq; iam supradictum est. ~~Ergo~~ vbi legimus similiter diximus ab innatis interdum rebus de locis patientibus cōiecturam sumi posse. Est autem & hoc ex accidētium genere, in plerisq; codicibus latinis legitur, (quàm lectionem Fuchsius sequutus est non sine loci corruptione) Item interdū à Symptomātū genere, & in alijs multo deterius ita legitur, dictū quoq; est à symptomātū genere. Quæ duæ lectiōes eundē reddūt sensū planè falsū. f. G. in epilogo referre in ea quæ dicta hæten⁹ sint, symptomata propria, cū tamen de illis nullibi sit hucusq; actū sed præter sensum, literā etiam corrumpere. legē dū. n. fuit ὅτι λέξ τοῦ γένος τῶν συμπτωμάτων. Id est hoc vltimū argumētum scilicet ab adnatis, de quo dictum iam est, reducitur ad aliud ex accidentium proprietatē, de quo dicemus postea in, s. huius lib. cap.

CAP. III.

Releſtiuncula.

Hætenus Gal. docuit signorum quædam genera, quibus inueniri possit locus patiens, modò incipit inuestigare per singulos locos, passionē illis contingentes, siue compositionis

positionis sint, siue temperamenti, vt deinde colligat (id quod .s. cap. faciet) signa quibus cognoscitur patiens locus, & quibus passiones locorum . Quibus expletis nil erit amplius quod in hoc opere desideretur. Caterum vt hæc agantur primum declarat quedam nomina hæc scilicet idiopathiam, idest propriam passionem, sympathiam, idest cōpassionem, protopathiam primariam passionem, deuteropathiam, vel isteropathiam, idest secundariam aut posteriorem passionem: ostenditq; , non esse idem passionem propriam dicere & primariam, sed proprie contrariam esse compassionem, primariæ secundariam: ostendit quoq; quid sit morbus, & quid passio, si quis Græcorum more nominibus vti velit, monstrâtq; aliquando incoctos manere aut corrumpi cibos ventriculo nil patiente. Nam cibus corrumpi potest, quia ventriculus laborat intemperie, aut quia fluxionem patitur, aut quia cibi ipsi tales sunt vt ne ab optimè sano coqui potuerint. Primus laborat idiopathiâ, secundus sympathia ventriculi, cum alijs partibus, tertius omnino non laborat morbo quia illa actio non le-

uatur quæ nunc dicitur præter naturam.
 pite. 2. precedenti in quo dicitur ex leſa adione inuenire
 cum affectum non multo post initium. // 3. semper in capere
 orlet ad actionis
 strumento deim
 querere quis sit
 tre modus an
 licat dispositio iam
 abilis an adhuc
 infit aut per se
 nondum: nata sit est nunc fiat



utrum causa que morbum facit in ipsa parte continetur eas
 per ipsam ibi fiat inuestigandum est, quare nunc cap. 3.
 dicitur ut postea si non dicitur affectus et affectionum redit
 diuidendos quos intermiserat affectus loco allegato capitis se
 cundum quæ differentiam meum cum dignitate oportet ut
 curationem accedat, id est quæ caput agredere dicitur
 nunc de rursus ad principium sermone reducto. id est ad ea
 superioris partem cuius est affectus allegatus

VNC verò rursus ad principium sermone reducto in singulum partibus tentemus inuenire notas passionnes earum indicantes, tum

*capite folum quingz morboz numerat duntaxat. deinde
dicitur annexis quid dixerat patiti per petu men bonum
LIBER I. 67*

1 eas quæ in ipsarum essentia consistunt, tum
2 eas quæ ipsis veluti instrumentis accidunt.

Rursusque in vtriusque separamus, & dis-
cernamus à factis iam passionibus eas, quæ
etiam dum fiunt & quæ nondum pertina-
citer inhaerent. Item eas quæ in patite par-
te continentur, ab his quæ ea tanquam via

duntaxat utitur. Quod verò ex his alii cō-
ponantur modi satis constat. Præterea di-

stinguere oportet eas quæ per consensum
accidunt, à propriis, nam magis proprium

fuerit, idiopathiam, id est propriam passio-
nem quàm ut medici solent protopathiam

id est, primariam passionem nominare, veluti
ex aduerso diuisa passione per consensum,

à propria ergò qui propriè vocabulis uti
voluerit primario quidem affectui secunda-

rium aut posteriorem opponet, ei verò qui
per consensum infestat proprium, & con-

uenire quidem potest in idem per propria
passionem & per compassionem a grota-

c a re,

68 DE LOCIS PATI. G. CVN SCH.
re, quum in patiente particula permanēs sit
passio, neque N. primario sed secundo,
& propriè ipsam tunc pati dicimus, id ve-
rò haud obscurè in partibus externis vide-
ri potest, què admodum in corpore pleno ob-
orto ingenti glandularum tumore ab ulcere
cum inductum fuerit ulcus cicatrice, permanet
etià dum glandularum tumor vel in suppu-
ratam inflammationem transiens vel durum
tumorem quem *χοληάδνα*. id est strumam ap-
pellant, at nemo primarios dixerit huius-
modi morbos qui ob alium præcedentem
evenerunt, Quippe per consensum facti ad
huiusmodi permutantur idiopathiam. Per-
inde ac si protinus ab initio protopathia, id
est, primaria affectio ipsis accidisset.

SCHOLIUM.

MORBI in essentia partis consistētes appella-
tur, qui consistunt in temperamento, quibus oppo-
siti sunt qui partibus accidunt ut instrumentis, id est
morbi in compositione. Ergo ubi legitur & conue-
nire

nire quidem potest in idem per propriam passionem iam & per compassionem agrotare. Ego putaverim deprauatum esse codicem, legédumq; & per propriam passionem & per secundariam. Nam aliter non quadrant verba cum sequentibus & antecedentibus, hæc. N. ponebátur cōtraria propria passio, & compassio quare non poterunt simul conuenire. Nam & si possis dicere, vere passionem aliquā esse partim compassionem partim propriam passionem. tamen Gal. lōge aliam reddit dicti causā, ita dicens Neq;. N. primario sed secūdario ipsam tunc pati dices. Itaq; aut corruptus est codex aut ita putandum est sympathiam, idest compassionem esse nomen commune ad sympathiam & ad deuteropathiam, idest secundariam passionem alterutrum dixeris potest locus explicari. Ergo *κοίπαδα* appellāt Græci, quam celsus strumam, alij scrophālam, hispani lamparōn.

CAETERVM in præsentia non inutile fuerit meminisse eorum quæ in lib. de medicis nominibus diximus. Vbi designificatis est sermo quæ pessimè à recentioribus tum medicis tum pharmacopolis confunduntur maximè. N. proprius vsus vocis passionis est actionis voci-

e 3 oppo-

oppositus. Quipppe id agere dicitur quod
 ex leipso motum obtinet, pati verò, quod
 motum habet ab alio. Cùm itaq; duo sint
 motus genera alterationis & lationis vbi ad
 permanētem affectionem alteratio perue-
 nerit, cùm sit affectus præter naturam mor-
 bus appellatur. Quanquam abutentes ali-
 quando eundem hunc affectum passionem
 nominent: qui si more Græcorū patrio no-
 mine vterentur, partes ipsas potius pati di-
 xerint cum motum sustinent præternatu-
 ram: cum verò affectiones præternaturam
 habent si propriè quis loquatur ægrotare
 eas potius quā pati dicet: quòd si ab vfu re-
 cesserit, nō solum ægrotare sed pati quoq;
 dicere poterit, æquidem quod semper di-
 cere consueui nunc quoq; dicam. In ea do-
 ctрина qua de arte quapiam agitur, satis esse
 si quis vocabulum, atq; significatum eius
 pro doctoris voluntate proferens proce-
 dat, deinceps ad rerum enarrationem. Ad-
 monui

monui autem nūc significatorum eo quòd nonnulli non solùm patriorum vocabulorum significata peruertunt, verùm etiam eos qui rectè ipsis vri tentāt, calumnia persequuntur, de quorū numero sunt hi quoq; qui dicunt interdum læsa actione partem ipsam non lædi, eo quòd nondum habet permanentem affectionem, veluti, vbi propter succos in ventriculo contentos caput dolet, quod si commutata ratione denominibus certare desieris, magis propriè interpretando dices, pati quidem caput quādo ventriculo consentit, ægrotare verò cum propria passione laborat similiter ventriculum pati quidem cum à vitiosis molestatur succis, ægrotare verò aut per propriā intēperiem, aut cū inflātionem vel vlcus, vel abscessum habet præternaturam, quòd si omnino velit aliquis de his magis dialectica indagine exactè differere, interdum simul atq; alimenta fuerint corrupta,

concoctionis quoque actionem lædi dicent,
interdum hanc quidem non lædi illa verò
esse vitiata.

SCHOLIUM.

LIBER de medicis nominibus non extat. Ergo
qua ratione differant actio & passio vide ca. 6.
li. 1. meth. vbi non aliter quàm hoc loco dicitur à Ga.
duo esse motus genera, quanquam. N. ab Arist. lib. 5.
de motu dictum sit, tres esse motus, lationem, altera
tionē, & accretionem, atque ad tria prædicamēta
esse motū per se, quātitatem, qualitātē, & vbi tamē
Gal. platonis sententiam secutus est, quàm ego etiā
alijs locis confirmaui. Verum est quod dubites qua
ratione Cale. hic morbum per motum generat di-
cens, cum itaque duo sint motus genera alterationis
& lationes, vbi ad permanentem affectionem alte-
ratio peruenierit, sitque affectus præter naturam,
morbus appellatur. cum Aristote. 7. de motu dicat
ad sanitatem & morbum non esse per se motum?
certè ad calorem immodicum qui morbus est, mo-
uetur corpus, vt scilicet calor est, & passio seu pas-
sibilis qualitas, Tamen ad hunc vt est ameter, & vt
eo malè afficitur corpus, non mouetur. nam ad a-
bitum aut dispositionem non est motus. Ergo vbi
dicitur quod si omnino velit aliquis de his magis
dialectica indagine exacte differere, interdum si-
mul

mul atque alimenta fuerint corrupta, concoctionis quoque actionem lædi dicet, interdum hanc quidem non lædi, intellige non lædi præter naturā. Nam si cibi corrumpuntur, circa ipsos actio læditur. nam hoc ipsum corrumpi, est læsam actionem edi, sed non læditur præter naturam, quia non ex ventriculi malo quopiam, vt sequenti cap. Gal. apertissimè declarat.

QUIPPE, corruptionis ciborum tres primæ ac veluti generalissimæ sunt differentiæ. Vnà quidem fit per proprios ventriculi morbos, altera à vitiosis succis in ipso congestis, tertia ab alimentorum qualitate inducitur. Hæc ergo cum suapte natura vel nidorosa vel acida vel fætori aut putredini aut omnino corruptioni fuerint obnoxia, aut ex præparationis modo ad huiusmodi dispositionem aliquam deducta, certum est ea in ventriculo corrumpi, atque hoc modo cruditatem fortasse fieri dixeris. Sed oritur protinus discordia nūquid patiatur tunc ob hæc concoquendi facultas, quippe nonnulli per huiusmodi cruditates

74 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
ditates eam haud quaquam pati contendūt.
alii verò contrà atque inueniuntur tertia quo-
que secta eorum qui huiusmodi alimenta
inrudari negant, quāuis ea haud quaquam
concocta esse fateantur, tanquam non sit i-
~~dem~~ per negationem aliquid enunciare aut
per priuatoriam vocatam à dialecticis di-
ctionem. Idem intellexisse fratrisraturum pu-
to cū acinos & sesama & reliqua omnia
quæ omnino imputrida & nō mutata dei-
ciūt nullā dixit indicari in animalibus fa-
ctā esse a peptiam, id est, cruditatē, sed hoc
ipsum duntaxat quod non essent concocta.

SCHOLIVM.

TRIVM corruptionum hic enumeratum, pri-
ma fit per propriam passionem, Secunda, per
compassionem, Tertia omnino sine passione. Ergo
vbi dicitur tertia ab alimentorum qualitate indu-
citur, adde aut quantitate, aut prauo ingerendi or-
dine, aut intempestiua ingestione. Nam ob hæc o-
mnia contingit cibos corrumpi, vt dicitur ab eodē
Cal. 3. de causis sympt. cap. 1. Ergo vbi dicitur quæ o-
mnino

mnino imputrida & non mutata deijciuntur, allusit Gal. ad opinionem antiquorum, putantium per putredinem fieri ciborum confectionem, Videturque mihi ea verba referre ex Erasistrato. Ergo sesama sunt grana quædam stomacho vt dicit Dioscorides lib. 2. inutilia, quæ Hispanæ dicuntur. alegria, o, alionioli.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Perstat Gal. in exemplo proposito corruptionis ciborum contingentis in ventriculo, monstratq; fieri aliquando vt cibus corrumpatur ventriculo habente secundum naturã. Aliquando ex ægritudine vetriculi, exercetq; nos hoc exemplo, docens inuestigare per signa procedentes ex lesa actione, locum patientem, & passionis speciem, & causam. Proponit ergo cibos esse corruptos, dicitq; hoc potuisse contingere aut ob immodicam quantitatem, aut prauam qualitatem, aut quia ventriculus laborat, idq; aut nuda intemperie, quæ calor est aut frigus, vel redundantia prauorum succorum, qui aut in ipso ventriculo generantur, aut ab hepate lienēve, aut toto veniunt corpore. Atque hi succi rursum aut in cauo ipsius ventriculi sunt, aut in ipsius tunicis imbibiti, atq; vtrilibet aut calidi sunt aut frigidi: ex his omnib⁹ causis fieri possunt corrupti cibi, quæ omnia Gal. per signa propria hoc capi. distinguit, & obiter curare docet, ex quacunque causa corruptio pendeat: non aliorsum quam vtentes curatione, affectus

76 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
fectui quem esse coniectamus, necessaria, ex euentu co-
gnoscamus, nos non esse circa cognitionem deceptos, atq;
ita confirmemur in coniectura, quippe certissima omnium
affectuum notitiam ab his deprehenditur, qui intelligunt
quibus qualibet praesidijs curari possit. Quod ut confir-
met Gal. refert duas historias, hominum colico dolore la-
borantium. Dicitq; qua via in cognitionem patientis loci
& causae venerit, interim docens ex modo, exeundi, &
modo mixtionis, laboret ne altum an inum intestinum,
an medium.



V A R E in his negligenter
versari non oportet, sed me-
te adhibita diiudicandum est,
quæ quæstiones tanquam lo-
gicae prætermittendæ sint,
contrà, quæ ad patientis sedis notitiam cō-
ferant, atq; idcirco accuratius tractari de-
beant hinc. N. & id quod futurum est præ-
sagire & affectum iam factum decenter cu-
rare poterimus, itaq; sine contentiosis no-
minibus è rebus ipsis vtilitatem cōsequi li-
cet hoc modo. Esto ut quispiam mane sur-
gens dicat nidorosum seructum emittere,

aut

aut aliquid huiusmodi. Vt ab ouis frictis
aut alia quapiam re magis foetete & putri.
Ille itaq; qui fumosum ructum percepit
fatent se à coena placentam nidore plenam
comedisse quales sunt quæ ex oleo & itriis
& aliis huiusmodi præparantur: alter ve-
rò confiteatur fricta oua ingessisse. Atq;
nunc illorum nidore eructare, deinde alius
complures raphanos comederit vt fætens
putrisq; exeat ab eo ructus. Ergo cibos in
his non benefuisse concoctos nemo negat
quamuis ex hac re ventriculus haud qua-
quam fuerit affectus, neq; etiam quod ad
ipsius rationem pertinet circa actionem er-
rauerit haud aliter quam vbi quis integros
acinos per aluum deiecerit, si. N. humani
ventriculi officium esset acinos transmuta-
re accusaremus ob hoc ventriculi corpus
ipsumque vitiatum esse putaremus, cum
verò id sui muneris non sit sed acinorum
essentia accidat, vt concoqui nequeat haud
abre

78 DE LOC. PAT. GAL. CVM SCHO.
ab re dicemus hos quidem non esse conco-
ctos, ventriculi verò corpus naturaliter se
habere. Quippe hoc & nosse & definire
ad medicum haud inutiliter pertinet. / Sed
descript
quærere an dicendum sit actionem ipsius
per huiuscemodi excrementa fuisse læsam,
an contrà, ad medicæ artis opera super va-
caneum est.

SCHOLIVM.

ITRIA, quantum ego possum intelligere ex Ga.
& alijs, parabantur ex pane cum oleo & incile, vt
hodie etiam parantur placenta, inspergebantur
illis quædam semina, vt nunc etiam fit. Nonnulli
putât sola sesama solita inspergi, verum & semina
papaueris erratici in itria addi Dioscorides autor
est. Variam itriorum confectionem docet Ga. id est
de alimentorum facultate. cap. 4. Ergo vbi nos legi-
mus complures raphanos, Copus legit radículas,
sed perperam. Nam radícula vocatur ea herba quæ
à Dioscoride struthiû dicitur vulgo lanaria. rapha.
verò raphanus verò vsurpatione factû iam est lati-
nû nomen, aut si nomine prorsus latino vti vis, dic
radices radícula. N. longe alia herba est. Ergo de
raphano est falsa quædam opinio, quàm neque Ga.
sententia

sententia neque sequētium medicorū potuit extirpare. Cēset vulgus eas radices post alios cibos ad eorū concoctionem prodesse, quā tamen opinio Galenū ipsum magnopere offendit. Ita. N. scripsit, mirari subit eos medicos atque idiotas qui post cēnā concoctionis iuuandæ gratia crudos ipsos cōstant. ipsi quidē hanc rem experientia sibi exploratæ esse affirmant. qui tamen ipsos sunt imitati omnes sunt læsi itaque raphani radix inutile satis alimentum est coquitur. N. difficillimē, citissimē putrescit, & malum succum prestat. Ergo querere vt Gal. inquit, an dicendum sit actionem ventriculi per huiusmodi excrementa, id est, concorrupti cibi sunt fuisse læsam, an non, ad medicę artis opera superuacuum est. quia quæstio est logica. quam tamen ego paulō antē ita decidi. Cū cibi manent incocti, aut corumpuntur ob suam ipsorum naturam sine vitio aliquo ventriculi, lædi quidem actionem sed non præter naturam. Non. N. præter naturam est vinacea non coqui, cū ea coqui, secundum naturam non sit. itaque neque symptoma quodpiam est ea actio, alioqui læsa.

de Raphanis

A G E rursus vt quispiam nidorosum
 Aructum emittat, nihilque nidorosum
 comederit, nimirum huic igneū quē-
 dam calorem in ventriculo esse dicemus ac
 deinde

deinde rursus distinguendo inuestigabimus
 vtrum ab intemperie corporis ipsius ven-
 triculi hoc eueniat aut à flaua bile eaque
 vel in ipsius spatio contenta aut in tunicas
 ita vt vix abstergi possit demissa, ac ne hic
 quidem consistemus, nam quærere oportet
 an iecinore male suo officio fungente
 huiusmodi humor accumuletur, an is ex v-
 niuerso defluat corpori an etiam in ipso
 met gignatur ventriculo, hæc sunt cogni-
 tu perquã necessaria, sed quæ viro indigeat
 exercitatae considerationis qui res ipsas po-
 tius quam nomina quibus explicantur scire
 studuerit. Non. N. quemadmodum corru-
 ptionis forma efficiensem causam aperte
 ostendit, sic etiam licet inuenire definitam
 demonstrationem eius generationis quæ cir-
 ca formam illam est. Ergo si in ventriculo
 cibi non suapte natura in nidore transeunt
 efficientem causam calidam, si verò sapore
 referunt eam frigidam esse necesse
 est.

est. Sed non protinus constat vtrum in tem-
peries aliqua, an vitiosus quispiam humor
ventriculi corpus infestet. Proinde distin-
guendum est, daréq; oportet cibos, qui
suapte natura modo corruptionis, quàm
maximè aduersentur, vt panem, aut alicam
(gratia exempli) illis qui in nidorem trans-
mutare cibum consueuerunt: mel autem
is qui acidum à cibo saporem percipiunt.
Deinde considerare excreméta tùm ea quæ
vomuntur tùm quæ per aluum deiciútur,
num humor aliquis cum illis quidè bilio-
sus, & calidus, cùm his veró pituitosus ac
frigidus simul excernatur an nullo vacuato
humore ipsa exigua quandam mutatio-
né habeant. Quippe vbi igneo calore ven-
tricus infestatur panem aut alicuam, si-
ne humore deici videbis per quam exi-
gua in ipsis facta transmutatione quòd si
humor quoq; prauus deiciatur qui cibum
corrumpere possit, vidétur cibi in huiusmo-
f di

di humore submersi & ab ipsius actione manifestis alterati id quod à vomitione clarius discernitur, si laborans suapte natura facile vomere possit nam cogere cum qui vomere non potest absurdum est. Atque hæc ita deprehenduntur si in spatio ventriculi noxius humor innatet si verò in tunicas ipsius refunditur nausea quidem omnino confertur, sitis magis à calidioribus sequi nata est, ut à frigidioribus ciborum cupiditas excitari solet. Verum considerare oportet utrum illæsum sit hepar, an affectu quoque laboret: & qualis sit ipsius affectus utrum calidus an frigidus: haud secus de splene quoque: quippe ex horum omnium consideratione simul cum quotidiana ciborum potionumque experientia exquisite poterit quis inuenire non solum locum affectum verum ipsius dispositionem.

Scholium.

SCHOLIVM.

ALEXANDER Trallianus. lib. 7. cap. 14. putat ructum acidum fieri nonnunquam ex causa calida, quem tamen refutauimus lib. 6. controuersiarum, vt nil modo opus sit de hac re dicere. Ergo alica nunc significat apud Gal. genus tritici valde nutriens, & succi crassi, nunc potionem ex eo paratam. Hæc docet cap. 7. primi de alimētorum facultate. Potionis confectiōnem docet ibidem & 2. cap. lib. 8. meth.

cap. 8

HÆC autem notitia eo est vtilior, quò facilius curationis species per ipsam figuratur. & N. calida passio vbiunq; fuerit semper refrigeranda est, sed quousq; aut quomodo, aut qua materia refrigerare conueniat Locus patiens coindicat. Ergo si id ipsum quod molestat nil aliud fuerit, quàm in temperies, calidam refrigerando, & frigidam calfaciendo illico iuue- ris hominem, neq; nudam dūtaxat opinio- nem verumetiam scientiam & quidē haud obscuram susceptæ habebis coniecturæ.

Idq; multo magis si vtrunq; ipsam examinaueris, refrigerantibus tùm medicamentis tùm victus ratione videndo hominem fanari, à calorificis verò lædi quod si succus quispiam in ipsis ventriculi tunicis contineatur nausea quidẽm vexabit, sed inanis & sine vomitu, & quæ irritat duntaxat nullũ succum euacuans quemadmodum fieri solet vbi secundum internam spatii latitudinem humor in ventriculo continetur, cæterũ ructus, ab aliis acidi, ab aliis nidorosi emittuntur auxiliatur autem illis quidem medicamentum ex tribus piperis generibus institutum aut aliud quod huiusmodi, habeat facultate ex aqua vel vino dpotũ. his verò tùm absinthiũ, tùm hiera ex aloe facta quam nonnulli picram quoq; appellant. Ergo si per primam protinus experientiam à familiaribus medicamentis in vtroq; humore manifestum videatur auxilium, simul habebis & notitiam artificiosam,

sam & modum curationis si. N. ipsis vti perseveraueris homo sanitati restituetur quod si à solitis auxiliari medicamentis vtramque affectionem noxa consequatur deceptum te circa notionem inuenies quippe certissima omnium huiusmodi affectionum notitia ab his deprehenditur qui intelligunt quibus quolibet præfidiis ad bonam valetudinem duci possit.

SCHOLIUM.

QUALITATEM medicamentorum ipsa affectus species indicat, nimirum semper exigit contraria, vt calida refrigerari, frigida calferi, & alia omnia, eodem modo tamen quousque in auxilijs procedendum sit. Et modum vtendi, & materiam medicamentorum loci male affecti indicatio declarat. Nam calidiora calidioribus & frigidiora frigidioribus indigent remedijs si ad contrarias suæ naturæ affectiones mutata sunt, si verò ad similes, calidiora minus frigidis, frigidiora minus calidis. Itaque si duæ particulae calidæ sunt præternaturam, cæteris paribus, quæ naturam suam minus calida erat, indiget maioribus refrigerantibus quia scilicet, ea patitur maiorem lapsum. Itaque particulae natura indi-

cat quantum oporteat intendi vires auxiliorum, iam verò modum vtendi non aliunde accipimus quam ex parte. Non. N. in distinctè vtimur calidis potionibus, aut clisteribus, aut emplastris, aut eligmatis, aut errhinis, quæcunq; pars, frigida sit, sed si laborant intestina, infundimus clisterem, si ventriculus, potamus, si thorax, linctum sumimus, si caput, naso haurimus. Pars ergo indicat etiam vtendi modum, quæ eadem materiam etiam docet. Nam & si compertum sit calidis secundo gradu vtendum esse, ad affectum crus, & ad affectum ventriculum, non indistinctè quouis medicamento illo gradu calido vtimur. Sed est propria medicamentorum materia quæ singulis membris solet insigniter prodesse. cum ob causam ignoratâ, cuiusmodi multa sunt, tum etiam ob causam medicis compertam, vt ventriculi frigidis passiõibus prodest inunctio ex oleo nardino & absinthio magis, quàm ex aliquo alio eodem gradu calido, quia scilicet astringitione robur membri tuentur. Nimirum ventriculus & hepar, nunquam non exposcunt adstringens aliquid medicamentis admisceri. Itaq; vim, modum, & materiam medicamenti indicat pars. Ergo rogabis fortasse quomodo non pugnēt verba illa (quod si succus quispiam in ipsius ventriculi tunicis contineatur nausea quidem vexabit sed inanis & sine vomitu, & quæ irritat duntaxat nullum humorem euacuans quemadmodum fieri solet vbi secundum internam spatij latitudinem in vētriculo humor cōtinetur)

tinetur) cum illis prioribus, si humor in tunicis ventriculi imbibitur, vt ad calidum nausea & sitis magis consequitur, ita à frigido, ciborum cupiditas excitari solet. Nam illic alseritur, si humor in tunicis imbibitus est, nauseam inanem sequi, hic verò dicitur aliquando ab humore imbibito appetentiam ciborum excitari: quæ simul accidere non possint. Nam ventriculus nauseabundus cibos auersatur, qui appetit, non auersatur. Cæterum re vera hæc loca non pugnant. non. N. Gal. hoc secundo loco docere vult quemcunq; humorem imbibitum nauseam facere, sed si humor imbibitus nauseam facit, eam facere inanem, contra ac humor in cauo contentus. Ergo præcipit hic Gal. in ructibus acidis vti medicamēto diatrion pipereon, in nidorosis hiera simplici ex aloë. quod tamen ipse minus videtur obseruasse. Nam. 8. mett. cap. 5. in nidorosis præstat diatrion pipereon, & 6. de tuenda valetudine crudis succis ventriculo affixis præstat hieram, solum damnans aloem, & absinthium. Scire licet medicamentum diatrion pipereon, aut esse simplex, aut medicamentosum simplicis compositio est apud Gal. 4. de tuenda valetudine ex tribus piperis generib⁹ & aniso, thimo, & gingibere: nulla præterea re addita. Medicamentosum constat ex pluribus rebus, estq; multò potentius. Tale est quod describitur à Mesue. Medicamentoso haud licet vti nisi in frigido affectu, hoc simplici in quocunq; genere cruditatum, minori tamen copia in corruptionibus ni-

dorosis, maiori in acidis. hiera quoq; simplex à Gal. componitur. 6. de tuenda valetudine, cuius tres cōpositionis modos habere se dicit, secundum aloes quantitatem. Ea constat sex aromatum speciebus, & aloë. Multi alij modi hieræ compositæ sunt. Illarum verò hic non est vsus de simplici loquitur Gal. hac vtendum est ad humores biliosos in ventriculi tunicis contentos, hos. N. expurgat licet tamen etiam ea vti ad frigidos affectus, calorifica. N. etiam est, & incindens, aloë verò sola nullatenus licet, succis pituitosis impactis vti, quia adstringendo inculcat magis humores. hac. Ergo ratione est aduersissima tunc temporis, non tamen proinde & hiera, quippe in qua emendatur quodammodo adstrictio. Quia ab aromatis alijs iuuatur incisio & deterfio. Quare ad frigidas passiones cōtulerit parare nobis ex minori aloes quantitate, & aliorum maiori. Absinthium quoq; dicit loco citato esse ad pituitosos succos aduersissimum, eadem omnino ratione. Ego verò non putauerim nostrum absinthium in vtile ad expurgandum succos pituitosos est. N. amarum valde, & foetidum quare adstringens nil fere, detergens verò insigniter. Sed est aduersissimum absinthium ponticum, de quo. 11. meth. cap. 16. disputat. Itaq; ex nostro absinthio parata potio, pderit ad quoscūq; succos, è ventriculo euacuandos. hiera picra nō licet vti tam crebro, ac sine intermissione, quam medicamento diatrion pipereon, vt Gal. 6. de tuenda valetudine his verbis monet. Verū assidue vti hoc
medica-

medicamento non licet, sicut diatrion pipercon, aut diacalaminthes, quibus etiam si quotidie vtatur quem frigidus venter infestat, nil in commodi ex his sentiet. Itaq; & si Gal. hic dicat loquens de ambobus his medicamentis, si ipsis ita perseveraueris, homo sanitati restituetur, tamen sit in vno quoq; suus modus perseverantia. Diatrion pipercon quotidie sumi potest ad frigidos affectus, ad calidos rarius. Hiera picra ad nullum affectum sumatur quotidie. Nam in frigidorum redundantia lædit aloes ad stritione, in calidorum, calore. Itaq; melius est hanc ex longioribus intervallis sumi.

SIC equidem quosdā colicos vocatos sanavi dato in potu medicamento ex aloes. quippe coniiciens mordacē humorem in patientis intestini tunicas imbibitum esse, dedi autem hoc medicamentum quòd scirem omnino ab ipso huiusmodi passionem fore quietiorē, quòd vbi contigit intelligens recta me ductum coniectura rursus plus ipsius exhibui, sed quid me ad hanc coniecturam promouerit, operæ pretium fuerit enarrare. Vidi hominē à calidis tum

f s cibis

cibis, tùm medicamentis atque ab omni calorigifica victus ratione irritare, rursus iuari ab alimentis boni succi & attemperantibus insuper mediam ei noxam referre, doloris verò speciem percontanti mihi mordacem esse respondit, quia de re multo magis sperans ad veram me peruenisse notitiã ausus sum amarum ei medicamentum exhibere. Postremò conspiciens hominẽ mirificè adiutum quæ passio esset efficaciter me deprehendisse putavi. Fuit alter quem

i. S. Juan de la Cruz, la
endo comido en
una los comidos
en y una poma
irritacion tanto
intestinos y
cuando una de
das habituales
nales enterias
exornage, con
en mucha sile
rracea casi de continuo, comida el alimento, no
ria el dolor, tenia una excrecion: comi los va-
rientos demulcentes. el extracto de opio aguiro: y la
locativas: una y otra me quedo mejor q. havia
tuos hacia muchos años para podia comer de esto.

ciperet ex hepate redundantes succos qui
deinde corrūperentur cibum exhibui haud
ita facilem corruptu & astringentem, vnde
& mordaces dolores mitigati sunt, & nihil
postea excreuit, cū antea protinus vt
mordacitatem sentiebat, corrupta quēdam
& liquida & fœtentia exernere cogeretur,
cūque multò post mordicationem tem-
pore ea deiceret ad superiora intestina pas-
sionem pertinere conieci. Ita in alio quoq;
vbi celeriter à mordicatione sequebatur ex-
cretio passionem ad intestina inferiora reta-
li. Hunc ego iniecto per clisterem medica-
mento, illum verò dictis iam cibis exhibitis
fanaui, quippe certò sciebam proximas vē-
triculo partes exhibitis supernè tūm cibis
tūm potibus, quæ verò nō ita multū à sede
distant inferne iniectis medicamētis prom-
ptius adiuuari, cæterū, non solūm an vē-
trculus, an intestinorum aliquod patiatur,
verūm etiā quæ passio vrgeat cōsiderandū,
atque

atq; distinguendū, quænam notæ passionibus propriæ sint, quænam partibus patiētibus vt cōcoctio sublata ventriculi est accidens, at ciborum ad nidorosum vel acidum ructum conuersio ad causas & passiones ipsas referenda est. Sic autem de intestinis & tempus exitus & excrementorum species atque accidentium differentia cum his quæ præcesserunt, & nunc adsunt simul & passionem ipsam & partem in qua consistit ostendere possunt. Ergo age vt per ventrem deiciantur, aliquando quidem crustæ, aut veluti membranarum rasura aut cruentum aliquid atque aliquando simul omnia: intestinum vlcere affectum nemo dubitauerit. Atque verò vtrum in exilibus intestinis an crassis vlcus consistat, nōdum manifestum est, sed vt nuper dicebamus, & ex rasura & exitus tempore, & vt tertium addatur, ex mixtione cum stercore vt modo magis, modo minus, interdum nequaquam misceatur

disting-

distinguere oportet, quippe infirmarum partium vlcera, nullas omnino vlcerum habent notas, alui excrementis admixtas. Earum verò partium quæ paulo altius collocatæ sunt, mixtas quidem cum stercore habent notas, sed id leuiter duntaxat, quæ admodum si multo sint altiores vehementior erit mixtura, præcipuè verò in sup̄mis intestinis, vlceris notæ vehementer sterco-ri videntur admixtæ.

SCHOLIUM.

Eπιμεγασιχῶς, id est attemperantes cibos appellat Gal. eos qui acrium succorum qualitatem corrigunt, cuius modi qui boni succi sunt, neq; tamen, facilis concoctionis.

CAP. V.

Releſtiuncula.

Hoc capite Gal. colligit ex omnibus antea dictis, refertq; signa quibus cognoscuntur loca patientia, & quibus cognoscuntur passionēs. Locorum patientium, sunt quinque

quinque signa, actio læsa, excrementa, positus, doloris proprietas, propria accidentia. passionis sunt signa totidem, species læsæ actionis, species excrementorum, loci natura, doloris proprietas, propria accidentia. Singulorum exempla scribit Galenus.



PRO accidit sæpenumero, vt ex vno indicio simul & locus, & passio deprehendantur, aut locus vnà cum causa.

*signa cognoscit
lo cui affectus*

Veluti locorum notæ & ab actione læsa, & excrementis, & positu, & doloris proprietate & propriis accidentibus sumuntur, passionum verò, & ab excrementorum specie, & loci natura & doloris proprietate & propriis accidentibus.

*huc enumerat
quæ cognoscit
in postea ponit*

*modo actio læsa
indicatio cuius
exempla*

Sane actio læsa patientem partem indicare potest, & quidem hoc modo si. N. accidēs aliquod circa cernendi officiū euenerit, oculum pati cōstat verūm an propria passione an per consensum an utroq; modo laboret alia consideratione inquirendum.

*retra etiam indi-
cat quæ in affectu
essentie proprie
tem vix ex breue*

excrementorum species patientem partem indicat

dicat veluti iam antea dictum est & per partem
 tium ipsius essentiam & per contenta in ip-
 sa, atque & ipse positus patientem locum
 manifestè monstrat durus igitur tumor in
 dextra Hypochondriorum parte non lie-
 nis, sed iecinoris affectus nota est: quæadmo-
 dū si fuerit in sinistra non hepatis, sed sple-
 nis affectum portendit ac positus interdum
 ubi similiter se habent excrementa patientem
 partem coindicat. Si. N. membrano-
 se tunicæ frustulum excernatur, id vlcus
 esse alicubi ostendit verū in qua sit par-
 ticula exposito discere potes, nam si vo-
 mendo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ven-
 triculi, si tussiendo summi gutturis aut as-
 peræ arteriæ, si excreando faucium, si cū vri-
 na eiusmæ si à sede, alicuius intestinorum si
 per mulieris pudēda, vteri affectū portēdit.
 At verò cōstat quòd singuli dolores p po-
 situs varietate affectū locū ostēdere possunt
 hoc etiā pacto ea quæ suprà proposuimus
 distin-

distinguere oportet. Quippe apparentibus per vomitum vlceris notis animaduertendum est vtrum anterioris partis circa hypochondria aut posterioris circa dorsum dolor aliquis infestet, & N. qui in anterioribus percipitur ventriculū, qui verò in posterioribus gulam occupare censetur, haud aliter ob ventriculi ab spacio ipsius distinguendum est si deuocatis quibusdam acribus hoc quidem in ore ventriculi aut in parte inferiori mordicationem excitet, illud verò in transitu per toracem omnia. N. hæc positu definiuntur.

*3. Aris. Spe in no
it. A. inf. a. f. e. f. u. s.*
Quemadmodum aliæ
ex doloris specie, verum de doloribus la-
tius in 2. lib. dicemus. sed nunc exemplum

*origis. elion. ac
antib. f.*
a. g. f. a. h. d. u. m
in. p. o. a. t. u. e. n. t. i. u. s.
in. a. b. h. a. r. e. i. t. f. i. s.
it. a. c. c. i. d. i. t. r. a. t. i. o.
sp. a. b. h. e. r. e. f. a. l. t.
u. i. r. i. t. a. b. h. u. e.
u. t. r. i. c. u. l. i. n. o. t. e.
et. q. u. i. d. e. m. d. o.
et. a. b. h. u. e. i. t. e. p. a. t.
in. t. e. r. i. o. r. i. u. s. n. o. t. e.
u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. n. o.
in. p. e. r. i. o. r. i. u. s.
in. t. e. r. i. o. r. i. u. s.

aliquod afferre operperætium videtur, quo
modo scilicet locus ex propriis passionis acci-
dētibus innotescat, nā supradiximus singula
quæ vlceribus adnascuntur propriam indi-
cationem habere. id verò in præsentia sub-
iiciendum est, ore quidem ventriculi patien-

te

te fastidium infestat. per hepatis verò imbecillitatem excrementa per aluum deiecta aquæ in qua carnes nuper mactatæ ablutæ fuerunt similia sunt. Item maxillæ rubræ apparent in peripneumonicis.

S C H O L I V M.

VTROBIQUE Gal. & vbi refert signa loci patientis, & vbi signa pathematis, intelligit accidentia propria morbo. nimirum per accidentia morbo propria cognosci potest locus qui patitur. Sunt propria accidentia, vt ipsemet docet, id est, de crisi-
bus, quæ simul inuadunt cum morbo. Ergo modi quo ex positu cognoscitur locus patiens, dixit multa exempla. quia positus multis modis significat nimirum indicat per se, & distinguit etiam alia signa, cum ea esse contingit, multis partibus communia. Vnde constat decipi Fuschium putantem Galen. vbi inquit (at verò constat quod singuli dolores) exempla scribere argumenti sumpti à doloris proprietate. nam re vera illic nulla mentio fit speciei doloris siue sit mordens, siue grauians, siue pungens, sed positus dolentis particulæ, vt non per doloris speciem, sed per suum positum dolens particula dignoscatur, quòd bre-
uissimè

98 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
 uissimè dixit Hippocrat. sententia illa, vbi dolor
 ibi morbus. Ergo quòd de gula & ventriculo di-
 cit, pendet ex dissectione. Gale. sexto, de vsu par-
 tium docet gulam vsque ad nonam vertebra-
 thoracis affixam esse spinæ, illic eleuari versus
 anteriorem simul & sinistram partem, proinde
 laborante gula medicamenta imponi debent spi-
 næ à tergo, laborante ventriculo anteriori parti
 vt dicitur 13. methodi. Ergo vbi dicit (si cum v-
 rina eius viæ) intelligi debet nomine viæ vrinae
 (Græcè *σπυγγα*) non tantum collum sed & vesica
 & eius collum. Non. N. in hoc tantum potest esse
 vlcus ex quo prodeat ramentum, sed etiam in ve-
 fica. Ergo proprietatis doloris nullum exemplum
 hic scripsit, quia toto libro secundo nulla alia de
 re est acturus. Tamen ex doloris proprietate co-
 gnosci nonnunquam patientem locum nonnun-
 quam passionem, facilè fuerit exemplis indicare.
 dolor pungens significat inflammata pleuram,
 dolor grauens laborans hepar, dolor pulsans in-
 flammationem. *in parte arteriosa aut ipsa arteria*

*alia quingenta
 vnguentis a facie
 propria videntur
 et excreta*

QVINETIAM propriæ passio-
 num ipsarum notæ in excremen-
 tis deprehenduntur vt crusta vlce-
 ris, si in vrina sabulosum residet lapidis,
 cucurbitæ verò seminibus similia excre-
 menta

menta latorum vermium indicia sunt.)
Atque à locis ipsis morborum indicia su-
muntur, eò q̃ quibusdā solis morbus hic
accidat, quibusdā verò solis nunquam
accidat. quippe soli oculi suffusione labo-
rant, lapis in renibus & vesica duntaxat
nascitur, atque vt nonnullis placet etiam
in collo, lumbrici in intestinis gignuntur.
rursus impossibile est vt abscessum cor su-
stineat, quemadmodum neque pulmo ne-
que ligamenta dolorem. / Ab accidentium
quoque proprietate passionum indicia o-
riuntur. nam quibusdā per tabidos mor-
bos vngues adunci euadunt. intempesti-
uus rigor cum febre inflammationis ad
suppurationem transeuntis indicium est.
lingua nigricans ardentem febrem porten-
dit, sic etiam coloris in vniuerso corpore
proprietas, alia quidem per hepatis, alia
verò per splenis passiones apparet, ita vt
doctum medicum haud quaquam possit
g 2 fallere

fallere: sicut ne color quidem quem hemorrhoides induxerunt, cæterum, pauca admodum sunt ipsarum passionum notæ quæ non simul locum patientem ostendant, & N. Vt actionum noxæ patientem *x actione lesa* duntaxat particulam ita earum differentia ipsius passionem declarant. Hæc ergo sola sunt passionum propria signa secundum aliquid quod illis accidit sequentia, id verò clarius in *ris sponte exen* *de eo n. latius* *putant in 22* *huius operis* *niuerso* huius operis discursu patebit, nec non videbuntur communes quoque notæ quæ simul & passionem & sedem patientem aut duas passiones aut duas particulas indicare possint.

SCHOLIUM.

A L O C I natura ad morbum duplex est ratio argumentandi, alia affirmans, alia negans, affirmans prorsus habet debile argumentum, sed alijs attestantibus auget coniecturam, ut locus dolens est ren (attestantibus alijs) ergo affectio est lapi, hæc N. pars hoc modo solet laborare, ea per sola solet. unde prodit argumentum negatiuum hoc modo. Dolor

1^o or est in hepate. ergo nō est lapis. laborat cor, ergo
 morbus nō est abscessus. lapidem in solis renibus &
 vesica generari dicit G. addit q; atq; vt nōnullis pla
 cet etiā in collo, haud dubium innuēs se nunquā in
 collo vidisse lapidē, neq; alio in loco prater renes
 & vesicā. Trallianus li. 5. c. 4. asserit vidisse se tussire
 iectum verum lapidē, quidā mihi retulit extraxisse
 se ex recto intestino lapidē permagnū, ego haften?
 extra renes aut vesicā non vidi, neq; Ga. viderat cū
 hoc opus scripsit: nā etsi ca. vlti. li. 4. refert vidisse
 se grandini similes ē pulmone reiectos lapillos illi
 tamen nō erant modo substantię similes lapidibus re
 num aut vesicę, sed lōgē diuersi, verū quāquā a
 libi generari lapis possit) non N. abroganda alijs fi
 des est) cū illud rarissimū sit, possit medicus do
 ctrinali assertione dicere, lapidē in renibus aut ve
 sica semper generari. Ergo lumbricorum est triplex
 genus, rotundi, lati, & ascarides. rotūdi sunt longitu
 dinis palmaris figurę rotundę. lati sunt longissimi
 figura ampli zonę similes. hi autore Plinio. tricenū
 cubitorū visi sunt, sed Ga. autore per omnia intesti
 na protēdi possunt. Ascarides sunt minimi quidam
 vermiculi vermes omnes in intestinis generari ac
 nullos in ventriculo docuit Arist. lib. 4. Meteoton
 ca. 3. causam in illius loci cōmentarijs quę superio
 ri anno emisi reddidi, modo illud sit satis dicere
 Ga. subscribere Arist. sentētię hoc loco & 3. Apho.
 vbi docet rotūdos generari in intestinis gracilibus
 ascarides in ipso podice, latos p tota intestina, itaq;

si qui vermes in ventriculo cōtinentur, eos ex inte-
 stinis ascēdisse dicuntur hi autores nilominus Ama-
 tus Lusitanus cōtendit illos posse in vētriculo gene-
 rari, nil horum autoritate permotus, certē vt ex his
 quæ dicimus in dictis cōmētarijs colligi potest, neu-
 tra harū sententiarū potest mōstrari. quare neq; al-
 tera cōvinci: nō tamē est quōd repugnemus, tantis
 autoribus, cūm probabili ducātur ratione, quā illic
 scripsi & nō possis euidēti experimento explorare,
 vermis qui in vētriculo cōtinetur, fuerit illic geni-
 tus, an ab intestinis ascenderit. Ergo species læsæ a-
 ctionis significat pathema, vt visio per quā appare-
 ant res omnes duplices, significat inuerlā esse pupil-
 lā, tamē nō proinde opus est, quintū aliud signi ge-
 nus addere dictis quatuor, quia species læsæ actiōis
 cōtinetur in accidētibus proprijs. Ergo vbi ego le-
 gi hæc ergo sola sunt passionū propria signa, secun-
 dū aliquid quod ipsis accidit sequētia, legit Fuhlīus
 quæ secundum accidens consequuntur, atq; sedu-
 ctus verbis, decerrat in enarratione. nam inquit, hæc
 accidētia sequētur pathemata p accidēs. i. per aliud
 per affectū. s. tamē fallitur, nā hic Ga. quāquā nomi-
 ne pathematis vtitur, intelligit morbū quēcūq; si-
 ue factus sit, siue fiēs, siue partim vtrūq; nā dicta si-
 gna nō sunt cōparata ad dignoscendū solas passio-
 nes, ac non etiā affectus particularū, nō est ergo ita
 legendū, siquidē actiones læsæ quæ inter dicta signa
 cōnumeratæ sunt, nō sequuntur morbos per accidēs
 cūm morbus sit affectus præter naturā, lædens ope-
 rationes

quanq̃ nihil refert si eas primarias nomina-
 re volueris. quippe satius est rerū diferētias
 intelligere q̃ cōtēdere de nominibꝫ, sanē cū
 vel vapores vitiosi vel ipsi quoq; humores
 à vētriculo ad caput ascēdūt, & mēs lēditur
 primogenea quidē passione tū cerebrū labo-
 rare dicēt nemo, quāq̃ omni passiōe carere
 ipsū haud quāq̃ defēdi potest. verū q̃ p ver
 bū consentire de illis ipsis est in confesso id
 oīno verissimū est, quippe ex hoc vocabulo
 p cōsēntū pati partē non penitus à passione
 esse liberatēd ipsā cū alia pati declaratur. atq;
 melius clariū q̃ enarraueris si eā partē quæ
 p cōsēntū patitur ab altera pati dixeris, ergo
 q̃ multi medicorū veluti tōniātes oblcure
 intellexerūt atq; ipsū vtpotē nō intelligētes
 haud quaquā clarē enūciauerunt, id equidē
 veluti instituto operis perq̃ necessariū doce-
 re aggredior inde tūpto initio: sunt nōnullæ
 ac tiones quæ idonea indigētes materia ipsā
 ab aliis partibus præparatā accipiūt, qua de
 re

autem propriū est q̃
 dicitur de sensu pa-
 tiētiū in ista
 passione et fructu
 et patiētiā acci-
 piētiā / et fructu
 galienus sabbatini
 a Galienus per se
 carpatū q̃ fructu
 et patiētiā acci-
 piētiā q̃ per se
 patiētiā pati au-
 ti fructu acci-

re interdū optima ratione fit vt nulla existēte in actionis cuiuspiā p̄priis instrumētis noxa actionē ipsā perire cōtingat defectu. s. materie, ex qua fieri cōsuevit veluti, in voce res sese habēt. Nā in li. quē de ipsa cōscripsim⁹ ostēsum, iā est q̄ efflatus materia quidē vocis est, & efficiūt eū contracto thorace intercostales muscoli. Ergo his nil agētibus animal vocē amittit, & quidē nulla interdum in p̄priis vocis particulis apparēte passione. Sunt verò huiusmodi, partes sūmatim quidē loquēdo totū summū guttur, si verò particularim explicare volueris sunt tres cartilaginee à tribus motæ musculis q̄bus accedūt nerui à cerebro demissi est præterea in gutture sūu. *oligula* græci (*γλωττίδα* vocāt) hæc maximè p̄priū vocis instrumentū est. & N. cū moderate & aperitur & cōmittitur vocē efficit quanq̄ vocē reddi impossibile est nisi vehemēter spiritus egrediatur id verò intercostales musculi perficiunt.

SCHOLIVM.

*Voce legē ar.
b. s. de g. an.
p. 7.*

QUATVOR hæc sunt quæ sibi præstant materiã, alia alijs hoc ordine. Expiratio efflatio-
 ni, efflatio voci, vox sermoni. efflatio est vehemens,
 ac violenta spiratio. Proinde docente Gal. libello
 de causis respirationis ad expirationē sufficit mo-
 tus septi transuersi, ad efflationem opus est motu
 musculorum intercostaliũ, quos Gal. lib. citato. 22.
 esse numero refert, singulis spatij quæ inter. 12. co-
 stas vñdecim sunt binos, eosq; vtrinq; vt cū toti-
 dem sint in altero latere, fiāt intercostales musculi.
 44. quorũ. 22. sunt externi. 22. interni. Andreas Ve-
 salius de medicina hac in parte optimè meritis lib.
 2. ca. 35. merito addit alios. 12. vtrinq; vt omnes fiāt.
 68. scilicet qui inter spatia costarum verarum sunt
 non pertingunt vsq; ad os pectoris, sed finiunt an-
 tequã illæ degenerent in cartilagines, illincq; binī,
 alij in singulis spatij, quod reliquum est vsq; ad os
 implēt, priorib; ipsis fibris cōtra positi, vt vel hinc
 costet alios eos esse, cum ergo sint veræ costæ septē
 erut spatia sex, & musculi. 12. hos musculos Ga. præ-
 senti loco in distinctē, dicit expirationem facere,
 quanquã lib. citato internos dicit expirationem, &
 externos inspirationē facere. Cæterum, quantũ ego
 intelligo, rectè censet Vesalius dicto in cap. omnes
 hos esse gratia expirationis conditos. Nā vt ille in-
 quit illarum positus, id abudē declaratur, nimirum
 autē nisi mi. 2. aut cor. plures sunt.

externi

externi veniunt obliquè à costa superiori ad inferiorem, interni ab inferiori ad superiorem, à quacunq; earum in sibi proximā, cum ergo nullus eorū moueri possit aliter quā cōtractus versūs suā radicē, constat vtrosq; illorū cum mouētur adducere costas ad se ipsas, externos inferiores ad superiores internos superiores ad inferiores. Sed adductis costis necesse est strictiorē reddit horacē, & ita expirare, vt cōtra abductis à seipsis fieri latiorē, & inspirare. Agitur ergo expiratio omnib⁹ musculis inter costalib⁹. Ergo quomō cōstruēt⁹ sit larinx ex trib⁹ cartilaginib⁹, & quibus moueatur musculis vide apud G. 7. de vsu partiū cap. 11. ex quo loco cōstat subscribēte illi experimēto laryngē habere. 12. musculos proprios & 8. cōmunes. 12. proprij mouēt solas tres cartilagines laringis. 8. claudentes, & 4. aperientes. quare non dubiū est, corruptum esse locū hunc, vbi dicitur & musculi ipsam mouētes tres, & deprauatū grēcū codicē (nā & ille habet ita) : sed legendū & musculi ipsas mouētes, aut ita verba construere oportebit, & musculi ipsas tres mouētes, vt ita significētur musculi, à quib⁹ solæ tres cartilagines mouētur sed quia videtur hæc in elegās cōstruētio, & G. solet loqui semp̄ elegātissimè suspicor dictionē illā tres reducere & ab ipso nequaquā scriptā. Ergo addit cū nervis à capite veniētib⁹. Vocātur verò à cerebro demissi nerui qui nō per spinā sed ab ipso cerebro per se prodeūt quorū esse. 7. paria, atq; à sexto pari ramulos mitti in omnes musculos laringis proprios

prios & cōmunes, exceptis duobus qui ab ole hioy-
de ad cartilaginē enīformē veniūt, qui ex septima
cōiugatione ramulos accipiūt, docuit. G. li. de disie-
ctione neruorū. Ergo quid sit glottis aut ligula dixi-
mus, cap. huius lib. quodq; præsenti in loco haud
quaquam debet legi ἐπιγλώττης sed γλώττης.

CECIDIT quidam ab alto ita vt
dorsi initium terræ illideret, is tertio
die exiguam admodum vocem emi-
sit, quarto deinde die omnino obmutuit re-
solutaq; simul, fuerūt crura manibus om-
nino illesis, sed neq; spirationem amitte-
bat, nec difficulter spirabat cū. N. tota sub
cervice spina esset resoluta accidit thoraci,
vt per septum transversum, & mūsculos
super nos numero quidem. 6. moueretur.
Quippe nerui ex spinali medulla quæ in
cervice est ipsis adueniunt. At intercostaliū
mūsculorum nerui per quos efflatum fieri
diximus omnes affecti erāt. Cū itaq; fru-
stra medici negotium subirent circa crura
quidem vt potè soluta, circa summum
gut-

guttur verò , propter vocis affectum equidem id interdixi, atq; affecto duntaxat loco curationem adhibui. Proinde finita tādē spine inflammatione à septimodie vox restituta est iuueni , & crura motionis facultatem recuperauerūt. Huiusmodi ergo noxę speciem magis propriè per consensum euenire dixeris quàm vbi ab humoribus in ventriculo contentis caput dolore tentatur. Quippe per huiusmodi affectiones eleuatur ad ipsum aliquid, sed in dictis nuper affectionibus nil noxium ad crura defertur. Nam contra priuatur ea facultate , quam antea spinalis medulla ipsis suppeditabat. Guttur verò summum cū vox ablata est non omnino priuatur spiritu, quippe spirare animal per ipsum etiam dum videmus. At verò efflatum amittit qui quidem fieri solet cū affatim plurimus spiritus per summum guttur animalis foras effertur. Sed de nominibus contendere cæteris permittit-

mittamus nobis. N. res quas illi penitus ignorant pertractare satis fuerit. Quippe aliter dolet caput ubi contenti in ventriculo humores eleuantur qui simul, & calfacere, & distendere caput possunt, atque aliter suffusorum apparent visa quædam, neque calfactis, neque intentis oculis, sed solo vapore per ipsos transeunte. Præterea aliter affici videtur, is qui nō videt, quia meatus à cerebro descendens obstructus est, aliter ille (quamuis hic quodammodo sit similis) cui propter spinalis medullæ inflammationem resoluta sunt crura, atque aliter, is cui vox, aut periit, aut vitata est, &. N. ad crura facultas, quædam sed citra essentiam descendere prohibita est, ad oculos verò cum essentia, verum ad summum guttur quamuis mandata perueniat, sufficiens tamen ipsius quantitas, haud quanquam accidit. Qui verò ob inter costalium muscutorum perforationem

tionem obmutuit, is totam vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura per dictas spinalis medullæ affectiones resolvuntur. Ita etiam guttur summum vocalibus nervis, vel incisus vel laqueo interceptis (vocare autem vocales, nervos consuevi, eos quos ipse inveni. Nam præceptores mei, eos duntaxat, qui ad arterias pertinent cognoscebant) cæterum ob horum quoque vitia, vox perire solet, quoniam proprii gutturis summi nervi, quos equidem recurrentes nominare, sum solitus, ipsorum essentia pars esse censentur. Sed cum in multas alias partes distribuuntur magis propriam, quam nervorum vocalium appellationem non retinent, quæ propria est instrumentorum vocem concinnantium, atque idem est modus quò summi gutturis muscoli læduntur, siue recurrentes nervi, siue hi qui iuxta arterias sunt vitientur.

Vtrinque

Vtrinqꝫ. N. animalis facultas desideratur sine qua à consilio, & voluntatis imperio moueri non possunt & quidem incisus musculus qui ligulam (id est glottida) mouent, animal penitus mutum euadit. Sed neqꝫ simili omnino modo neqꝫ etiam in totum diuerso si nerui læsi fuerint, nam vtriusqꝫ noxa hoc cum altera habet commune qꝫ ligula continuitate quam adinuens principium habet priuatur. Id verò fieri solet siue netuus siue musculus incidatur aut laqueo intercipiatur aut cōtundatur aut quomodolibet aliter virietur, equidem vocem vitiatam fuisse memini, adeò vt pene perderetur in frigidatis vehementer neruis, recurrentibus in chirurgia quadam circa collum per hyemen. Quod cum intelligerem caloricis remediis naturalem temperaturam neruis restituens, vocem reuocaui. Cæterum vt ob materiæ priuationem perforato thorace, ita etiam aspera arteria tota incisa

incisa vox perit, quod nullus super sit spi-
 ritus qui ad propriū vocis instrumentum
 trāsmittatur, idem efficit sed alio modo la-
 queus collo circumdatus, verū hic nō solūm
 mutū reddit animal sed etiā suffocat tollē-
 do scilicet spīrationē. Arteria autē dissecta
 voci quidem nocet, sed animal respiratione
 nō priuat. Angina verò vocata cū sit inter- *angina*
 narū summi gutturis partiū inflammatio
 strāgulationi proportionē respōdens respi-
 rationē tollere potest: ipsius meatū obstruē-
 do. Idcirco vocalis instrumēti maximè pro-
 prius affectus est, deinceps externorū ipsius
 muscutorū noxa est. Cæteras partes om-
 nes quarū meminimus nō propriè sed per
 cōsensum potiùs afficit. Cū itaq; ex cerui-
 ce quidā cheradas, idest strumas in profun-
 do incūbētes excideret & præformidine ne
 vas aliquod discecaret pelliculas scalpello,
 nō incideret sed vnguibus euelleret: impru-
 dens ob ignorantia simul recurrētes nervos
 h distraxit

distraxi, atq; hoc pacto puerū liberauit à
 strumis, sed mutū reliquit. Quidā alius in
 alio puero sectionē faciens ipsum similiter
 semimutuum reddidit, læso videlicet altero
 dūtaxat neruo: mirabātur verò omnes quo
 pacto neq; aspera arteria, neq; summo gut-
 ture affecto vocē lædi cōtingeret, qui cum
 vocales neruos (me ostēdete) cōspicerēt ad-
 mirari desierunt. Quibus ergo partibus vel
 materiæ, vel facultatis copia non trāsmitti-
 tur: actionē lædi probabiliter dixeris: parte
 ipsam faciēte nequaquā læsa, at verò si vel
 à vaporibus vel humoribus aliūde ad ip-
 sam veniētibus lædatur, eā non rectè dixe-
 ris illæsam. Neq; minus etiam probabile
 est parte, vel materia, vel facultate priua-
 tam lædi, utiq; si officiū suum cū hæc reci-
 peret secūdū naturam exercere posset, pro-
 inde ex huiusmodi in vtranq; partē aggres-
 sione dialecticorū problematū cōsideratio,
 neq; ad affectuū notitiā, neq; ad curatio-
 nem

nein, neq; etiã ad futurorũ euentuũ præfagia quicquã vtilitatis afferre posse videtur.

SCHOLIUM.

MVSCVLIS intercostalibus adueniunt nervi ex vertebriis dorsii sibi è regione respondentibus, cruribus ex tribus vltimis lumborũ vertebriis & osse sacro. inflammata ergo aut vt cunque obstructa spina in principio dorsii necesse fuit hominem sensu & motu crurum atq; actione musculorum intercostaliũ priuari. Tamẽ quia septo trãverso veniunt musculi ex quinta, & sexta cõiugatione, ac nõnunquam cũ his quarta aut septima vertebriis colli, cõstat potuisse manere septum ille sum qd vnũ ad respirationẽ nõ violentã sufficiebat, vt dicitur ab eodẽ Gal. lib. de causis respirationis. Accedit, quòd manebãt (inquit Ga.) illi si sex musculi de collo descendẽtes ad respirationem facientes horũ musculorũ facit mentionẽ nõ minus libello dicto. Tamẽ ego nõ video qui musculi sint vtrinq; tres à collo descẽdentes, qui ad respirationẽ faciunt nisi is qui descendit è clavicula ad duas costas primas è collo descendẽs nũcupatur, & secũdus is qui è tribus vltimis colli vertebriis venit, sub spatula vsq; ad quatuor, primas costas & tertius quẽ à primis colli vertebriis, venire tradit Ga. qui tamẽ in hominibus non inuenitur ad constrictionem. thoracis faciens

null⁹ muscul⁹ seruat⁹ est in illo homine illæsus, sed
 ad expirationē sine efflatione nil refert. Nā hac do-
 cēte Gal. lib. de vsu, pulsus per otīū musculorū dila-
 tantiū fit, subsidente thorace sua spōte, sine actione
 aliqua animali. Brachia accipiunt nervos ex tribus
 vltimis vertebris colli & duabus primis dorsi. Qua-
 re non oportuit ea resolui in illo homine, cū plu-
 rimæ maximæq; nervorum ipsam subeuntium pro-
 ductiones ex collo sint: tamen omnino nil esse la-
 sa, non est verisimile, cū nervis ex duabus dorsi
 vertebris priuata essent. ~~Ergo~~ nervos opticos tra-
 dit Gal. 10. de vsu particularum esse cauos arteriæ
 cuiuspiam modo, quā cavitatem tamen non re-
 perias manifestè, vt primus monuit Andreas Vesa-
 lius. Cæterū vt cūq; neruuli illi habeant, illud
 videtur Gal. dicto lib. apertè monstrare, ad oculos
 non venire solam irradiationem è cerebro, vt ad
 alia omnia instrumenta sensus, sed substantiam etiā
 spirituum. Nam aliter (vt cætera argumenta taceā)
 non fieret vno oculo clauso, alterius pupilla duplo
 latior. neque verò in opinabile est per illos neruui-
 los, (qui quanquam manifeste excavati non sint,
 sunt tamen omnium mollissimi, & maximi, atq; ita
 minime densi,) spiritum venire, si quidem flatui,
 aut auræ multas particulas videmus esse peruias.
 Ergo de nervis recurrētibus vnde oriantur, & vn-
 de recurrant & in quos musculos inserantur lib. 7.
 de vsu partiū ca. 14. prolixè satis dixit G. illud mo-
 do monendum est eos esse ex .6. coniugatione, in
 seriā

feriq; in sex laryngis mŭsculos duos claudentes, & quatuor aperientes. Et sextam coniugationem descendere ex cerebri per illa eadē foramina per quæ intrāt arteriæ carotides. Quare proinde est eos nervos secare, aut cū iam recurrunt ad arterias. *Ergo* de anginae speciebus tacemus, modo dicturi cap. 4. lib. 4. de nervis etiam recurrētibus addemus aliqua cap. 8. illius lib.

CONSIDERA ergo quo pacto ego neq; attingēs ipsam narrabo curationē ex patientis loci notitia inuentā. Occurrit mihi quidā medicamentū tribus digitis adhibitū ostēdēs, dixitq; triginta iā diebus sentiēdi illorū facultatē se amisisse illæsa seruata motione, sed nil præsidii ab impositis medicamētis percipere. Ego verò, id quod in eius modi casibus facere cōsueui, ne tūm quidem obliuioni tradidi. Quippe vocato medico qui digitorū curationē susceperat, interrogavi cuiusmodi remedia adhibuisset, quæ cū intelligerem ad hāc rē esse idonea causam inuestigare cœpi cur nullū ab ipsis homo præsidium cōsecutus

h 3 fuisse

fuisset inquirens itaq; quæ præcefferāt acci-
 dentia inueni ipso dicente, neq; inflamma-
 tionē, neq; refrigerationē, neq; ictū præces-
 sisse, sed ipsum paulatim sensum perdidit-
 se, captus itaq; miratione rursus interroga-
 ui num superiorū partiū aliqua icta fuisset.
 ille respondit digitos quidē non fuisse ictos
 sed dorū initiū fuisse afflictū deinde quomo-
 do & quando id accidisset cū interrogarem
 respōdit se cū Romam proficisceretur à ve-
 hiculo decidisse, ac nō multo post digitorū
 incepisse læsionem quocirca coniecturā te-
 ci neruorum qui primi à septima vertebra
 procedūt partem quampiā ob:ictū fuisse in-
 flāmata[m] at nūc durā habere passionē, id
 scilicet intellexi doctus ex arte secandi cor-
 pora q; nerui per propriam circumscriptionē
 veluti venæ exoriri vidētur, adeo vt vnū
 quēq; exquisitè vnū esse putares quēadmo-
 dum & venā: verū protinus ab origine mul-
 ti sunt simul concreti & cōmunibus vincu-
 lis

lis quæ a cerebri mēbranis exoriuntur contēti, ergo neruorum qui à ceruice prodeūt, vltimi exigua pars ad minores peruenit digitos per cutem ipsos continentem, ac præterea per medii digiti dimidiam partem dispersa: quod verò cæteros medicos in magnam duxit admirationem, quòd dimidia duntaxat pars pateretur, id mihi persuasit potissimum eam tantum nerui partē quæ in cubito ab ipso egrediens in iam propositis digitis finitur esse læsam, ergo adhibendum ei medicamentum abicere iubens illi præcipuè spinæ parti quæ patientis particulæ principium obtinebat, ipsum apposui, secutâq; est res vt aspicientibus videbatur & admirabilis, & inopinabilis quòd digiti manus adhibitis spinæ medicamentis essent curati.

h 4

Scholium.

SCHOLIUM.

VBI ego legi quomodo neq; attingens ipsam
 (scilicet dialecticorum problematum consi-
 derationem) legit Copus, quàm ne attigi quidem,
 vt referat curationem. Quem verborum sensum
 constat esse falsum. Cùm illam curationem & atti-
 gerit & compleuerit Gal. vt sequens sermo decla-
 rat. Sed ille corripit locum putans in his verbis
μὴτε ἀγαμενος αὐτοῖς particulam *αὐτῆς* referre cu-
 rationem, refert tamen vt dixi, considerationem.
 Ergo conspicuus satis est ille nervus quem in homi-
 ne præsentis hystoriæ læsum esse dicit. Prodit ex
 prima vertebra dorsi, est furculus quarti nervi ve-
 nientium ad manum, decurrit per totum brachium
 per infernam & internam partem. Præterit articu-
 lum cubiti inter vlnam & internam extuberan-
 tiâ ossis brachij. In medio ferè vlnæ, aliquanto ma-
 gis versus brachiale secatur in duo ramulos, alter
 it ad internam partem manus, præstatq; furcu-
 los musculis mouentibus duos digitos, minimum, &
 annularē, & procedit per internam partem vsque
 ad extrema illorū alter. At in partem posteriorem,
 & desert sensum eisdem duobus digitis, & parti
 posteriori medię quamquam, dicti duo ramuli loco
 dicto primum separentur, constat tament vel ab
 ipsa

ipſa ſpina deduci è diuerſis fibris vt illæ eſſent qua ſi multi concreti nerui . Si ergo non tota radix ſed illa duntaxat, in ea, pars laſa fuit, quæ in cubito ſeparata, in cutem duorum digitorum cum dimidio erat emerſura, nil mirum laſum fuiſſe ſenſum ſeruato motu.

VERVM paſſione planè ſubmota, orta eſt inter medicos quæſtio quænam ſit eiſmodi neruorum affectio vt per ipſam ſeruato eorum motu ſenſus pereat. Equidem id ipſum dicebam quòd priores medici dicere ſolebant, quod ſcilicet ſenſus patièdo, motus verò facièdo aliquid ſit. Quapropter vt quis moueatur opus eſt robore, ſed vt ſentiat vel minima facultas ſufficit, cumquè rectè meum dixiſſe ſermonem putarent, quid ergo (inquam) num vi diſtis aliquando contra euenire, vt ſeruato ſenſu motus periret? tùm cæteris omnibus ſe nunquam conſpexiſſe dicentibus vnus id confiteri audebat ac nomine laborantis

rantiscitato testes quoque adhibiturum esse pollicebatur. At cum hoc cum proposita oratione de partibus motis illis quidem sed non sentientibus pugnare videretur) & N. quod ad illam rationem pertinet fieri haud quaquā potest, ut perduto sensu motus à voluntatis imperio prodiēs seruetur) rursus orabant, ut causam explicarē, quā obrem utrāq; appareant. Ea verò ut planè intelligunt hi qui neruorum dissectionem didicerunt, talis est.

SCHOLIUM.

HIC locus proculdubio corruptus fuit à librarijs, interpositis aut exclusis dictionibus. nam non fit cōtextus cōsentaneus. Nam videtur perinde differere, ac si propositum esset, habuisse hominem sensu sine motu, cum tamen contrarium propositū sit, & statim inquit, hoc quod seruato sensu motus periret, cum proposita oratione de maiori vi admo uendum quam ad sentiendum pugnare, cum tamen ab ea oratione confirmetur, ut licet videre capi. s. libr. 1. de causis sympto. Itaq; locus corruptus est. quæstionem ego decidi lib. 5. controuersiarum, quo loco

loco monſtraui in eadem exactè particula nerui non poſſe perire ſenſum ſeruato motu, quia motus conſiſtit in actione magis quam ſenſus, atque proinde maiori facultate & melius diſpoſito inſtrumēto habet opus, quare vtcūque tollatur, ſiue per ſublationem influxus facultatis, ſiue per intemperie particulae citius tollitur motus, quia citius deficit vis quæ ad motum eſt neceſſaria, quàm quæ ad ſenſum ſufficit, & motus minorem intemperiem ſuſtinere poteſt, quin tollatur, quam ſenſus eadem ratione.

OMNIS ab impetu prodiens motus ad muſculorum officium pertinet, quippe nullus neruorum per ſe ſine muſculo vllam huiusmodi in animantis particulis actionem efficere poteſt, ſed per muſculos omnes à conſilio & voluntate prodeuntes motus perficiunt. Ad partes verò mouendas muſculi ipſi aliquando quidem manifeſtè perueniunt, aliquando verò per medios tendones quos aponeuroſes aliqui cognominant, atque ex hoc genere ſunt tendones quibus digiti mouentur, haud

haud absimiles his qui tōn ab Hippocra.
 nominantur rotundi scilicet. si itaque mus-
 culorum nervos pati contingat motus di-
 gitorum perit, si verò eos qui ad cutem per-
 veniunt tangendi sensus corrumpitur, sed
 ubi tota resolvuntur membra, cum videli-
 cet commune principium affectum est, si-
 mul & sensus & motus pereunt, atq; tūm
 locum primario affectum ex læsorum ner-
 vorum multitudine duntaxat inuenire po-
 teris. Idque si exquisitè cognoueris cōmu-
 nia ipsorum principia quæ in nervorū dis-
 sectione percurrimus cum nullus ante me
 huiusmodi dissectionem accuratè tractas-
 set vtpotè nemine non plus minusvè erran-
 te. ergo solus ille qui in ipsis fuerit exercita-
 tus exquisitè considerare poterit in qua ver-
 tebra spinæ medulla laboret, siue tota siue
 altera eius pars patiat. Nam accidit vt
 dextra pars duntaxat patiat, altera omni-
 no illæsa, aut è contrario, vt illa manente
 integra

integra sola sinistra patiatur.

SCHOLIUM.

MI R O R Andream Vesalium virum alioqui modestum cap. 14. lib. 4. irridere hanc Gal. rationem qua contingit nonnunquam perire sensum sine motu, nonnunquam contrarium (idque non in eadem exactè particula vt statim diximus, sed in eodẽ membro, vt manu, aut digito) nam fortassis hic ipsum aliquis irrideat, qui ex his verbis intellexerit G. afferere p̄ alios nervos deferri sensum, per alios motum, cùm tamen Gal. suam sententiam paulò antè explicuerit, dicens ex eadẽ radice nervi alias fibras inferi in musculos: alias emergere in cutem, illàsque mouere, has minimè, non quod aliam vim deferant illæ, aliam hæ, sed quod in musculos inferantur illæ, propria motus instrumenta: hæ non: illæ quidem deferunt etiam sensum tactus. ceterum, quia delitescentes sub cute ac pinguedine sunt, minimè apparebat in proposita hystoriæ homine. itaque potuisset hic Andreas Vesalius abstinere à refutatione, ne dum ab irrisione.

AT Q V E hac ratione interdum tota sinistra pars resoluitur dextra parte manente illæsa, interdum cōtrà, dextra

tra pars duntaxat & læditur & resolvitur, Vbi verò non læsa spinæ medulla tantum vnusnerui processus læsus est, eas duntaxat pates resolutio consequitur, in quas nervus illæ resolutus est. Accidit N. interdum vt duo aut tres duntaxat neruorum processus lædantur quum interim spinæ medullam nulla noxa infestet. Sic laborabat ille qui per reliquas quidem manus partes omnes ita fuit resolutus, vt neque sentiret, neq; moueretur, sed in solis tribus digitis sensum habebat integrum. Porro cuidam alteri non solùm ipse sensus mansit illæsus, sed etiam eorum musculorum in quos neruorū propago sub septima vertebra exorta distribuitur, motiones seruatae sunt. Atque alius ob casum ab alto solos eos musculos resolutos habuit, qui huiusnerui partes suscipiunt. Idem etiam in his duntaxat cutis partibus sensum amisit, ad quas prædicti nerui ramusculi demittuntur, ergo si scire deside-

ras in qua vertebra sit affectus vtrum in sola nerui cuiuspiam propagine, an in spinali quoque medulla in neruorum dissectione te exercitatum esse oportet, communemq; habere methodum : quare solutos musculos vnà cum cute quæ sensum amiserit obserues, nā spinali medulla in aliqua vertebrarum affecta omnes partes inferiores resoluuntur. Quòd si in altera parte lædatur altera manente illæsa, partes duntaxat quæ illi directò respondent resolutio infestabit. Si verò nerui radix afficitur, reliquæ partes omnes affecto loco inferiores nil afficientur sed solæ illæ partes resoluuntur, in quas singuli nerui distribuuntur. Hæc si accuratè didiceris, circa resoluta membra reliqua spinæ medulla minimè occupaberis: huic N. adhibitis remediis partem affectam curabis. sic etiam si non circa spinam, sed in regione illam sequēte neruus afficitur, partim ex musculis, partim ex cute querendæ sunt notæ.

tæ. Cutem quidem facilè est cognoscere, nā oculis subiicitur, musculi verò ex actione quæ periit deprehéduntur. Proinde necesse est circa musculorum sectionem te exercites, vt cognoscas cuius actionis quilibet sit instrumentum, sic N. duntaxat discernere poteris partes quarum quidem actio perit, nullo morbo corporalem ipsarum essentiam infestante, aut in quibus præcedit morbus, vel fiens vel factus. Verùm morborum genera & differentias omnes ex eo didicisti libro qui de morborum differentia inscriptus est, atque similiter ex alio accidentium differentias at de causis vtrorúmque etiā separatim scriptum est: in vno quidem de morborum, in tribus verò de accidentium causis, in quibus exercitari oportet eum qui facilè voluerit inuenire discernereque & causam & passionem & sedem patientem, & N. fieri nō potest vt omnia per concursum doceantur, quamuis eorum qui ab experien

tia

tia empirici vocantur huiusmodi fuerit opinio : qui verò accuratè & prægressa & præsentia cognouerit accidentia, atque sic ad curandorum morborum experientiam via & ratione peruenerit, inueniet & locum patientem & simul ipsam passionem. atq; hoc magna ex parte continget in partibus quæ in intimo corpore cōstituuntur, veluti paulò antè de his qui sensum & motū perdididerunt ostendimus, atq; non ab re fortasse fuerit narrare quædã quæ iam facta fuerunt, cuiusmodi hæc sunt. Puer annorū ferè sex inuitus per aluum excrementa deicere incepit resolutò repentè circa sedem musculo : quinetiam seni quondam huiusmodi euenit accidens, atq; rursus alius puer ætatis ferè annorū quatuordecim excrementa inuitus per aluum deiecit, infestante simul vesicam dolore : atque alteri, vrina quoq; fuit suppressa. Contrà alius vrinam inuitus excreuit, atque alius nō solùm vrinam sed

i alui

alui quoque excrementa inuitus deiecit. In his omnibus ea quæ præcesserunt scrutari oportet. Nam omnino aut refrigeratam aut ictam ipsorum spinam arbitrādum est. sed frigus quidē vni duntaxat patienti musculo nocet, ictus verò magna ex parte pluribus noxam infert. nam perrarū est vt icta spina vnus lædatur musculus, quoniā nervi ex spinali medulla orti in plures musculos diuidūtur. sed & vbi ob ictum læsus est musculus, si superueniens inflammatio ob negligentiam induretur resolui ipsum contingit, quanquam id rarò accidere videatur at verò frigus sæpenumero vnū lædit musculus, eum maximè qui in superficie sedis est, siue sederit quis super lapidem frigidum, siue in aqua frigida supra modum fuerit versatus. Ergo puer cuius & vesica & sedes lædebatur cū in fluuio pisces venaretur, sic fuit affectus, nonnullis etiam in aqua frigida natantibus, itidem accidit hos
itaque

itaque sic affectos curare oportet, calida auxilia locis patientibus adhibendo, quibus verò neruorum à spinæ medulla ortorum quispiam fuerit læsus, ipsi spinæ adhibenda sunt remedia. Sæpenumero etiam ubi ab alto quis cecidit, aut vehementem fortémque ictum spina subiit, inflammatio ad plures partes extensa, non solum musculis sed vesicæ quoque noxam intulit, quibus ob vesicæ ipsius passionem vrina supprimitur. Sunt quibus non solum vrina, sed alui quoque excrementa penitus retinentur, læsis scilicet intestinis. Nam vt musculi læsi actiones à consilio & voluntate pendentes, ita & vesica & intestina naturales actiones lædere possunt, eo quod ipsis obuolutis excernuntur, ea quæ continent.

SCHOLIVM.

SI cerebrum cum spinali medulla geminum esset
 vt Gal. statuit lib. 10. de vsu partium, productio-
 nibus ex meningibus dissectum, non esset inuentu
 difficilis causa, quā altero latere in cerebro, aut spi-
 nae medulla, aut illius exortu septo, aut obstructo,
 aut vtcunque aliter laeso tota pars subiecta ab eo
 latere resoluitur, verū cū re vera nō ita habeat
 sed cerebri medulla vndiq; dissecta in extimis par-
 tibus ad quandam vsque profunditatem, in medio
 vnica fiat, coeatque in corpus callosum, quod ta-
 men totius cerebri est pars maxima, & continet o-
 mnes vētriculos intra sese: cumque medulla spinæ
 ab hac media basi exoriatur ex loco non dissecto
 meningibus, non dissecta, sed quantum sensus in-
 dicat. tota & integra, ac simplex, qui sit vt cum di-
 midium illius scissum est, facultas in inferiorem se-
 ctione partem ab altero latere non permeet, certē
 non possum aliam rationē excogitare, quā quod
 id lumen aut is splendor, qui à cerebro per spinæ
 medullam, & nervos distribuitur, per rectas fibras
 it, vt lumē solis per rectas lineas. Quare proinde est
 obstructam esse alteram partem spinæ, atque si in di-
 midiato corpore obiecta esset nubes. si quod lumen
 fingis per reflexas lineas venire, id respondebo ad
 nullas manifestas actiones esse satis. Hæc ratio nul-
 lo modo reddi potest, iuxta id quod Vesalius sibi
 persuasit, nervos scilicet nō necesse esse distribui in
 musculos

musculos, neque per capita, sed tantum præterire
 more venæ & arteriæ & ita facultatem in totū mu-
 sculum versus quaque distribuere, sed ego non ita
 statuo. Excogitet ille rationem, si quid potest, sin-
 minus permittat nobis cum Galeno sentire, de di-
 stributione nervorum in musculos, quanquam id
 sensus non percipiat, verum multa facit ratio sen-
 sui adiuncta. Ergo ubi Gal. inquit, alteri contigisse,
 ut reliquis quidem manuum partibus neque senti-
 ret neque moueretur, sed in solis tribus digitis sen-
 sum haberet integrum, quidam sine dictione tribus
 legunt in solis digitis, ut ita significetur omnes di-
 gitos sensum retinuisse, in meo codice *κατὰ δὲ
 τοὺς τρεῖς δακτύλους μόνους* cæterum parū refert,
 ita aut aliter legere. nam utrunque contingere po-
 tui, t per partem N. clatiorem brachij totius it ner-
 nus quidam, illi de quo locuti paulò ante sumus, è
 regione oppositus, qui ex sexta & septima vertebra
 colli perfectus. & prima & secunda dorsi, versus di-
 gitos tendens, per interiora mittens ramulum in
 musculos pollicis, indicis & medij, ad finem etiam
 digitorum decurrit. Per posteriora alium ad defe-
 rendum sensum eisdem digitis, & præterea dimidie
 parti annularis, ex quinta & sexta & septima colli
 vertebri, & prima dorsi venire constat. Itaq; digi-
 tis omnibus tribuitur sensus, à tribus illis nervis, qui
 à dictis vertebri orti ad summam manum demit-
 tuntur. Intellige ergo ut illi de quo locutus antea
 est Gal. contigerat, inferioris nervi eas fibras ad ra-

dicem lædi, quæ in illum ramum erant ante carpū enasuræ, ita huic illæfas esse eas ex toto illo nervo, & accidet tres tantum digitos sensum retinere. intelligere rursum illas quæ huius alterius nervi erant ramulum formaturæ, illæfas etiam manere, fietque vt amborum ramulis illæsis, digiti omnes sensum retineant, alijs omnibus partibus immotis & sine sensu. Quod si fingas alteri non illos tantum ramulos mansisse sine læsione, sed etiam totum eum nervum, qui ex septima vertebra procedit, eum inquam, qui minimo & annulari deferret sensum, retinebit tunc temporis homo non tantum digitorum sensum, sed motum etiam, trium, minimi, indicis & medij, & multos musculorum trahentium manum, non habebit immotos, impartitur N. illis ramulos hic nervus. Ergo occasione illius quod in fine capitis dictum est, animaduerte ictum in spina acceptum posse efficere vrinæ suppressionem, non quod motus quo se vesica circa lotium comprimit per nervos deferatur, cum animalis non sit, sed quod vesica priuetur sensu, quo priuata non irritatur. Sine irritatione verò nulla particula naturalis operari potest. Id docet Galenus sexto huius operis, capite quarto.

CAP. VII.

Relectiuncula.

Capite hoc docet instrumenta naturalia non posse lædi per compassionem, sed quæcunque symptomata vt naturalibus instrumentis illis accidunt primario patientibus accidere. Quia facultates naturales non sunt aliunde venientes, vt vitalis & animalis, vt per compassionem principiorum ledi possint, sed sunt singulis membris insite. Docet etiam exemplis distinguere symptomata quæ membris accidunt, vt naturalibus, & quæ vt animalibus instrumentis.



TQV E in hac re plurimū differūt naturalia ab animalibus instrumentis, si quidē naturalibus cognata actionis vim esse, animalibus verò instrumentis à principio, veluti lumen à sole ipsam defluere iam indicatum est. Ergo vt Magnes lapis in seipso habet vim qua ferum trahere potest, ita naturalia quoq; instrumenta omnia facultatem habent quæ actionem suam perficiunt. proinde si per-

manens fuisset ipforum essentia, neq; arteriis, neque venis indiguissent, verum quia nutrimento egent seruarique oportet innati caloris temperiem hanc ob causam & venis indigebant & arteriis, sunt etiam musculi ut essentiam suam seruari possint, non secus quam naturalia instrumenta & venis & arteriis indigent, at quia cognatum principium sensus & motus non habet, idcirco nervis per quos hoc ipsis influat semper indigent qui illis ea suppeditare possint, quemadmodum sol omnibus rebus quas illuminat splendorem affert. Quamobrem solis partibus quæ & sentiendi & mouendi vim habent, accidit ut ipsis interdum haud quaquã læsis, nihilominus earum actio pereat id quod naturalibus instrumentis accidere non solet. prius N. ea lædi necesse est q̃ actio lædatur: quin & animalibus instrumentis omnibus naturalis est distributio, quippe & arteriarum, & venarum adminiculo indigent ad essentiam

tiam ipsorum seruandam. Ideò accuratissimè intueri ac discernere oportet, quæ accidentia eis ea ratione qua aut naturalia, aut animalia sunt soleant cuenire, veluti alterari (vt ita dicā) à vicinis ipsis vt naturalibus: alterationem verò sentire, vt animatis euenit, sic oculis quoque sæpenumero cōtingit. Nā vapores à ventriculo elati ipsos omnino alterant. Verum tā exigua alteratio non ab omnibus sentitur nisi maxime sincerissimā habeant sentiendi facultatē voco autem maximè sinceram eam quæ minimas quasq̃ res cernere potest.

S C H O L I V M.

NE intelligas nullum mēbrum naturale: vt naturale est, posse pati per consensum aliquo modo. Nam per priuationem materię, quę inter modos compassionū retulit Gal. superiori cap. nil prohibet pati. Nam potest membrum arefcere præcissis venis quæ ab hepate veniūt. Præterea cap. 4. dictum est posse ciborum corruptionem fieri in ven-

triculo per consensum hepatis & corporis totius, quas compactiones constat pendere ex influxu praeuorum succorum. Duplex modus est compactionis eius quam Gal. in praesentia negat posse membris, ut instrumentis naturalibus accidere, priuatione, scilicet facultatis quae cum substantia, aut sine substantia influat (atque hoc est quo naturalia ab animalibus differunt). Nam ut Gal. hic aperte docet, & nos alio loco confirmauimus, nulla naturalis facultas influit. sed singulis membris sunt omnes insitae. Nimirum ut partes plantarum, singulae per se reguntur, à nullo membro principe recipientes gubernationem, sed solum naturam per radices, ita nostra membra ab hepate mandatam tantum recipiunt peruenas, quare nisi ad animantis vitam opus esset animali, & vitali facultate, ut ramus non emoritur statim, ac ex arbore secatur, ita neque praecissum animantis brachium emoreretur. Non. N. aliter cognoscimus arboris partes non gubernari à membro aliquo principe, sed singulas per se, quam quod, & si singulae ab alijs distrahantur, nulla priuantur re, praeter materiam adeo ut si praecissus ramus humi figatur, per se uiuat. Nulla itaque facultas in plantis est, ab alijs in alia membra influens. Quare neque in hominibus erit aliqua quae naturalis sit, non. N. video cur quod ad hanc animae partem attinet, plus tribuatur hominibus quam plantis, cum nil hominibus per eam contingat, quo non superentur à plantarum multis. Scilicet nutriuntur, augentur, & generant. quam plurimae.

plurimæ plantæ, plus etiam quàm homines. sunt. N. viuatiores, & assurgunt in maiorem molem, & sunt fecundiores. Nulla itaq; facultas naturalis influens est, sed hoc alibi est ostensum. Ergo vbi dicitur quamobrem solis partibus quæ & sentiendi, & mouendi vim habent, accidit vt ipsis interdum, haud quaquam patientibus, nihilominus earum actio pereat. Id quod naturalibus instrumentis: accidere non solet, intellige ipsis haud quaquam primario patientibus actionem lædi, non. N. nullo modo patientibus, cùm prius in hoc ipso opere monstratum sit, nullam actionem lædi posse, omnino non læso instrumento illius proprio.

Neque verò illud de solis naturalibus instrumentis, & actionibus intelligendum venit vt ex hoc loco colligit Fuchsius. Qui tamen videtur mihi, cùm in hunc locum incidit illum non intelligere, & priora tradidisse obliuioni. Nam argumenta omnia quibus Galenus nitebatur monstrare contra Erasistratum nullam actionem lædi sine læsione instrumenti proprii, erant communia instrumentis omnibus, atq; omnibus actionibus, & plarâq; exempla quibus illic est vsus, sunt iustrumentorum animalium: nihilominus docuit (quanquam id dialecticæ disputationis esse sæpe dixit) nullam actionem lædi, omnino illeſo suo instrumento, primario, scilicet aut secundario. Ne ergo quæ modo dicuntur cum prioribus pugnent, ita intellige solis quæ, & sentiendi & mouendi vim habent accidere, vt ipsis in-

sis interdum haudquaquam primario patienti
bus, nihilominus earum actio pereat.

Id quod naturalibus instrumē-
tis accidere non solere, cum
ijs limitationibus, quas
nuper scripsimus,
verum
est.

LIBRI PRIMI
FINIS.

Liber Secundus, DE PATIENTIBVS LOCIS.

CAP. I.

Relectiuncula.

*Quum tres modi exercitationis, in hac artis parte pos-
sint esse (vt Erasistratus prius dixerat) primus à locis ip-
sis sumptus, secundus à causis & passionibus, tertius à si-
gnis. Tertium hūc modum, qui est per signa prosequi vult
Galenus libello hoc secundo, in exemplo specierum dolo-
ris, volens inuestigare, quæ doloris species quàm partem
patientem indicet.*



PROPOSITVM est ex-
ercere mentem, vt Erasistra-
tus semper præcipit cum in
aliis artis operibus, tum verò
in ea, quàm nunc proposui-
mus, patientium locorum notitia. Circa quàm
tres sunt exercitationis modi: vnus circa sin-
gulas

*non modò exercat
hunc*

gulas corporis partes, quas locos nominât:
alter circa causas, & passiones: tertius est
de accidentium differentia. Igitur à locis

*in modis quibus
accidit a locis
et causis* sumptus modus huiusmodi est: patiente
cerebro huiusmodi separatim eueniunt,
accidentia: ventriculo patiente, hæc sunt
propria collo patiente hæc: atque in reli-
quis similiter. A' passionibus & causis, talis

*passio in locis et cau-
ad loca et acciden-* est: inflammationis seorsum, huiusmodi
sunt accidentia: scirrhi huiusmodi: refrige-
rationis, hæc: plenitudinis hæc: corruptio-
nis, hæc. Ab accidentibus, vt hoc doloris ge-

*ab accidentibus
quia quæ uolunt
esse in locis. a cap.* nus hæc passiones portendit, aut hosce lo-
cos: Tussis verò has: ita & vomitus, san-
guinis eruptio, fluor alui, conuulsio, rigor,
horror, deliriū. Quippe his inter se ita di-
stinctis, quis rectè, secusvè dicatur, facilius
percipi poterit: quodque ita se res habeat,
ex singulorum contemplatione planè di-
sces.

Scholium.

SCHOLIUM.

PRIMVS totius operis liber omnes hos exercitationis modos continuit, idq; breuissimè, vt ad sequentia fundamenta iacerentur. Nam inter nouem illa loca, quæ caput quintum continuit, in aliquibus argumētabamur ab accidentibus ad locum, in aliquibus ab accidentibus ad affectum, in aliquibus à loco ad affectum, in aliquibus ab affectu ad signa. Liber hic secundus cōtinebit, tertium modum exercitationis, duos modos priores continebunt sequentes libri, nimirum in illis cuiusq; internorum membrorum morbis dabitur proprium caput.

CAP. II.

Relectiuncula.

Monstrat hoc cap. Galenus errasse Erasistratum dicentē stupidum dolorem significare neruorum affectionem, primum quia stupor non neruis solum, sed alijs etiam partibus contingit, deinde quia dolor stupidus non est species doloris, neq; stupor nomen doloris sed affectus, notat etiā in Erasistrati verbis contradictionem, quod alibi ad neruos alibi ad musculos stupidum dolorem dicat pertinere.

Velut

*prehendit archi-
genem qd dicit*



ELVT statim, cū nimi-
us sit Archigenes, qui ex do-
lorum differentiis locos pa-
tiētes significari existimauit,
accuratiū de iis nobis disse-

rendum est. Nam stupidum quidem dolo-

*idum dolorem ad
est solum pertinere*

rem, neruis euenire dicit, sed planè peccat.

Quippe stupor à frigida passione oritur,
non neruorum duntaxat, sed etiam vena-
rum, arteriarum, carnis, membranarum, tu-
nicarum, & cutis. Quod si ob id quod hec
omnia per neruos sensum habent, ad ner-
uos passionem refert: cur non reliquas om-
nes dolorum differentias, propriè ad ner-
uos pertinere dicit. Quippe vt dolor tri-
stis sensus est: ita voluptas blandus est sen-
sus ergo non solum stupidus dolor in ner-
uis est, verum etiam ceterorum dolorum
omnium, quos ipse quoq; Archigenes des-
cripsit, vnusquisque. Quod si rem accura-
tiū inspexeris, haud quaquam doloris spe-

*id dicit stuporem
dolorum*

cies dicendus est stupor: veluti neque vlce-
 ris speceis, vlcus inflammatum: Sed duarū
 potius verum, in his quidem vlceris & in-
 flammationis, in illis verò doloris, & stupo-
 ris concursus est, Etenim stupor perfrigera-
 tio insignis est: idcirco corporibus ita labo-
 rantibus et sensus, & motus difficultatem
 inducit. Quemadmodum completa per-
 frigeratio, & sensum, & motum omnino
 tollit. Sed quod stupor passionis sit no-
 men, non sensus aut doloris, sic dicēte Hip-
 po. declaratur. Stupor. N. mediocris, dolo-
 rem soluere potest. Nam stupor, ob per-
 frigationem sit, vt planè videre est in iis
 qui in hieme per frigora proficiscuntur, at-
 que in perfrigerantibus quoque medicamē-
 tis. Nam si extrinsecus modicè adhi-
 beantur, particula ipsa stupida euadit, quæ
 sensum quoque omnino amittit si vehemē-
 tissimè perfrigeretur, idq; non solūm à me-
 dicamento, sed etiam à circumfusō nobis
 k aëre.

q. n. sit Stupor
 res Stupor

5. rot. aph

aëre, Equidem noui quosdam adeò perfrigeratis pedibus, vt in primis quidem sensus periret, sequentibus verò deinde diebus, ei mortui pedes putrescerent. Ergo vt perfecta perfrigeratio, & sensum penitus aufert & motum: sic moderatior, & sensus, & motus difficultatem inducit. Nominaturq; (vt dixi) huiusmodi perfrigeratio. stupor. Itaq;

*non perfrigeratio ut
ex his hinc & al. non qd
na hinc stupor perfrigeratio
sa*
stupidum dolorem passio efficit frigida simul & dolorifica, indicante id nomine, non doloris (vt dixi) differentiã, sed dolorem simul, & frigidam passionem, aut ab ipsa inductam particulæ, & sensus, & motus difficultatem. Constat autem quod constrictas vehementer particulas, atq; eos quoq; qui torpedinem animal, dum adhuc viuit, tetigerint, stupor infestare solet. Et quibus membrum aliquod stupidum fuerit, ii & tangentes ipsos, obscuro, & heberi sensu percipiunt, nec moueri possunt: si verò moueri cogantur, dolent. At citra hoc quod moueri

ueri tentent, passionē ipsam stuporis haud obscure sentiūt, sed tūc nequaquam dolet.

Proinde male Archigenes enūciauit stupi- *epilogus*

dū dolorē ad nervos propriē pertinere. Stupor N. passionis. nō loci patiētis indicū est.

Atqui paulò pōst rursus Archigenes propriē ipsum ad musculos pertinere ait. Ha-

bet autē dictio vtraq; ad hūc modū. Prior quidē nerui autē cōtorti. distendūtur, & in-

durātur, atq; hi stupidos inducunt dolores, atq; durē intendētes. Deinde paulò pōst in

hūc sermonē prorūpit: musculi carnis, & nerui, imò etiā arteriæ proprietatē misturā

in doloribus referūt fremētes, vt ita dicā, & late se distēdentes, ac stupidē pulsantes. In

horū sermonū priore nervus ait stupidos in ferne dolores: in altero vero musculos stupi-

dē pulsare, stupidū nō ad passionē, sed ad partes referēs. Sed vt dicebā, stupor nō par-

ticulæ cuiuspiā propria passio est sed affectio quę quidē in omnibus fieri potest, sed

nō in omnibus sensibilibus apparere quippe in his dūtaxat apparet, quę suas passiōes sentire, & pro volūtatis imperio moueri nata sunt. Cæterum eis, quæ manifestè in musculis apparēt sermo ipsius repugnat. Quin etiā indistinctè prolatus est, ac fortasse nō intelligit, nusquā in corpore carnē ipsam per se inueniri, Nā musculorū id, q̃ neruosum est, in plurimis vel capitib⁹ vel extremis partibus est, vbi etiā tēdones inueniūtur. Id verò, quòd in medio continetur, omnes homines carnem nominant, nemine intelligente, qui non exquisite sectione vsus est, carnem solam haud quaquam manere, sed cū tenuissimis quibusdam, veluti fibris, in quas neruosum genus resolutum est. Voco autem neruosum genus, in vnicam appellationē cogens, tū ligamēta, tū tonos. Quippe ex iis per carnē dispersis musculorū ostēdimus essentiā cōsistere quæ ut pmanere posset venis indigebat & arteriis.

Scholium.

SCHOLIUM.

NON accusat Archigenem (vt prima capitis verba videtur sonare) quod ex locorum differentia locos patientes significari existimauerit. Nam id Gal. ipse asseruit lib. superiori cap. 5. Sed q̃ in hac parte nimius fuit, & multas finxit, & vanas dolorum differentias, vt sermo ipse faciet palam. Doloris essentiam nonnulli constituunt in sensu ipso, nonnulli in sensui obiecto, nonnulli in sensus ipsius quadam tristitia. Nam cum illud constet dolorem non posse contingere, vbi non est sensus, prætereaq; nullum dolorem esse, vbi sensus omni tristitia vacat, non dubium dolorem, aut esse sensibile, siue id sit proprium tactus, siue commune (nā id ad presentem disputationem nihil facit aut tristem sensum, aut tristitiam sensus. Protinus ergo vt monstratum erit, non esse sensibile quodpiam, supererit esse tristem sensum, vt Galenus hic dicit, aut tristitiam sensus, vt alibi. dici N. ita dolere est habere tristem sensum, aut tristitiam sensus, aut sentire cum tristitia, perinde sit, quanquam Argentarius in his mire se exerceat. Verum dolorem non esse sensibile quodpiam ita licet tibi colligere. Accidentia sensibilia in obiectis sunt, haud quaquam in organis sensus, aut si in his sunt, fiunt ab ijs quæ

k 3 sunt

sunt in obiectis, vt frigiditas quæ sentitur, in re frigida quæ sentitur est, nõ in eo qui sentit, aut si quæ est in sentiente fit à frigore sensibilis corporis. Ita ergo oporteret dolorem haud quaquam in secanda manu esse, sed in secante gladio, aut eum dolorem qui in manu fit, ab alio nanci qui in gladio pre fuerit. Non. N. aliter accidentia sunt sensibilia.

Quum ergo hæc absurda sint, non sentitur dolor, sed est tristis sensus. Nec verò Hypp. secunda. part. Apho. Huic sententiæ repugnat dicens, dolentes dolorem non sentiunt, Accepit. N. illic nomen doloris pro dolorifica affectione. Qui modus plerisq; hominibus consuetus est. Ita N. dici semper audias. Dolorem sentio, aut dolorem non sentio. Quia tamen modus loquendi haud est exquisitus. Est N. dolor ipse sensus. Quod si tamen dolore illius obiectum non sentiri obijcias, solutionem scilicet continui aut intemperiem, eoq; non esse dolorem sensum velis. Respondeo sentiri per dolorem causam, verum id plerumque obscurissimè quia perturbatur sensus per tristitiam. Non aliter ac ipsa mens solet per animi conturbationes ea circa quæ veratur, vix sentire, atque ita contingere sensus acerbitatem maximam, perspicuitatem minimam. Sed de doloris essentia hæc sunt satis. Vbi Gale-
nus, inquit stupor perfrigeratio insignis est, ne putet definitionem illis verbis contineri. Nam sepe fit stupor sine perfrigeratione, ex compressione scilicet nervi aliquius. Sed stupor re vera est, semi

resolutio

resolutio aut inchoata paralysis: vt cunq. N. sensus
 & motus particulæ hebetetur, affectus est stupor,
 plarunq. verò à frigore insigni sensus hebetatur,
 quare volens Galenus stuporem qui est morbus, ab
 eo qui est symptoma distinguere, stuporis ex refri-
 geratione exēplo vsus, docuit refrigerationem in-
 signem esse morbum, dolorem stupidum illius sym-
 ptoma. Quòd pedes refrigeratione emortui pu-
 truerint, non est mirum. Frigus N. ambiens per se
 præseruat à putredine, quippe fit à calore externo
 tamen ex accidenti potest esse putredinis occasio,
 quia frigus debilitat naturalem rei calorem, eo ve-
 rò debilitato, quòd illius est reliquum à quocūque
 ambientis calore dissipatur vt in com. quarto. libr.
 Meteoron scripsimus. Emori etiam viuētis adhuc
 animantis membrum præ intemperie, irrecupera-
 biliter amissa vita, non est mirum, quum membri
 illius temperies naturalis est omnino corrupta, &
 præter naturam in habitum mutata. Causam qua pi-
 sciculus torpedio stuporem inducit piscatoribus,
 in frigore putant esse nonnulli, sed si id animal fri-
 gore faceret, mortuum id faceret melius quam a-
 dhuc viuum. Omne si quidem animal calidū est ad
 seipsum emortuū. 2. de temp. Nō ergo frigore facit,
 sed facultate quadā, quā id faciendi ei tribuit na-
 tura, quæ se se tuetur ab inuadētib⁹. Caro propriè
 ea tantū appellatur quæ est in musculis, sed præter
 hanc est in singulis membris sua cuiq. caro propria.
 Illa verò quæ propriè caro appellatur, nullibi est

152 DE LOC. PAT. G. CVM SCHO.
simplex, sed fibris plena, & ligamentis, & tendonibus, vt Docet Galenus secundo. de temp. capite quarto. Verum ne intellige simplicem re vera non esse natura: nam similes partes actu sunt in dissimilaribus, sed non posse carnem à fibris separari, tam esse cum illis permixtam. Appellat hic Galenus, *νευρώδες γένος*, id est neruosum genus, omnia ea quæ nonnullos nomine in latiori significatione vtentes, neruos vocare, dixit, sexto. Epide. part. id est. com. secundo, scilicet neruos propriè appellatos ortum habentes ex cerebro aut medulla spinæ, & ligamenta quæ illi appellabant neruos colligatorios ortum habentes ex ossibus, & tonos seu tendones, ortum habentes ex caudis, aut extremis partibus musculorū, hos censet Galenus, primi de motu musculorum mediæ naturæ esse ex ligamento & neruo propriè dicto constantes, quamquam quidem repugnent, sed modo minus moror, illud vnum sciri expedit nonnunquam ligamenta, & tendones appellari neruos translata similitudine, non secudum neruorum vim sed secundum substantiam corpoream illorum.

CAP. III.

Relectiuncula.

Causam apperit qua dolor pulsatorius in particulis inflammationis contingat, docetq; malè Archigenem dolorem eum ad musculos retulisse, quum tamen ille contingat propter inflammationes aut arteriarum solum, aut partium aliarum habentium arterias, & sentientium. Nec verò propter inflammationes omnes, sed magnas. Nam si quodpiam horum desit non fiet talis dolor, etsi morbus inflammatio sit, quare renum pulmonis aut hepatis inflammationes, pulsantem non faciunt, sed grauantem dolorem, non N. sensum habent. Vleunitis habet punctorium non pulsantem, quia caret arterijs, affecta particula.



TAQVE citra dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiam bene valente. Vbi verò ingens oborta est inflammatio, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarum pulsū cum dolore sentimus: cū antea per bonam valetudinem nec cum dolore, nec sine dolore ipsum sentiremus. Etenim res ad hunc modum sese habet, duabus præcipuè

occasionibus, vehemens dolor inflam-
 matis partibus infertur, cum mouentur aut
 cum à re quapiam comprimuntur. Inflam-
 mato igitur omnino musculo, duplici mo-
 do dilatatis arteriis, dolorẽ sentimus. Nam
 & mouentur, & ab adiacente carne com-
 primuntur, & ipsum comprimunt. Atque
 hac ratione partes inflammatae pulsant. Et
 hunc solum vocabant antiquissimi pulsum:
 posteriores verò omnem arteriarum mo-
 tum, quem sensus percipere posset, simili-
 ter nominauerunt. Non tamen inseparabi-
 le musculorum patientium, aut omnino
 proprium est stupidè pulsare, pulsū id quod
 cum dolore est vt diximus significante, si-
 quidem neque ipsum pulsare in vniuersum.
 Si quidem pulsus (vt prius dictum est) do-
 lorem quendam insinuat, nam in scirrhis,
 & in tumoribus qui propriè œdemata ap-
 pellantur, atque in intemperiebus, quæ sine
 tumore consistunt, motus arteriarum do-
 lorem

lorem haud quaquam excitat. Ac ne per inflammatas passiones quidem, nisi cum maiores effectæ sunt, dolor infestat quin etiam sine musculo arteria inflammatoriam sustinens passionem, ipsa per se cum dolore pulsât. Dico autem inflammatoriam passionem, ut simul cum inflammatione & erysipelas, & abcessus intelligatur. Huiusmodi igitur passionum, cum maiores fuerint pulsus accidens esse censetur.

SCHOLIUM.

APVD antiquos non fuit eadem acceptio nominis pulsus, quæ hodie. Nam dicebatur de solo pulsu qui in inflammationibus sentitur, ut docet G. 4. de ratione vict. acut. cō. 26. aut de eo qui manifestè sentitur ab ipso homine, aut ab alijs videri poterat. Hippocra. ipse usus est ita nomine hoc, loco citato, & primò prog. 31. dicens, si pulsus in hypochondrijs insit perturbationem significat aut delirium. 2. etiam epid. part. 5. ita dicens, cui vena in cubito pulsât insanus, iracundusque est, œdema proprie dictum est tumor mollis sine dolore, tamen dicebatur etiam hoc nomen ab antiquioribus de quocunque

quocunque tumore præter naturam. Ita Hippocra.
 1. prog. 32. œdema durum & dolens. Inflammatio-
 nes non quascunque, sed magnas solum dolorem
 pulsatorium habere docetur 13. metin. cap. 1. itaque
 dolor pulsatorius etiam si pars sentiens sit, & venas
 habens magnas: non est absidens signum inflama-
 tionis, sed superueniens. Inflammationis etiam est
 duplex significatio. Propriè est tumor durus & do-
 lens ex sanguinis fluxione consistens, latius paten-
 te nomine omnis tumor ex calida fluxione dicitur,
 libello de tumoribus præter naturam cap. 1.

QUOD si aliquando in iis pulsus,
 ipsi scilicet laboranti, stupidus esse
 videatur (hic N. stuporis passionem
 sentire potest) tùm scire licet, passionem
 in muscoli nervis consistere sed ita consi-
 stere, vt ad paralytim tendant. Quippe
 stuporis passio, inter resolutionem, & inte-
 gram valetudinem media est. At pulsus
 cū dolore factus, sequitur inflammatorias
 passiones notatu dignas, idquè semper in
 ipsis arteriis, atque in continentibus ipsas
 partibus, quas & ob angustiam premunt,
 &

*ponit inas con-
 mes ad pul. santi
 rem*

& cum attolluntur, modo pars laborans sentire nata sit, veluti percutiunt. Ergo nec in peripnæumonia, nec laterali morbo, dolor pulsatorius euenire potest, idq; ob partium naturam. Namq; pulmo sensum nō habet. Morbus verò lateralis membranæ costas succingentis, morbus est: quæ vbi costis quidem vicina est, necessario comprimitur: at intermedia pars ipsius cōpriminō potest, sed inflammationis duntaxat ratione dolet. Atque in hoc spatio arteriæ sunt, quæ per intercostalia vocata spatia, & per crassas, laxasq; laterum partes extenduntur, in profundo constitutæ vt succingentē costas membranam non attingant. Harum igitur arteriarum motus in morbo laterali ab ægrotate sensu nō percipitur, rātū abest vt ei dolorē inferat. Inflammatis quidē interdum intercostalibus musculis, arteriarū dilatationem, dolorem inferre necesse est, proinde laborans ipsum faciliē percipiet, atque

atq; pro inflammationis magnitudine, sentiet in parte inflammata pulsationem. Ob hanc quoque causam, vbi vehemens fuerit pulsatio, suppuratur inflammata particula, consequente suppuratione ingentes dūtaxat inflammationes. Constat igitur ex his

*Quod ea q̄ sunt re
sistit a p̄t ad p̄t
q̄ d̄stet*

quæ iam diximus, quod pulsatorius, siue pulsatiuus à medicis vocatus dolor, per inflammatorias passiones fiat, atque in corporibus sensibilibus: idque vel per se vel propriè, vel primaria passione in arteriis: nominet N. quilibet vt voluerit: in reliquis verò partibus sensibilibus omnibus, per cōsensum, eo quod à vicinorum cōtactū premantur. Igitur nec in hepate, nec in renibus vnquam huiusmodi pulsatio apparet: quoniam nullus per totum corpus ipsorū nervus dispersus est, nec etiam per pulmonem. Quocirca grauitas in ipsis sentitur, cū tumoris præter naturā genus aliquod ea infestauerit. Nam in horum viscerum quolibet

quolibet, circumfita membra, per quã nervus dispergitur, sensu potitur. Quia verò à tumore, qui est in viscere, ipsa extenditur, doloris speciem appellatione dotavit. Proinde Hippo. primus omnium scripsit, in re nem dolor grauis. Post hunc verò optimorum medicorum non pauci, non acuti doloris, sed grauitatis sensum in prædictorum viscerum inflammationibus fieri dixerunt. Enimverò membranas, vt quibus nullæ sunt arteriæ, nec pulsare ratum cõsentaneum est, quemadmodum nec cutem, etiã si vehemens adsit inflammatio. Atque eadem ratione, nec glandulas, quibus nullæ sunt arteriæ. Etenim huiusmodi partes, cùm inflammatae sunt, vnico dūtaxat doloris modo vexantur, extēfionis. Quippe huiusmodi doloris species à nullo sentiētium corporum in huiusmodi passionibus separari potest.

Scholium.

SCHOLIUM.

VIDERI possit alicui nisi attentè admodum
 legat in verbis primis huius dictionis recide-
 re Galenum in sententiam Archigenis putantis
 stuporem ad nervos pertinere. Cæterum confide-
 ra, stuporem esse affectum omnem per quem hebe-
 tatur sensus, & motus fit difficilis. Id quòd aliquan-
 do ob solius nervi obstructionem, vt cum tendit in
 paralyfim. tuncque haud dubiè stupor est primario
 in nervo secundario in toto membro, aliquando fit
 ob perfrigerationem extrinsecus factam, tuncque
 est in toto crure stupor, affectus primarius, horum
 stuporum vterque, quod ad symptomata attinet, est
 medius inter bonam valetudinem & paralyfim. Tam-
 en hic de primo loquitur qui medius est etiam in
 affectus essentia. / Quod de pulsatorio dolore Gal.
 docet, ipsum scilicet primario in arteria cōsistere,
 & secundario in alijs partibus sentientibus, non vi-
 detur mihi satis distinctè docere, pulsus siquidem
 arteriæ solius est, tamen dolor pulsatorius (non
 N. idem est pulsus & dolor pulsatorius) aliquando
 consistit in alijs partibus primario, & in arteria se-
 cundario, aliquando contrà, aliquando in vtrifq;
 primario, vt si fingas (sæpe ita continget) arteria
 nequam inflammata, partes quibus continetur, in-
 flammatione laborare, quo casu constat arteriam
 ipsam non dolituram, sed præstituram motu alijs par-

partibus doloris occasionem, easque dolore primario gratia propriæ affectionis puta phlegmonis (phlegmonis N. symptomata est dolor) arteriam verò (si quo modo) pati per consensum. Contra, si sola arteria est inflammata, sola dolebit primario, reliqua secundo, si utraque inflammata sunt, primario, utraque. Itaque ut dolorem stupidum diximus se habere ad nervum, in quo solo nonnunquam est primario, nonnunquam verò non in eo solum sed primario etiam in alijs partibus, ita de dolore pulsatorio & arteria debes intelligere quod tamen non videtur Galenus satis assequutus, quantum in-ventionis principia præstitit. Arterias per spatia intercostalia decurrètes profundius penetrare per intercostales musculos, quam ut membranam succingentem attingant, non omnino verum esse in ~~neris~~, sed ad costarum radices, & aliquanto post, iuxta membranam ipsam sunt, deinde submerguntur, quare si pleuritis exquisita est, id est ipsius membranæ inflammatio, siquidem ad partes anteriores laterum aut etiam versus anteriores spectet, non dubium est, non posse illam pulsantem dolorem asferre, sed si sit inflammatio in posteriori parte iuxta spinam, fortassis possit, cum arterijs adiaceat eo loco membrana. Merito Gal. ubi loquens de renibus & pulmone inquit, nullus per corpus ipsorum nervus spargitur addidit per totum corpus ipsorum. Nam 4. de usu part. cap. 13. idem quod hoc loco dicens, hepar scilicet obscure sentire suos morbos, idque per

1 tunicæ

tunicæ suæ sensum, & neruum non recipere, addidit, quod neruus cū sit paruus, qui in tunicā ambientem distribuitur, aut non omnino in viscus aut non in totū certē se insinuat. Dixerat paulō antē dedisse nōnihil nerui his visceribus naturā, ne omnino plantæ essent. Itaque neruum veniētem de sexta coniugatione quem his membris ramulos præbere lib. de neruorum dissectione docuit Gale. nihil obstat aliquid etiam ipsorum viscerum carni impertiri, (Sunt N. tenuissimis quibusdam vinculis suæ illis tunicæ alligatæ,) verū id quam minimū nec in tota viscera penetrans. Meritō etiam cum dixisset ne glandulas pulsū habere, addidit, quibus nullæ sunt arteriæ. Nam est duplex genus glandularum, docente eodem Gal. II. capite 14. meth. aliud vile quod ex abundanti factum est, nam ad aliorum membrorum separationem & ad replendū caua, & ad recipiendum excrementa: aliud quod generandi succum aliquem gratia factum est, cuius generis sunt mammæ, & glandulæ adnatæ testibus & quæ in faucibus saliuam gignunt. Hæ glandulæ arterias habent & cū inflammatæ sunt pulsant cum dolore.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Differit imprimis Gal. de doloris causis, eas dicens esse tres, inaequalem intemperiem, distentionem, & contactum alterius

alterius rei, cuius nomine intelligitur & corrosio et punctio et cōtusio ac cōpressio: Has tres causas redigit deinde ad duas, intemperiem scilicet inequalē et solutionē continui. Deinde loquēs de dolore quodam coli quo ipse laborauit, & de lapide descendēte de renibus et de dysenteria, et eius speciebus, describit dolorem, vt ex perforante terebra, & vt ex infixo palo, & mordentem, docetq; illorum quilibet cui parti & eius passionis qua causa contingat.

RELIQUAE verò doloris species quibusdam partibus accidere possunt quibusdā nō possūt. Igitur meminisse eorum semper oportet, ac cognoscere singulorum locorum naturam: quinetiam intueri quis unicuiq; parti modus doloris peculiariter conueniat, quis verò cōtra. Proinde resūmētes rursus ipsos dicamus. Quippe vnus doloris modus est, qui per inequalem intemperiem in patiente parte cōsistit, vel nulla re ipsā extrinsecus attingēte. Alius qui ob tensionem fit, non soli patienti parti proprius, vt qui vicinas partes interdū lædat. Est item dolor, qui à tāgentibus duntaxat, in patiente particula generatur: Quum

videlicet compressa vel contusa, vel à re quapiam superueniente vulnerata dolet.

*de ar. b.
repu. can. h.
lo. qu. ut* Atque is quidem modus, qui ex motu con-
tingit, interuentu alicuius alterius, dolorem efficit, quemadmodum de arteria paulò antè dictum est. Etenim quæ per se mouetur pars, tenditur: & ad vicinas accedens comprimitur interim, & contunditur, & vulneratur. Si verò nulli inciderit eam sola tensione, dolere necesse est. Quare partes omnes ab aliis motæ, si nihil extrinsecus ipsas tangat, nullo præter eum, qui necessarius est dolore afficiuntur. Cæterum alibi me frequenter dixisse memini, primas doloris species duas esse: Quum affatim temperies alteratur, atque cùm soluitur continuitas. Quæ cùm iam dictis haud quaquà pugnare videntur. Namque pars intenta, aut compressa, aut contusa, aut vulnerata dolet ob continuitatis solutionem. Neque N. cum acu quopiam vulneratur, alia passione

sione laborat, quàm si ab acri humore facta fuisset erosio, ut potè per utramque passionem corrupta continuitate. Igitur non eandem doloris speciem excitant, mordax humor, & plurimus. Nam ille rodendo dolorem excitat, hic verò tendendo, flatuosi spiritus exemplo, ac veluti vrina vesicam intendit, cum nō redditur. Verùm in Erysipellate, & inflammatione, atque omnino in passionibus inflammatoriis, non solum quia intentæ sunt partes, laborant, verùm etiam quia intemperatæ sunt, ac ne hoc quidem exiguam ad dolorem inducendū vim habente. Id quod declarant hi, qui per vehementem hyemem profecti, manus ad ignem affatim calefacere tentant. Intolerabilem omnino sentiunt dolorem, & quidem maximè in vnguium radice.

VBI G. dicit ὁ γυμνήρ ἐκ τοῦ κινεῖσθαι τρόπος τῆς
 οὐλῆς, οὐκ αἰσού τινὲς ἑτεροῦ τῆρ ἐργάζεται καὶ
 ὅτι περὶ τῆς ἀρτηρίας ὀλιγωπρότερον ἐλέγετο. Qui
 dam ita tranierunt. Modus autem doloris, qui ab
 eo quod mouetur procedit, per alterum quoddam
 medium efficitur, quemadmodum paulò antè de
 arteria dictum est. Quàm lectionem sequutus est
 Fuchius, & locum finistrè admodum interpretatus
 est, dicens dolorem, qui fit cùm particula aliqua
 mouetur & comprimitur, interuentu rei alicuius
 accidere, vt particula inflammata dolet interuen-
 tu arteriæ, tamen Galenus rem aliam innuit, sci-
 licet, dolorem pèr motum factum haud quaquam
 esse modū à tribus prioribus diuersum (illi erant ex
 inequali intemperie, & dilatatione, & contactu
 alicuius substantiæ) quia is dolor mediante aliquo
 alio doloris modo, vt compressione, aut dilata-
 tione fit, id quod declarant sequentia verba, sci-
 licet, etenim quæ per se mouetur pars, (vt arte-
 ria scilicet, aut musculus) tenditur & ad vici-
 nas accedens, comprimit interim & comprimi-
 tur, ergo is dolor dilatatione fit aut compressio-
 ne, si verò nulli inciderit, eam sola tensione do-
 lere necesse est, eritq; ita etiam per distentionem
 dolor. Quare partes omnes ab alijs motæ (vt digitus
 transfertur à manu) si nihil extrinsecus ipsam tan-
 gat, nulla ratione motus, præter eum qui necessa-
 rius

rius est, id est, præter eum quo etiam si non mouerentur dolerent, dolore afficientur. Vides quam aptè cohæreant hæc verba cum prioribus ita intellectis, quæ tamen aliter non video posse aptè hære. Proinde ego fidelissimè transferes mihi videor verum sensum clarius expressisse. Ita nempe, is quidè doloris modus qui ex motu cōtingit, interuentū alicuius alterius (s. doloris modi) dolorē afficit. Quæadmodū de arteria prius dictū est. Hæc addit quia dictū antea erat arteriā cū dolore pulsare aut causā distensionis aut causā cōpressionis. Vngues perfrigerati ad ignē positi dolēt, quāq̃ ad naturalē dispositionē vidētur transferri, quia violentia ignis magnæ refrigerationi repētè superueniēs magnam in partibus inæqualitatē facit, & partiū distractionē sed hæc alibi diximus. Vnguiū verò radices duplici causā plus alijs partib⁹ dolēt, & quia sunt magis sentiētes. (recipiūt n. vngues nervos p̃ radices, vt dētes haud quāq̃ p̃ omnes p̃tes in alueolos distributos, vt dicitur 2. de anat. adm. ca. vlti.) & quia sunt magis affixi carni, ligamētis, & internodio, quā in vltioribus partibus. Quare si quis flatus generatur calefactione, illas violentius lancinat.

PORRO' memini, mihi ipsi cecidisse
dolorem vehemētissimū, vt videre mihi
viderer : in intimo ventre terebra
perforari, in eo potissimū spatio, per
1 4 quod

quod à renibus ad vesicam vreteras scimus
 extendi. Iniecto deinde rutaceo oleo, cum
 id paulò post excernere tentarem, excreui
 simul grauissimo cum dolore, humorem
 vitreū à Praxagora appellatum. Quippe
 vitrofuso, tum colore, tum substantia
 haud absimilis erat. Atque id aliis quoque
 accidere conspexi. Quòd verò hic hu-
 mor sit frigidissimus, iam à Praxagora
 dictum est, qui ob hoc vitrei nomen i-
 psi imposuit. Id N. haud obscurè per-
 cipitur sensu tactus, tum ipsorum, qui
 illum excernunt, tum aliorum, si quis con-
 festim ipsum tangere voluerit. Sed dig-

*magis admira-
 re dignum fuisse
 mirari galetum
 uor adu frigidis
 rassis ex ne mag
 mishi et si vult
 chissima excreta
 excretionem pau
 isam por et quid
 a runt qd no cale
 et*

num utique admiratione est: quomodo
 frigidus excidere possit, neque ab excre-
 tionis violentia, cum excidit calidus e-
 uadat. Equidem putabam lapidem in al-
 tero vretere impactum, adeò erat vt mi-
 hi videbatur doloris ipsius species perfo-
 ranti similis. Atqui vacuato humore, do-

loreq;

lorequè sedato manifestè constabat nec, lapidem fuisse causam, nec in vreteribus, aut renibus locum laborantem fuisse, sed in intestinis potius, præcipue verò crassioribus. Neque N. ut à tenui corpore, breui temporis spatio exire poterat, sed à profundo quodam & quidem crassiori corpore, quam sit tenuium intestinorum tunica, ferebatur: huiusmodi dolores, omnes fere medici colicos nominare videntur, quanquam ab ea parte, qua dolor sentitur, nullum inditium sumi potest, quàm magis colon, quàm tenue intestinum dolor afficiat. Nam huiusmodi dolores, perinde ac si terebra partes perforentur, molestare solent, narrantibus ita infirmis. Sunt alii dolores, per quos palus videtur infixus, qui & ipsi corpus laborans crassum esse significant. Differunt autem inter se, aut multitudine: aut motu, aut crassitudine, aut rei dolorem facientis potètia, siue ea humor fue-

l s rit,

rit, siue spiritus flatuosus. Quippe paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanēs moto, minorem dolorem excitare solet. Atq; qui ad vehemētem refrigerandi vim, haud qua; accedit, vehemētissime refrigerante minus cruciat. Verū hoc doloris genus ad crassum intestinum referendum est, siue palum ibi infixum, siue terebra perforari locum quis putauerit. Et distingui quidē hæc impa;io lapide non possunt, nisi expectatis iis quæ consequuntur. Quamuis ob huiusmodi ignorantiam, quod ad doloris mitigationem attinet, nullam laboranti noxam inducamus. Si quidem vtriusq; doloris præsidia omnia communia sunt, & quidem calorifica imprimis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue iniiciantur. Deinde nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorum, quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendum est, cuiusmodi est id, quod à Philone cōpositum est. Verū si lapis do-

lorem

lorem excitauerit ipse interdū solus, interdum vna cum cruore excernitur. Etenim radit ea corpora, per quæ transit, maximè, si vel alper, vel acutus fuerit lapis, ac si postea vrinas inspexeris, sabulosa quædā subsidere inuenies. Quod si in colo passio confitebitur, nec lapis, nec cruor, nec arena, sed humor aliquis qualis iam dictus est, subsidere videtur. Atque alia, quæ ad malè affectum intestinum pertinent, apparent accidentia. Protinus N. inflatio quædam, & extensio, & flatus complures, sed magis posterius, & tormina, & excrementa flatibus plena videntur. Ea autè discernere licet, si super aquam natent, ac bubulo stercore similètur. Quinetiā cibi tum cupiditas tum concoctio, deterior euadit, & præsens, & prægressa, & quæ sequitur. Vêtriculo parti primario patienti gratia cōtinuitatis cōpatiēte. Insup colicas nominatas passiones, magna ex parte præcedit, & cruditas, & spiritus flatuosus, & vomitus,

172 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
mitus & nausæa, quæ multo tempore inanis
permanet, & in præcordiis mordacitas, &
inquietudo, ac angustia plurima.

SCHOLIVM.

QUOD Gal. dicit colicum dolorem ab eo quo
lapis impactus est discerni nō posse, nisi quis
accidentia quæ postea consequuntur expectauerit,
videri forte posset suspectum, nam ex anteceden-
tibus etiam possunt discerni dolores dicti. Nam in
lapide antequam is concretus sit, semper fere ali-
quibus ante diebus minguntur arenulæ, & dolorē
similem terebræ perforanti, aut infixi palo antece-
dit dolor grauis in rene: colicum dolorem nec hic,
neq; arenæ mictio, sed cruditates, vomitus & nau-
sæa antecedunt. Verum intellige Galenum. hic non
negare, posse, ex antecedentibus notas sumi, qui-
bus illi dolores dignoscantur, sed si semel ex ante-
cedentibus distincti non sint, aut propter medici
absentiam, aut quia signa non sunt obseruata, non
posse iam ea mala, ex doloris specie, aut loci patien-
tis situ, aut re alia, quæ tunc temporis conspicien-
dam se exhibeat, distinguere, sed expectanda esse con-
sequentia, accedit, signa antecedentia, & si diligen-
ter obseruentur minus sufficientia esse ad euiden-
tem distinctionem nisi cum subsequētib; coniun-
gantur, nam vomitus, & nausæa, ac cruditas, ambo-
bus

bus malis solent esse communia, retentio etiam excrementorum. Iam verò nihil vetat arenulas superioribus diebus esse mictas, tamen modò lapidem non esse concretum, vitreo succo colum affligente, quare potuit etiam arenularum causa dolor gravis in rene antecedere nullo lapide subsecuto. Quòd de curatione addidit bono etiam indiget intellectu, Non N. illorum malorū, lapidis inquam renum, & doloris colici, sunt prorsum eadem præsidia, in illo. N. vsus est medicamentorum frangentium lapidem, & ad extremum, diureticorum, in hoc verò minimè. Cæterum considera in his duobus malis, ab eisdem auxilijs esse incipiendum, calorificis inquam modice, & laxantibus, eisq; vtendum vsq; dū dolores incipiant sedari, Tunc N. in altero, est studendum intestinorum, in altero, renum expurgationi, eum vero sedari iam incipiunt dolores, incipiūt etiam prodire in altero arenulæ aut etiam lapilli, in altero flatus & excrementa flatulenta, quare incipiunt etiam mala apperte distingui, sunt igitur in illis auxilia omnia communia, cum distinctio est difficilis, cum verò euariare debent auxilia, mala distinguuntur facillimè. Non ergo obest curationi hæc dignotionis difficultas. A medicamentis stupefacientibus abstinendum est nisi cum summa vrget necessitas, per ea N. symptomati subuenitur, tamen morbus augetur & causa fit magis rebellis, potissimum cum ea frigida est vt in dolore colico. Docet hæc Gal. 12. meth. cap. 1. Ventriculus non est continuatus

174 DE LOC. PAT. G. CVM SCHO.
tinuatus intestinis, vt gulæ. Nam ventriculus & gula
eisdem omnino, tunicis productis constant. intesti-
na verò & ventriculus non ita, sed diuersæ sunt tu-
nicæ, & diuersæ fibræ: implantatum N. est intestinũ
primum in ventriculum, & illi alligatum, haud qua-
quam ab eo deductum. Ex loco dolente non
possis cognoscere, laboret colon an aliquod tenuiũ
intestinarum, nam quãquam colon habet exortum
humiliorem quam tenuia, tamen recurrit ad supe-
riora & omnia in girum lustrat.

IGITVR ex huiusmodi quidem dolo-
ribus, ii, qui vehemētissimi sunt haud ab-
re in crassis intestinis consistere po-
tuntur. Qui verò mitiores sunt ex duobus alterum
necessarium est, aut quod in his ipsis sunt,
sed à leuiori causa, aut quod in tenuibus co-
sistant intestinis. Sed qui mordaces sunt, à
mordaci humore intestinum erodente, fieri
solent. Vnde dysenteriam semper huiusmo-
di dolores præcedunt, eam videlicet per
quam intestina exulcerentur, quam vel so-
lam, tũm recentiores medici, dysenteriam
nominant, tũm antiquorum non pauci. Ex
his

his N. nōnulli, nō solū hanc, sed aliam quoque, quæ cruenta, ob excretorum speciem, nominatur, dysenteriam appellant. Nam interdum sincerus, plurimūque sanguis, interdum veluti limus, & feces ipsius nō parvæ quantitatis excernitur. Verū hęc patientis iecoris accidens esse censetur. Ea verò, per quam sincera, multūque sanguis excernitur, vniuersum corpus plerūque euacuat, haud secus, quàm hæmorrhoides, aut muliebri pfluuiū, Verū de iis post-hac rursus nobis agerē licebit, nunc ad dolorū species nostra redeat oratio: eas N. in hoc libro persequi potissimū pposuimus.

SCHOLIUM.

NON omnes intestinorum dolores sunt vehementiores in intestinis crassis quā tenuib⁹, quāquā addas causam vtrobiq; esse equalē. Nā dolorem ilei seu voluuli, maiorē & periculosiorē esse in tenuibus docet Ga. 3. epi. par. 2. in historia mulieris apud Tisamenū, his verbis, & cū sit omnis voluul⁹ periculosus, qui in sublimib⁹ intestinis cōfederūt his sunt deteriores qui in crassis (paucis impositis) præte-

præterea tormina : & dolores faciunt ad notitiam quando teneāt hi alta intestina. Itaq; dolor voluuli quia hic fit docente Gal. 3. de caus. symp. interclusa via descensus excrementorum, & hæc quo stuctior est, eo ab æquali causa magis obstruitur, quo in tenuiori intestino fit eo est acerbior ac periculosior, Is verò de quo hoc in loco est disputatio quia fit humore frigidissimo infixo tunicæ & veluti ipsam penetrante in crassis est grauior, quia quo crassior est tunica eo penitius & profundius videbitur accidere perforatio. Hæc ergo ita intellige de dysenteria & eius speciebus & causis distinctius loquutus est. 3. de caus. symp. & in sequentibus est iterum de eis disputaturus.

CAP. V.

Relectiuñcula.

Hoc capite, quod nobis vnicum vocare placuit, quamquam apud alios multa habentur mentionem facit Gal. doloris cuiusdam partibus oris proprij puta hæmodiæ (latini vocant stuporem dentium) qui dolor differentia quædam inefabilis est, verum experimento compertissima. Reprehendit Archigenem, quod membranarum dolores quiddam habere hæmodiæ simile asseruerit, & præterea reprehendit illum in alijs quam multis transcribens in hoc caput duo loca longiuscula ex primo libro de locis patientibus illius, expendens seorsum singula verba. Illud verò præter

ter verò cætera vitio dat, quod non aliter in hac doctrina quam in tractatione de differentijs pulsuum fecit, alienis utitur nominibus, & nihil minus quàm differentias dolorum significantibus.



I G I T V R iterum incipiamus ab eo dolore, quem puncturium vocant, qui circa membranas potissimum consistit, ipsius passionis veluti radicè eo loco fixa, vbi membrana pungitur, dolore verò circum circa latius se fundente, Atque hoc modo in laterali morbo dolorem puncturium esse, vt in inflammatione pulsatiuum, apud omnes fere medicos in confesso est. Porro membranosorum corporum dolorem stupori dentiū quid simile habere, vt Archigenes censuit, non est estimandum. Nam ori duntaxat, nec ei toti, sed solis dentibus, & gingiuis hanc passionē accedere solitam obseruauimus, quæ omnibus hæmodia dicitur. Cæterum hanc oratione explicare est impossibile, sed cū quispiam & austeros, & acidos cibos ingesserit,

m ita

*ὁμοιωτα-
θεις*, dicuntur
homines qui
à similibus
causis familia
patiuntur.

ita vt passio aliqua sequatur in dētib⁹, & gin-
giuis, eā in omnibus eandē esse credimus. In
quā plurimis rebus vidētes, nos esse similiū
passionū capaces, ita vt ab eis dē causis eadē
patiamur. Hāc quidē passionē in ore dūta-
xat fieri scimus. Sunt alia doloris genera ab
Archigene descripta, quæ nec dum fiunt,
nec dū proferuntur, intelligi possunt, veluti
tractorius, austerus, dulcis, leuiter acutus, sal-
sus, viscosus, atrox, astringēs atq; huiusmo-
di nomina in libro de pulsibus scripta po-
steritati reliquit, quæ auditores nihilo do-
ctiores reddere possūt, eo qd doctrina quæq;
ppria desiderat nomina. Si N. de saporibus
aut omnino de ppriis sensibilibus, quæ lin-
gua iudicātur, differamus, dicem⁹ utiq; au-
sterū, & acerbū, & stringentē, & mordacē
& salsum, & dulcē, & amarū. Si verò de his
quæ tactu iudicantur, humidum corpus, &
aridū, & calidum, & frigidum & asperum,
& leue, & molle, & durum, & acutū, & ob-
tusum. Haud secus de his, quæ visu discer-

nūtur, rubrū, flauū, nigrum, album, fuscum, aut aliud quid piā huiusmodi. Quod si appellationes ipsoꝝ per mutaueris, quid dicas, auditorū intelliget nemo, veluti de astringente, aut austero dolore. Quippe fieri non potest, vt quid sit dulcis dolor, intelligatur. Nam dolor semper molestare solet: atqui dulcia quæque iucunda sunt. Igitur quā verissimum est, Archigenem circa medicę artis opera fuisse studiosum, quo pacto tamen in huiusmodi nomina incidere, cum sæpenumero inuestigauerim, inuenire non potui. Videmus ergo quid manifeste ex ipsis colligere possimus, veluti paulò ante de stupido dolore iam fecisse videmur. Nam iustum est, vt obscura nomina indubio derelicta, inutilia reputentur, perinde ac si nūquā scripta fuissent. Quæ verò clara sunt iudicētur non ratione duntaxat, sed multo etiam præcedente experimento, quanquam huiusmodi iudicium

in 2 cium

cium perdifficile est. Nam plerūq; aliis nos credere oportet, qui suas passionēs ob animi mollitiē, nec consequi planē, nec si cōsequātur, eas enarrare possunt, aut quia oratione quid patiantur declarare omnino nequeunt (quippe non parvæ facultatis ea res existimatur) aut quia passio ipsa ineffabilis est. Ergo relinquitur, quòd nemo singulorum dolorum species cōscribere potest, nisi ipsemet passus fuerit, sitq; medicus, qui interpretandi aliis facultatem habeat, & qui prudenter, & sine mollitiē, comprehendere possit suas passionēs, dum laborat.

Atqui nemo inuentus est, qui per totū ætatis suæ decursum, omnes passionēs sustinuerit, etiā si perquā morbosus fuerit. Proinde non possum non mirari, cum eorum proprietates ab Archigene scriptas lego, ita scilicet ipso narrante, tanquam omnes passus fuisset, quanquā nō admodū morbosus erat Archigenes. Si N. vnā aliquā partē & infirmam

mā, & morbidā habuit, non protinus omnibus laborauit veluti nec reliquorū mortaliū vllus. Neq; N. inuenire est, hominē eundē, qui simul & caput habeat infirmum, & thoracē & pulmonē, & hēpar, & lienem, & ventriculū & intestinū ieiunū, & colum & vesicā, atq; reliquas id genus partes. Videtur itaque Archigenes præmeditationibus pro cōsiliis, & quidē dialecticis, potius, quā locorū patientiū experimento fulcitus, pro viribus dolorū species explicare voluisse. Verūm vt studioli maiori à nobis copia dotati recedāt, pposita eius oratiōe, eos qui in arte excercitātur, moneo, & hortor, vt quę planē vera sunt, ea dūtaxat eligāt, ipsiq; credāt: quæ verò ab his abhorreere videbūtur, ea præteriri oportet. Igitur Archigenescū reprehēdisset Aſclepiadē dicentē in articulo morbo neruū laborantē, dolore haud quaquā cruciari, q̄ nihil omnino sentiat: carnē autē, quāquā nō patientē, dolere tamē vt

pote à parte vicina compressam . Postea ad verbū ita scribit : porrò vasa vehemēter cōpressa , capitis dolores sine inflāmatione obortos arcēt veluti prohibita in ipsa incur sione, id quod barbariū vinculū tūm maximè perficere potest: Sphacelodes verò hemi cranias, dissectio eorū, sed maximè arteriæ circūscribit. Quæ primò laborās pulsatoriiū, persultatēq; dolorē inducit, ac rotūda euadit, horrorēq; planè excitās. Quēadmo dū venæ quidē varicosæ fiūt: nerui verò in tēti distēdūtur, ac indurātur, atq; hi torpētes inferūt dolores, dura distentione cruciātes, & profundos, & infixos, & angustiae ple nos, & minimè fusos. Mēbranæ autē in latū discurrētes, & inēquales dolores excitāt; atq; cerebro ita laborāt, vt dētiū stupori si mile quippiā habeāt, transmissionis videlicet asperitatē. Itaque superficies quoque, & mēbranæ in media carne cōtētæ, plerūmq; patiūtur, quæ dilaniātes quoque dolores in
ferunt

ferūt. Dolores verò à mēbranis ossa circū-
dātibus despēdentes, perinde affligere cōpe-
riūtur, ac si in ossibus ipsis cōsisterēt: à venis
graues, & detrahētes & æqualiter infarti do-
lores suscitantur. A' carne autē & fusi, & la-
xiores: quapropter nō adeò extēdi vidētur,
sed arbitratur laborās sensu asperis quibus-
dā rebus impleri. Musculi carnis, & nerui,
imò etiā arteriæ, proprietatū misturā dolo-
ribus referūt, extēdētes & latè se distēdētes,
ac stupidè pullātes. Ex reliquis verò vlcerō
sus quidem dolor, et in vlceribus leuiter a-
cutus, & maximè dulcior, & qui prurigi-
nem inducere potest, ad superficiem perti-
nere videtur. Punctorius autem profundas
partes infestat. Infixus autem, cū sinus acces-
serit. Stimulās autē partim eorū, quæ in lo-
co sunt, aliquid pati declarat, partim cōrra,
vt pote qui haud quaquā profundas partes
occupat. Lacerās autē est qui in sinu cōsistit
Hic est. .i. Archi. sermo ex li. .i. de loc. pat. qui

docere conatur quomodo ex dolorū differe-
 rétiis partes patiētes possint inueniri. Igitur
 rursus ab initio ipsum diligentius examine-
 mus. Sphacelodes, inquit, hemicranias vaso-
 rū dissectio circumscribit. Igitur quos dolo-
 res nominet Sphacelodes, inuentu difficile
 est. Non N. inter oēs cōuenit, quid hęc vox
 σφακέλ⊙ significat. Sūt. N. qui dicūt ipsam
 vehemētē dolorē declarare. Alii tantū inflā-
 mationis excessum, vt partē ad corruptio-
 nis periculū inducat. quæ passio à nōnullis
 gāgræna appellatur, alii partis patiētis cor-
 ruptionem ipsam, Sphacelō dici volūt. Alii
 cōuulsionē. Alii nō simpliciter cōuulsionē,
 sed neruosorū corporū, quę inflāmate la-
 borāt, nōnulli nō eā, quę fit, cōuulsionē, sed
 eā, quæ ex inflāmationis magnitudine expe-
 ctatur, alii simpliciter fortē tētione. Alii pu-
 tredinē. Ergo vocabulū Sphacelodes, in iā
 pposita Archigenis oratiōe scriptū ad tātā
 perueni tobscuritatē, vt nihil per ipsum ex-
 plicari

plicari posse videatur, ipso nusquã in aliis libris medicorũ hominũ enarrationẽ cõscribente. Per verbum autem circũscribit, fortasse intelliget quispiam ab eo, veluti celeriter, & ex toto sanari. Ac subiiciamus vt ita dicatur. Cur N. se quisquam torqueat, intelligere cupiens ea, quæ ne is quidem, qui scripsit, intelligi voluit? Deinde pulsatoriũ & persultantem dolorem, arterias inferre dicit, cùm ipsæ videlicet per Sphacelodes hemicranias primogenia passione laborant. Imprimis itaq; qualis sit pulsatorius dolor, prius explicabius, quãuis ante nostrã enarrationẽ, omnibus medicis motus sit, siquidẽ ingentium inflammationum accidens ipsum esse perhibent. Persultans autem dolor est qui à parte primario patiente, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur. Id verò non solum in hemicrania, vt Archigeni placuit, sed in cephalæa quoque vocata, euenire solet. Etenim in

hac nonnunquam arteriæ primario laborantes huiusmodi (qualem dixit Archigenes) dolore vexantur. Ita vt fateantur nonnulli, vasorum ipsorum se dolorem sentire, id interpretari tentans, arteriam subhorrentem, fieri rotundam dixit. Igitur inquirendum est, vtrum, veluti per sphacelodes hemicranias, arterias ita pati dicit? ad eundem modû de venis eum sensisse existimandum sit, quod per hunc solum morbum, varicum exemplo obtortæ sint: an hoc commune sit accidēs venarum, vel quomolibet laborantium, vel duntaxat inflammatarum. Ex eo N. quod sermoni de arteriis, iungit sermonem de venis, par est, vt coniciamus, de eadem passione ipsum fuisse loquutum. Ex eo autem, quod mox in vniuersum de nervis, atque de aliis huiusmodi partibus scribit, non adaptans vni morbo sermonem, ea ratione putandum est, itidem de venis quoque fuisse dictum. Itaque

in hac ambiguitate fatius fuerit, vt existimemus in eo sermone, quem de hemicrania circumscripsit, simul cum arteriis, ipsum venarum quoque mentionem fecisse: simpliciter verò reliquorum instrumentorum sine vlla distincta passione, nec in neruis, nec iis partibus, quæ illos deinceps consequuntur, in quibus dixit venas graues, ac detrahentes, atque æqualiter infartos dolores inferre. Verum hæc non nihil ambiguitatis continent. Quòd verò deinceps sequitur vbi dicit, nerui verò contorti distenduntur, & indurantur: manifestè recedit ab hemicrania passione, definiens id in vniuersum ad neruos quomodolibet laborantes pertinere, quod planè mendacium est. Neq; N. quælibet neruorū passio ipsoꝝ essentiã indurat atq; intorquet. Sunt N. nonnulli, per quos laxiores euadūt nerui, quẽadmodũ palam est, vbi alimentum non sentiunt. Quinetiam sæpenumero vbi nullam sensu perceptibi-

ceptibilem habent differentiam, ita ut exquisitè sani videntur, nihilominus nec sensum, nec motum præstant subiectis corporibus. Itaque in solis fortasse inflammationibus, aut inflammatoriis morbis, aut præter naturam tumoribus, dixit nervos & indurari, & intorqueri. Atque in iis quidem manifestè apparet, nervos intendi. Nam & laborantibus ipsis, & nobis aspicientibus intenti nerui apparent: quapropter nisi currentur, & conuulsiones, & distentiones ad ipsa sequentur. Atque omnium quæ in tumorem attolluntur, cõmune accidens esse videtur ut intendantur. Nam & arterias, & venas inflàmatione laborantes intendi vidimus: venas quidem, ubi per summa mēbra orta inflàmatione glandularum tumor exurgit. Plerumq; N. totum vas intētum videtur, ac rubere magis, & calere, atque maiori dolore (si tangatur) laborare, ita ut satis constet totū inflàmari, incipiendo

do ab ea parte, quæ primario laborat, usque ad alas, & inguina. Proinde rectè dixerunt omnes ferè medici inflammatis partibus accidit ut rubescant, tendantur, remittantur, intumescant, & doleant. Verùm (ut diximus) non omnibus, sed his duntaxat accidit pulsus, quæ arterias habent notatu dignas, & partem sensu præditam, ubi ad notabilem magnitudinem inflammatio attollitur: Tunc N. pulsatorium dolorem sentiunt laborantes, vel nullo existente sensibili vase in patente corpore. Sed interrogabis me fortasse, quæ sint singulorum instrumentorum propria accidentia. Id verò iam antea nec semel duntaxat explicatū est, quod videlicet propriæ actionis noxa, qualicumque sit specie, cuiuslibet partis proprium est accidens: neque. N. aliud ei accidens, nec etiam noxarum differentias inesse necesse est. Nam differentiæ quidem variantur, pro passionis tum specie, tum magnitudine. Accidentis

dentis verò, quòd in vitiata actione est, siue
 genus, siue species, aut vtcunque nomina-
 re volueris, semper permanet. Cæterùm
 satius fuisset Archigenem, qui omnia, via,
 & ratione se explicaturum professus erat,
 abundantius hæc persequi, præsertim cùm
 ab aliis negligentius essent tradita, quorum
 non pauca in plurimis aliis libris conscripsi-
 mus, quemadmodum & deinceps dicetur
 sed breuiori quidẽ cõpendio, ea, quæ exacte
 alibi fuerũt exarata. Lõgior vera disputatio
 ne hic tractabuntur, ea, quæ alibi breuiori
 stylo percurrimus. Nunc verò reliquas do-
 lorum differentias, quarum in perscripto
 sermone Archigenes mentionem fecit, per-
 sequamur. Quod N. peccauerit, dicens stu-
 pidos dolores nervis euenire, quodque stu-
 por non vnus cuiuspiam partis sit passio,
 sed causæ potius, ac passionis rationem ha-
 beat, iam antea dictum est. Quod verò do-
 lores durè distendente in ipsis fieri dicit, re-
 sic dictum est: quanquam melius erat, si

simpliciter dixisset, distendentes, non addēdo, durē. Nam neruorum dolores vtrinque vehementer distendere possunt, quia ad vtraque extrema tenduntur, tūm id à quo incipiunt, tūm illud, in quod finiuntur nō secus quam chordæ in cithara, quæ sæpenu-mero, vbi nimis intenduntur, disrumpi solent. Quapropter citharistæ, cū instrumenta sua post vsum reponere voluerint, chordas relaxāt. Nam planè constat, eas à contrariis, tum causis, tum passionibus intēdi, siue humidus fuerit ambiens aër, vtrigare ipsas, & implere possit, siue vehemēter aridus. Ab vtrāque N. ambientis aëris temperie, ad vltimam tensionem perueniunt, ac merito rumpuntur. Proinde rectē dixit Hippo. neruorum conuulsiones & à plenitudine, & ab inanitione euenire, vtpotē per quas nerui immodicē scilicet tenduntur. Sed quod profundos dixit esse dolores id ab accidentibus, quæ plurimis ex nervis eueniunt

In artubus
verum est ve
nas esse ad su
perficiē spe
ctātes magis
quā arterias,
caterum in
internis illa
rū ramis nō
itā, cū quia
arteria descē
dens per spi
nam nō toto
ductu, vt sub
spina, sed ad
lumbos ele
uatur, tū etiā
quia illuc cū
it vt sub ve
na est: po
steriori cuti
vicinior arte
ria & vena
spectant ma
gis ad pro
fundum ani
mantis.
¶ Infixus do
lor non po
test nervis ac
cidere.

eueniunt, sumptum est. Etenim cum venæ
quidem semper priores in superficie sint,
deinde post eas arteriæ, quibus postea ner
ui subduntur, idcirco laborantes tensionē
in imo sentiunt: quanquam multi tendo
nes, qui ob id, quod nervosa sunt corpora
à nonnullis planè nervi nominantur, non
profundos, sed in superficie dolores habēt
si quando ipsos quoque sic intendi contige
rit: vt sunt illi, qui digitos extendunt. Sunt
autem & qui illos incuruant, in superficie
quidem, sed non similiter vt extendentes.
¶ Porro Archigenes nervorū dolores infi
xos esse dicit, cū huiusmodi doloris spe
cies, vt antea diximus, ad colon magis per
tineat. Atque accedit etiam auri, cum qua
dam pulsatione, atque dentibus molaribus
quinetiam oculis. Sed infixus dolor nervis
minime euenire potest. Etenim magna ex
parte utroque extenduntur, & ad supernas
& inferiores animantis partes. Quod verò
deinceps

deinceps ab Archigene dictum est, nervos angustiae plenos habere dolores, ineptè quidem dictum est. Nam nihil amplius declarat, quàm cum dicit, & minime fusos. Re vera N. minime fusos idem est, quod in latitudine porrectos dolores nervi nō habēt, sed magis circumscriptos, vtpotè perueniente ipsorum tensione & ad supernas, & ad inferiores partes, magis verò sursum usque ad caput. Ac tū primū ipsos universi corporis, & convulsiones, & distentiones comitantur, nulla nervi tensione huiusmodi accidentium aliquod inducere potente, anteaquam caput ipsum attingat. Post hæc consequenter scripsit Archigenes de membranis, quod in latitudinem perveniant ipsis dolores, cū patiuntur. Quod quidem verum esse fatemur. Quod verò aliquid dentium stupori simile habeāt, non est verum, vt antea dictum est. Neque etiam omnino verum est, quod membranarum
n dolores

dolores sint inæquales. Si quidem contrariū magis veritati conſonat: quippe ex propria ratione, videntur æquales inducere dolores, eo quod vniuerſum ipſarū corpus, æquale eſt. Nam quod ob communicationem cum vicinis inæqualitatem quandā afferunt id interdum per accidēs euenire ſolet. Quū N. ad patientem ipſarum partem, circumiacentes & ducuntur, & tenduntur, diſſimilem fieri dolorem neceſſe eſt. Vbi N. intenta particula acutiori ſenſu eſt, ibi dolore vehementiore cruciantur. Vbi verò ſenſum habet hebetiorē, ibi minus dolent. Atq; ex eo quoq; quod quæ tenditur mēbrana os ipſum vel attingit, vel nō attingit, non ab re dolorum differentia deprehenditur. Atque hac ratione nonnulli pleuriticorum iugulo dolent, porrecta in hunc locum membrana coſtas ſuccingente. Aliquando tamen non ad iugulum, ſed ad præcordia dolor tranſit percepto ipſius ſenſu in ſepto tranſuerſo, vtpotē

utpotè quod necessario mouetur, cū pleur-
ritici respirant, idque omnibus thoracis par-
tibus magis. Quum enim veluti radix do-
loris in latere consistit, tū laborātes, mu-
sculis, qui illic sunt, respirare cunctantur:
quare tū soli septo transuersio natura re-
spirationis officium committit, quemad-
modum in bene valentibus, qui libera, &
non violenta vtuntur respiratione, contin-
gere solet. Igitur cū in partibus laterum
infernis oritur inflammatio, septum trans-
uersum intentum magis dolet: cū verò in
partibus supernis, tū iugulum potius do-
lor infestat. Ceterū septum transuersum
quia mouetur, iugulum autem, quia durū
est, doloris causa est. Vbi verò ingens in he-
pate oritur inflammatio, aut vbi ipsum in-
duratum est, dolor, qui tū iugulum in dex-
tra parte infestat, concauæ venæ magis quā
membranarum tensionē sequitur. Quum
autem dixit, hoc modo sæpenumero su-

Causa vena-
rum iugula-
rium è caua
ascēdentium
dolet iugulū
inflammato
hepate.

perficiem quoque dolere, quod non aliud
 est, quam membranarum laborantium spe-
 ciem referre planè declarat, vnd adductus
 ipsarum dolores aliquid hæmodiæ habere
 simile existimauerit. Quia enim simul cū
 hæmodiæ proprietate, stuporis etiam sen-
 sus percipitur, vt ab eadem causā vtraque
 passione dependente, membrana autem,
 quæ in superficie cuti substrata est, sæpe-
 numero stupenti dolore afficitur, vtpo-
 te quæ ab externis causis, & quidem frigi-
 dis, celerius noxam subit. Idcirco deceptus
 Archigenes passionis communitate, cete-
 ras membranas Hæmodiæ simile quidpiā
 habere dixit, ac sæpenumero superficiem
 quoq; , non secundum patientis particulæ
 essentiam facto dolore, sed ob membra-
 narum ipsarū essentiam, quæ exanguis est,
 & frigida, vnde facilè à frigidis passioni-
 bus infestatur. Eos, quia huiusmodi dolores
 comitantur, idcirco sæpenumero dixit fieri
 huius-

huiusmodi dolores, non veluti per patientis particulæ essentiã (lic enim inleparabiles essent) sed per accidens superueniētes. Substrata igitur cuti mēbrana, quæ cum ipsa simul excoriatur, dolores facit tēliuos, & torpidos: membranæ verò quæ in media sunt carne, veluti diuellentes, dolores excitant: Sunt enim plurimæ, & inæqualiter insitæ, atq; etiã circundantes. Quoniam aliquando è diuerso, contra naturã, tendi carnem contigerit, huiusmodi dolores euenire necesse est. Sanè à multis exercitationibus aut tēliui aut vlcerosi pueniūt dolores, qui totos musculos occupare cōsueuerūt, inter quorū parte carnes quoq; numerātur. Verū de huiusmodi doloribus satis in salubribus præceptis iã dictum est. Sed quæ mēbranarum, quæ ossibus adiacēt, dolores & profundi sunt, & ossium ipsorum, veluti dolentiū, inducunt imaginem, haud quaquam mirandum est. Nam ii, à quā plurimis ostocopi nominan-

n 3 tur

tur, & magna ex parte ab exercitationibus euenire solent : quamuis interdū vel à frigore, vel plenitudine, fieri possit. Insuper venas dixit graues, & detrahentes, & æqualiter infartos inferre dolores. Verum ab initio vbi hemicraniae mentionē feci, venas veluti varices incuruari ait. Ergo in hoc solo fortasse accipere oportet, ipsum hoc dicere. Atqui scire licet proprium arteriæ, venæq; dolorem, extensum secundum longitudinem corporis, veluti chordæ cuiusdā speciem referre, nulla utiq; grauitate simul apparēte æqualiter autē infigi, siue infartos esse venarum dolores, admodum obscurū est : quippe infigi, ad nihil, quod ipsis accidere solet, referri potest. Deinde de carnibus dicit, quod & fusos, & laxiores inducāt dolores. Atqui omnino nullus dolor laxus est, nisi eos fortasse, qui minus intenduntur, laxiores vocitet : quoniam & vasorum, & membranarum dolores, magis intendi videantur

deantur. Quod vel ex eo cōfirmari potest, quod eos non adeo extensos conspici dicat, propterea quod carneæ musculorū partes breuibus lineamētis cōtinētur. Sed id, quod deinceps scribit, videri tactum, velutiasperitatibus quibusdā plenum, an propriè ad dolores, qui in carnibus cōsistunt, pertineat, inquirendum est. Nam quōd interdum aliquid huiusmodi per ipsarum dolores eueniat, à veritate haud quaquā abhorret. At quia nō semper euenit, sed facta in ipsis, vt plurimū certa quadā passione, non propriè ad substantiā earum referendū est. Nec simpliciter intelligendum est eam passionē esse inflammatoriam, sed quæ cū humore sit, exasperare suapte natura potēte. Porro deinceps de musculis scribens Archigenes, eos carnis, & neruorum proprietatum missionem propriè referre dicit, tanquam peculiari ipsorū essentia ex his cōsistēte. Addit vetò arterias, quoniam in ipsis inueniuntur.

Atqui hoc pacto, venas quoque dicere debuit, atq; membranas. Vocabulum autē extendētes, patrio sermone de his dicitur, qui boni habitus modo pleni sunt. Atq; idcirco de iunioribus duntaxat dici consuevit, de senibus verò minime, quod nō possit ipsorū corpus boni habitus plenitudinem suscipere. At verò in quam rem hoc vocabulū Archigenes referre velit, inuenire nō est facile, maximè quia confundere, & corrūpere solet patriorū nominū significata. Quod si extendentes, de iis dici intellexeris partibus, quæ à plenitudine intenduntur, non propriè ad musculos, sed communiter ad omnia repleta corpora pertinebit. Quum verò eos capaci cum spacio extendi dicit, puto ipsum hanc à neruorum plenitudine voluisse seiungere. Stupide autem pulsare, haud quaquam fuisse recte dictum, iam antea declaratum est. Reliquorum verò dolorum, vlcerosus, inquit, leuiter acutus est.

Est

Est autem hæc quoque oratio obscura, nec
per se quicquam docere potest, haud aliter,
quàm ceteræ ipsius obscuræ orationes, quas
ne enarrare quidem possibile est : nisi quis
rem ipsam per se intelligens : eam orationi
adaptare conetur. Quum itaque sciueris
tùm medicos, tum exercitationis principes,
eos dolores vocare vlcerosos, per quos in-
ter mouendum, vel tangendum, in laboran-
te parte sensus excitatur, qualis in vlceratis
partibus percipi solet, facile intelliges per
dolorem leuiter acutum, huiusmodi quã-
piam speciem significari, qualis ab acutæ
acus punctura fieri consuevit, Ergo constat,
ipsum nec continuum esse, nec æqualiter per
omnes partes porrectum. Hunc itaque dul-
ciorem esse dicit, cum dicere deberet imbe-
ciliorem, aut obtusioorem, aut non vehemẽ-
tem, aut minus molestum, aut id genus a-
liud quidpiam. Nihil N. quod molestum
est, propriè dulcius appellari potest. Id au-
tem,

tem, quod dicit, & pruriginem inducere potest: inarticulate dictum est. Quippe haud obscura est inter pruriginis sentum, & vlcerosam passionem differentia. Verum quia crebro pruriginosa passio vlcerosam antecedit, atque soluta, quiescentéque vlcerosa in pruriginosam trāsmutatio fieri solet, inde est, quod de ipsis confusè, indefinitéque Archigenes scripsit: quemadmodum nec causas harum passionum alicubi exactè tractauit. Verum nos eas in libris salubrium præceptorum perfectè exarauimus. Igitur vlcerosus dolor, nō solū ad cutē, sed ad imas quoque partes, vsq; ad ossa extenditur. Pruriginosus autē re vera ad solam superficiem pertinet, non tamē primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidēs. Ipsa N. omnes sibi subiacētes partes ipsiusitudine superat. Horū ergo dolorum vterque, propriæ passionis est accidens: fiunt autem ob acres quosdā humores, atq; tantū ipsi, quātū passionēs ipsæ interlèse

interfese differunt. Sed, vt dixi, satis de ipsis in libro salubrium præceptorum definitum est. Punctorius verò (inquit) dolor, in profundo est. Sed nō rectè: nā ad mēbranas non ad imas partes propriè pertinet. Infixus autē (vt inquit) cū sinus accesserit. Qui sermo omnino absurdus esse videtur. Quippe sinus, concauitas quēdam est, cum partiū, antea coniunctarum, altera distat ab altera, cū itaque fluxione impletur, ita vt adiacentes partes distendantur, tūm tensuum dolorē sentiunt laborantes, non quidem in longitudinem porrectum, sed propriis limitibus circūscriptum. At excreto quomodo-libet è sinu humore protinus dolor conquiescit, nisi ambientia sinum corpora adeò distendantur, vt inflammatoria passione torquentur. Hæc sunt quæ propriè ad sinus pertinent. Quòd verò ab Archigene dictum est, aliud ab his est, vnum quid intellexerit, cū ita scriberet, haud facile

facile inueniri potest. At quod deinceps scriptum est, non minorem habet dubitationem. Nam stimulans (inquit) dolor non in imò subsistit, Hic N. sermo, cū eo, quem in initio huius sermonis præmissit, pugnare videtur, quo in hunc modum scripsit: stimulans autē, partim eorum, quæ in loco sunt, quid piam pati declarat, partim contra. Id N. fieri potest, & in parte ossibus maximè vicina, & in cute atq; omnino in medio huiusmodi dolore factio ab humore mordaci, sensibilibus partium aliquam erodente. Deinde quod in fine eiusdem orationis sic scriptum est: lacerans autem est, qui in sinu cōsistit. Si lacerans quidem idem significat, quod diuellens, mendacium est. Nam illi, qui in sinu est, id minimè contingere solet. Quod si non hoc, sed aliud quid piam dicere voluerit, quomodo id poterit inuenire? Atq; huiusmodi sunt, quæ in præscripto sermone Archigenes posteris memo-

memorię prodidit. Igitur tranſeamus ad alium, qui & ipſe ex dolorum differentia, patientes partes cognoſcere docet. Eſt ipſius ſeries huiusmodi. hæpatis verò dolor, tractorius & inhærens & torpidus eſt atque attatrocius moleſtans. Splenis autem acutus non eſt, ſed & gravitatem ſimul, & extensionem habet, atque ſimilis videtur ei, qui ad eluſionem quidem, atque expreſſionem, ſed extrinſecus incumbentem, reniſtitur. Renes & auſteres dolores inducunt, & cum permanente aſtrictione pungentes. Veſica vehementer aſtringentibus utitur doloribus, atque intenſionibus punctoriis. Uterus autem acutis, perſultantibus, pungentibus, diſtendentibus torminatim incidentibus: quippe qui huiusmodi miſtione dolere natus eſt: quam obrem proprietatis quoque ambiguitatem inducit. In hoc ſermone, iterum Archigenes protinus ab initio hepatis dolorẽ Holcimon (id eſt tractorium)

rium) esse dicit. Verùm hoc vocabulum ὄλημι, apud græcos in vsu non est: proinde quid significet, haud facilè inuenire est. Nam vocabulorum significationes ex longo vsu deprehenduntur. Atqui video eos, qui illo vtuntur, viscidum per ipsum velle significare, quale viscum esse videtur, vt cuius vna parte tracta, potest per ipsam reliqua illi continua simul attrahi. Sic massa farinae quoq; ex frumento holcina dicitur, maximè, si accuratissimè subacta fuerit: sed ex ordeis, aut milio pasta, holcina non dicitur. Atqui sub hac significatione hepatis dolor haud quaquam holcimos euadet, proinde aliam significationē querere oportet. Itaq; vnus ex his, qui Archigenis sectam reliquis preponere conātur, holcimon hepatis dolorem dici asserit, cum hepar, vel induratum, vel inflammatū, detrahare iugulum videtur. Alius, cum diuturno morbo laborat. Alius, cum mediocri dolore afficitur.

tur. Sunt qui tardum ipsum significare velint vtpote qui acuto aduersetur. Atque vrgentem, & adeò vehementem, vt nullam admittat requiem, acutum vocare ipsum dicunt: contrarium verò, nempe tardum holcimon. Nonnulli verò eum dolorem holcimon vel grauem dicunt, qui grauitatis speciem refert.

Vsu enim deceptum putant vt de grauitate tractus dicatur. Multa autem & alia, variè explicantes dicunt, qui admirantur ea quæ nullus intelligit. Constat igitur hoc vocabulum holcimos, quòd in propositæ orationis initio inuenitur, nihil nos posse docere. At verò deinceps consideremus, quid vtique sit dolor inhærens.

Nam hunc hepatis proprium esse dixit.

Mihi quidem facilè persuasum est, persultanti dolori inhærentem per contrarietatem opponi, ipsum dicere voluisse. Quid enim aliud conicere, quis possit?

At

At verò hepatis dolor, si quispiam alius, vicina corpora ad consensum inducit. Nā & ad iugulū vsque porrigitur, & spirandi difficultatem creberrimè affert: atque interdū tussim quoque ac dysenteriam, nec raro nothas costas infestat. Igitur quonam pacto vere dicitur eodem in loco permanere? Ac fortasse satius fuerit putare quod inherentem dolorem dixerit, veluti infixum. Atqui hepatis dolor vt nuper ostēdim⁹, haud quā huiusmodi est. Similiter antea iam declaratum est, ne torpidum quidem dolorē particulæ cuiusquam proprium esse. Nam ad pationem potius referendus est. Si verò etiam alicuius particulæ esset, nequaquam hepatis. Verūm si sanè ita se res haberet, neruorum corpusculorum esset. Porro atrociter molestus, cum torpido pugnat, vt pote qui violentus est, atque continuus. Sed nec huiusmodi quidem hepatis dolor est, sed potius grauis. Ac ne grauis quidem,
exacte

exacte proprius hepatis est, sed spleni quoque, ac renibus inflammatis communis. Equidem non satis mirari possum quo pacto Archigenes ad lienem duntaxat, hanc doloris speciem referre tentauerit. Nam vel Hippocratem audire debuit dicentem: & in rene dolor grauis. Verum hoc peccatum exiguum forte censebitur. At longe maximum est illud quod committere solet, nomina scribens cæteris sensibus peculiaria, quemadmodum nunc de renibus quidem, austeros scribit dolores, de vesica verò astringentes. Hæc N. saporum sunt nomina, qui lingua, vt instrumento, & gustandi sensu dignoscuntur. Igitur res quædam declaratur, generatim quidem, per hoc vocabulum astringens, sed magis particulatim per austerum, & acerbum, quippe ambo astringunt, sed magis acerbum, qualis est omphacitis vocata galla. Porro austera sunt, multa, vt mali punici genera, atq; cotonea mala,

Astringens
genus est ad
acerbum &
austum. li.
j. de simpli.
me. fac. cap.
xxxvij. quod
idem repetit
lib. iij. eius-
dem operis.

la, ac reliquo complura mensis apta. Sanè acerba, haud quaquam sunt iucunda, non solum ea, quæ medicamentorum speciem referunt, veluti Hypocystis, & Balauſtium, & Galla, & Rhus, sed etiam illa, quæ cum sint huiusmodi, recipiuntur tamen in cibos. Quapropter non excogitari quidem potest, quid vel austerum, vel acerbum dolorem dicere voluerit Archigenes, non magis, quam aut cæruleum, aut rubrum, aut fuscum, aut alium aliquem, à caloribus nominatum. Nunc autem quid dixerit doctor quidam ex Archigenis familia, tempus est considerare. Nam dolorum proprietates Archigenem studiose interpretari voluisse cenſet, at quia re vera ineffabiles sunt, eum in huiusmodi nomina absurda incidisse, non intelligentem vnamquamque qualitatū, siue gustabilem siue tangibilem dici posse. Vbi verò multæ qualitates circa vnā essentiam apparent, ibi & proprie-

proprietaem fieri contingit, idque maxime in gustu videre est, si aliquando & amaritudinem, & dulcorẽ, & austeritatem, & acrimoniam, in vna essentia apparere contigerit. Sic enim in gustu proprietas quædam oritur, ineffabilis illa quidem, si vnico nomine ipsam explicare tentaueris, sed quæ dici tamen potest, si per singulas qualitates discurras, eo addito, quod & magis, & minus declarare, haud impossibile est. Ita & herbas vniuersas, & reliquã quoque materiam enarrauerunt medicorum non pauci, singulas qualitates, quæ enutiatibus rebus insunt, explicantes. Ergo Archigenes, si vniuersam essentiaẽ proprietatem vnico nomine comprehendere voluerit, indoctus omnino fuisset.

Id, quod de Archigene nequaquam sentiendum est. Si autem simplices qualitates, ipsæ quidem ineffabiles non sunt, eorum verò quantitas, exacta quidem mensura,

O 2

ineffabilis

ineffabilis est, quanquam sub latitudine quadam explicari potest. Igitur longiori sermone uti non oportet, cum ea species ob oculos omnibus sit posita, qua uti debet is, qui quanlibet rerum sensibilibum interpretari aggreditur. Quippe omnium tangibilium qualitatum propria habemus nomina, haud secus, quam gustabilium, visibilibum, & audibilium. Atque omnibus iis patrio more uti debemus, & neque astringentem, neque austerum nominare dolorem, utpote quæ saporum propriè appellationes sint. Plurimi N. medici Archigene antiquiores, cum dolorum differentias conscriberent, haud quaquam ausi sunt à consuetudine in nominum usu recedere, quæ & ab ipsis laborantibus audire licet, qui perinde se dolore interdum aiunt, quasi acu pungantur, ac rursus perinde, ac si terebra perforentur. Quinetiam videri sibi aiunt contundi sese, & diuelli, & tendi, & retrahi, & detrahi &

& grauitatis cuiusdam sensum percipere, interdum ex superioribus dependentis, interdum circum:positis incumbentis. Igitur vt huiusmodi nomina omnia facilè intelliguntur ita astringentes, & acerbi, & austeri dolores, intelligi haud quaquam possunt, ac præterea ab usu omnino alieni sunt. Hæc intelligere debuit Archigenes, cùm docere nos vellet, quomodo loci patientes possint cognosci.

Nam omnis, qui de doloribus habetur sermo, vanus, nugarumque plenus esse censetur, nisi ex his, quæ laborantes ipsi dicunt, eos cognouerimus. Ergo si ab ipsis, quomodo dolèt, discere oportet, nūquam verò dicunt acerbum, aut austerum, aut atrocem, aut holcimon dolorem, rursus inutilis erit huiusmodi doctrina. Præterea ex eo loco, quo dicunt Archigenem interpretari velle dolorum proprietates, hæc docendi ratio, tūm impossibilis, tūm inutilis

o 3 tilis

tilis esse planè videtur. Primum enim vel ipsis authoribus, non omnis ipsorum proprietas enuntiari potest: quod cum ita sit omnino fieri non potest, ut ea sub doctrinam cadat utpote quam ii duntaxat, qui sensibiliter ipsam percipiunt, noscere possunt. Deinde ea nobis ignota sit necesse est, qua non laborauimus, nisi fortasse Archigenes omnes sui corporis partes habuerit laborantes. Quod licet concesserimus, fieri tamen non potest, ut credamus vnum hominem omnes singularum partium passiones fuisse expertum.

Donemus tamen (si volueris) hoc quoque, quanquam impossibile est. Nam vteri saltem passiones nunquam scilicet percepit Archigenes, nihilominus huius proprietates conscripsit, quæ à solis mulieribus expertis dignoscuntur.

Itaque admirationem (ita dii me ament) sæpenumero mihi induxit, ex qua tandem
ratio

rationatione , tam absurdam hanc doctrinam collegerit : quam & si veram contendis , nihil tamen ex ea utilitatis provenire fateri cogèris , nullo infirmo suas passionem per Archigenica nomina interpretante . Nam quod nonnulli laborantium fastidire stomachum aiunt , id nobis , eo quod aliquando laborauerimus , planè notum est : sicut etiam inæstitia torqueri , quippe quosdam sic laborasse satis constat .

An verò austero dolore , ab Archigene dicto , quispiam fuerit affectus , intelligi non potest : utpote nemine sciente , cui nam rei nomen hoc adaptaverit . Nam punctorium , & distendentem , atque eos , qui ita nominantur , atque iis multo magis vehementem , & fortem , & violentum , & continuum , & intermittentem , nemo est quinon noverit : utpote qui per nomina à consuetudine non abhorren-

tia enarrantur , & quos quotidie euenire videmus . At austerum , & astringentem , & atrocem , & holcimou , vt nemo profert, ita si quis fortasse proferat , nemo intelliget . Cæterum , oportet & passionem esse communem & appellationem ipsam declarantem, ab auditorum consuetudine non aberrare , veluti cum stomachum præmi dicimus, id quod nemo non dicere solet : quippe tali sæpenumero sensu laboramus : qualem extrinsecus onus aliquod incumbens, inducere potest, idque in nonnullis oris ventriculi passionibus , quod per abusionem non solum populares , sed probatissimi quoque medici stomachum appellant . Quinetiam inter vehementer respirandū, nonnunquā grauitatē in dextra præcordiorū parte sentimus, Id, si citra febrim eueuiat , aut obstructione, aut dura passione, hepar laborare coniciendum est. Veluti cum inflammatione infestatur.

festatur, febrim comitari necesse est. Itaque omnia huiusmodi & dici possunt, & manifesta, ac nota sunt, omnibus medicis Archigene prioribus, atque sine absurdis illis nominibus, ab illis ipsis prodita. Archigenis verò doctrina hoc habet exactè proprium, ut non nouarum rerum, sed nominum rem nullam declarantium, enarrationi studeat. Nam librum de pulsibus, huiusmodi nominibus impleuit: quamuis ille, ut in commentariis de pulsibus ostēdimus, haud quamquam translatis indigeat nominibus.

Nullis cap. hoc Scholijs indiget præter scripta in marginibus.

CAP. VI.

Relectiuncula.

Refutato in multis Archigene iam tandem Ga. scribit breuem methodum inueniendi patientem particulam, ea
o s est

est considerare seorsum signa, quæ consequuntur patientia loca, deinde, quæ passionēs ipsas: deinde ea, quæ consequuntur hæc ambo. Proponitq; ad hanc considerationē pro exemplis, peripneumoniam, & pleuritidem, quorum morborum, quædam signa sunt, quæ causa locorum patientium contingunt. Quædam quæ causa ipsorum, quædam quæ amborum.



QUIDEM vellem Archigenem tantorum medicorum successorem, aliquid lucis doctrinæ addidisse, sed eam ita obscuravit, ut ne nos quidem qui in artis operibus iam senuimus dicta ipsius intelligere valeamus. Quod igitur illius erat officii, id ego præstare nitar. Docebimus etenim imprimis viam & rationem vniuersalem, cuius adminiculo, & ipse patientes locos inuenire, & cæteris viâ ostendere possis. Igitur ut in priore libro dictum iam est, via & ratio huiusmodi est. Imprimis enim querendū nobis est, an singulorum locorum, quomodocunq; patiatur, propria signa inueniri possint. An pro
passionum

passionum ratione alterentur. Deinde utrū
 singularum passionum propria sint signa,
 an circa quamlibet partem varientur. Ita, vt
 oportet, & loci, & passionis non immemo- ^{27.}
 res, deinceps signa perstringere. Veluti si ita ^{signa per signu}
 acciderit, vt pulmo inflammatione labo- ^{niay}
 ret, tanta inducetur spirandi difficultas, tan-
 taque angustia, vt suffocari laborantes vi-
 deātur, ac recti sedere conentur: quam pas-
 sionem ortopnoeam nominant. Quinetiā. 2.
 calidam sentiunt respirationem, idque ma-
 xime si erysipelatis particeps fuerit inflam-
 matio: quocirca vbi plurimū efflant, iuuari
 videātur, ac multū aërem frigidū attrahere
 concupiscunt, satq; inter tussendū sputum. 3.
 expuunt, idque modo hoc, alias alio colo-
 re infectum, vt interdum rubrum, interdū
 flauum, aut rufum, ac spumofum quoque
 & nigrum & liuidū appareat. Insuper gra- 4.
 uitatis cuiusdam thoraci incumbentis sen-
 sum, sæpenumero percipiunt, ac dolorem

ex imo ad ipsum peruenire, & ad pectus, &
 5. ad spinā. Præterea acuta est ipsis febris } Pul-
 6. sum verò habent, qualem in libro de pul-
sibus diximus. Sic ubi mēbrana costas suc-

in pluri feci. 1.

- cingens inflammata est, acuta febris infe-
2. stat, & accedente pulsus eam, quam in com-
- mentariis de pulsibus diximus, proprietate.
3. Est autem dolor punctorius, vnā cum spi-
4. ritus difficultate, & magna ex parte sputum
5. colore infectum apparet, haud secus quam
in peripnæumonia. Igitur vtriusque passio-
- nes spirandi difficultas necessario comita-
- tur, eo quod patiens particula spiritus sit in-
- strumentum, oritur autem febris, & prop-
- ter passionem ipsam, & propter positum.
- Nam & pulmo, & succingens costas mem-
- brana prope cor constituuntur. Inflamma-
- tio verò calida passio est. Sic etiam tussis,
- ipsis vt spiritalibus cōuenit. Spuere autem
- aliquid ab ipsa passione procedit. Quippe
- iam ostendimus, omnem inflammationē,

ex affluēte fieri sanguine: quapropter si biliosus fuerit sanguis, flauum aut palidum erit sputum. Si pituitosus, & spumans, & cādidum, si melancholicus, aut nigrum, aut liuidum. Si nihil horum sanguinem infeccrit, rubrum. Quinetiam in laterali morbo sæpenumero magis biliosum, in peripneumonia verò magis pituitosum sequi consuevit. Sed hoc satis iam declaratum est.

Quod autē inflāmatarum harū partium ex cremēta per asperam arteriam afferuntur, eius rei causa, tūm appositum, tūm ad formationem referenda est: quippe quæ per solam hanc viam effluere possunt. At verò ventriculus duos habet meatus, ac quod in eo vitiosum est, supernatare solet, vomitio neq̃ eiicitur: quod verò in intestinis continetur, deiectione vacuatur. Veluti renum, vesicæquē excrementa meiēdo excernuntur. Cerebri verò redundantia, per nares præcipuè, nonunquam verò per palatum, &

*respondet facie.
repleti quare ff.
in inflammatione ad
par si as G. heffie
repletiatur*

& aures vacuatur. Igitur sedes patientes dignoscuntur, & ab accidentibus, & ab actione læsa, & excrementorum qualitate, & à tumoribus præter naturam, & doloribus, & à coloris vitio, quod sequitur, in vniuerso corpore, vel in vna quapiam parte, vel duabus, idque maximè in oculis & lingua, præter hæc aut sunt, si placet, quæ propriè appellatam compassionem cōsequuntur. Vt in primo libro dictum est.

SCHOLIUM.

VIDEBIT VR fortassis inconstanter docere Gal. quia non eadem connumerat signa ad dignoscendas patientes partes, atque in primo libro, illic enim dixit eas cognosci ex actione læsa, excrementis, positu, doloris proprietate, & proprijs accidentibus. Hic vorò etiam tumoris & coloris meminit, positus nulla facta mentione. Veruntamen in idem recidit hæc, & illa diuisio. Nam color illic intelligebatur sub accidentibus, hic distinctioris doctrinæ causa est per se scriptus. Quia positus hic nō meminit, connumeravit tumores. Nimirum positus per excrémenta & tumores, & dolores cognoscitur, potuit

potuit ergo ille taceri, vbi hæc dicebantur. Ex recrementis docuit cognoscere illum Hipp. in apho. dicens. Et in qua parte sudor multus est, in ea est morbus. Ex tumoribus docuit Gal. in superioribus dicens, tumorem dextri hypochondrij malum hepatis, tumorem sinistri, malum lienis significare. Ex dolore quoque eodem modo sentitur laborans pars, scilicet vbi dolor ibi morbus, oculos facillimè infici colore referente corporis morbum. Author est Hippo. 6. epid. part. 4. capi. 17. dicens, ut oculi valent, ita & totum corpus, & color in melius, aut deterius mutatur. Linguam quoque idem pati & perinde significare est idem author par. 5. eiusdem 6. epid. apho. 14. dicens lingua lotium significat, chloræ quidem biliosæ.

CAP. VII.

Relectiuncula.

Nunc deducit Gal. discipulos ad exercitationem, docetq; primum patientes particulas distinguere. Propositis exemplorum loco inflammatione iecoris, & pleuritide costarum inferiorum, quia hæ duæ inflammationes propter similitudinem symptomatum sunt distinctu difficillimæ. Deinde docet cognita particula laborante speciem causæ, à qua læditur, distinguere, idq; facit propositis pro exemplis cerebri passionibus, sopore potissimum, peruvigilio, & delirio.



T nunc tempus esse videtur, vt
 amicos, quorum petitioni obtē-
 perās hos commentarios scribe-
 re aggressus sum, ad exercitationem indu-
 cam. Fit autem exercitatio omnis, cūm par-
 ticularia sub eandem viam & rationem du-
 cuntur. Huiusmodi autem doctrinæ specie,
 vt persæpe ostendimus, non aliud inueni-
 tur vtilius: quippe viæ, & rationes, vbi so-
 læ sine multifaria secundum ipsas exercita-
 tione cognoscuntur, haud quaquam pos-
 sunt perfectos efficere discipulos. Quum
 igitur in superioribus viam, ac rationem di-
 xerimus, ad exercitationis modum acceda-
 mus. Imprimis quidē intueri oportet, num
 actio aliqua sit læsa, quippe cūm ipsa pro-
 prium actionis instrumentum laborare ne-
 cesse est: deinde vbi actionem læsam esse
 perspexeris, ad modum læsionis accedēdo,
 considera ad quam passionem propriè per-
 tineat. Postea patientem particulam nota,
 num

*per se per bandu
 ceptū in medi
 braxi et ague
 nris hū curatis
 prognostici cum
 casari hū in
 in in affectibus
 ut hū mber u*

num tumore quopiam, aut dolore infeste-
stur, & quidem accuratè cuiuslibet horum
speciem inuestigando. Nam non solum tu
morū, verum etiā dolorū quoq; varios mo
dos didicisti. Aspice subinde patientis par-
tis excrementa, per quem meatum vacuen
tur, ac vide, num aliquid essentiae à patien-
te parte secernatur. Ad hæc vtrum omnino
incocta sint ipsius excremēta, an mediocri-
ter cocta. Ac deinde quibus, ex ipso corpo-
re, totum, quibus verò partes aliquæ incō-
modum subeāt, partim circa actiones suas,
partim circa colorē, aut figuram. Eſto e-
nim vt quispiam inter respirandum in no-
tharum costarum loco doleat, nō protinus
hunc esse pleuriticum suspicari debes. Sed
imprimis quidem, an tussiendo aliquid ex-
puat, intueri. Id enim si coloratum, vt di-
ctum est, videris, tum ipsum pleuriticū esse
dices. Quod si tussiendo nihil omnino ex-
puat, fieri potest, vt nihilominus pleuriti-

cus fit ille quidem, sed inflammationē habeat, & incoctam, & strictam adeo, vt nihil ab ea foras eiici possit. Ac fieri quoque potest vt ob hepatis inflammationē dolor in iam dicta sede excitetur: intentis videlicet internis vinculis, quibus nonnullorum iecur costis alligatur, atque sic dolor ad succingentē costas membranā perueniat. Verū nequaquam similis est pulsus, in hepatis, & membranæ costas succingentis inflammatione, ac ne alui quidem excrementa similia sunt. Imo hæc non in qualibet iecoris inflammatione insunt, sed in his passionibus quæ propriè iecorariæ nominantur. Igitur

*illic est hic alui pulsus
si est qd in epatici
magna excrementa
nutritio. qd qd crue
int. et similia. Quid
is recens in actus
eade magna mutatio
q. semper adest aut
inflammatione p. qd
vbi est iecoris
none id est iecoris
tale. et si mutatio
in adgit in excrementis
aut in git in p. l. u.*

vbi nihil excernitur, à quo indicatiū aliquod sumi possit, satius fuerit præcordiorū dextram partem tangere: quod si nullus apparet tumor, ne sic quidem desistere oportet. Quippe fieri potest vt in sola sima hepatis parte sit inflammatio. Similiter etiā in gibbis partibus, vbi non omnes, sed hæc dū-

taxat intumescunt, quæ à nothis costis cōteguntur. Itaque laborantem, vt vehemēter respiret, monere oportet, deinde interrogare, num grauitatem sentiat, aut suspensam à superioribus, aut incumbētē vicinis. Accidit autem aliquando, vt in his, haud secus quam in hepate, oriatur tumor præternaturam, cuius occasione septum transversum oppressum, respirationem efficit difficiliorem, atq; qui ita laborant, ab exigua tussi irritentur. Ergo in huiusmodi passionibus solidum, firmumquè discernendi indicium per omne tempus morbi à pulsumendum est: deinde tractu temporis, reliqua quoque accidentia cōsideranda sunt. Nam & linguæ, & vniuersi corporis color alteratur, vbi hepar vitiatum est. Sicut rursus thorace patiente, tussis increfcit, atque eo tempore omnino apparent ea, quæ tussiendo exprimuntur.

VBI legimus, ad modum læsionis accidendo considera ad quā passionē propriē pertineat. Legitur in græco codice ἐπι τὸν τροπὸν τῆς βλάβης ἀφορικόμεν· ἐπισκέψο τίν· ἐσὶ πάθους ἰδίου. id est (si verbum verbo vis reddi.) cum a dmodum læsionis accesseris, considera cuius passionis est proprium. Quoniam verò hæc verba non valde videntur coherere, dictio enim proprium, græce ἰδίου, non videtur quid referat, non enim læsionem, nam ratio grammaticæ non fert dicere, læsio proprium, vel βλάβη ἰδίου. Fuchsius literam græcam permu-
tans, loco παθούς legit παθός, & ita deinde transfert, ad læsionem accedendo cuius est propriū pathema considera. Et relatiuum, cuius, dicit referre, læsionem. Itaque intelligit, considera cuius læsionis est pathema. Qui sensus mihi videtur peruersus. Nam præterquam quod non video quid ita à Gale-
no doceretur, quia pathemata non sunt læsionum, sed læsiones pathematum, tollit pulchrum sensum, scilicet oportet primū considerare læsionē actio-
nis, videreq; ad quod instrumentū pertineat, deinde modum læsionis, ac considerare ad quam passio-
nem pertineat, vt ita cognoscātur pars læsa, & mor-
bus. Nimirum vt dictum antea est, læsio actionis si-
gnificat partem laborantem, modus læsionis passio-
nem. Ergo errauit Fuchsius, legendūq; est. Conside-
ra ad quā passionē propriē pertineat, suple modus
læsionis

læsionis. Aut reddendo verbum verbo. Considera cuius pafsionis sit (suple modus læsionis) proprium, suple signum aut malum. vbi nos legimus ac deinde quibus ex ipso corpore totū, quibus verò partes aliquæ incōmodū subeāt. Copus legit ac deinde quibus vniuersum corpus, quibus priuatim quædā corporis partes fruuntur; Fuchsius legit, ac deinde è quibus vniuersum corpus, è quibus partes aliquæ læduntur. Alij legunt, atq; ex eo an totum corpus aut partes aliquæ incōmodum ferant. Græca litera ita habet. *κατατα τίνων μὲν, ἐξ αὐτοῦ συναπολάβει τὸ πᾶν σώμα, τίνων δ' ἐξ ἑρέτος μέρη αὐτῶν*, i. reddendo verbū verbo. Deinde quibus ex ipso fruitur aut læditur, totum corpus, quibus partes aliquæ. Fuchsius censet codicem esse deprauatum legendumquē vbi ἐξ αὐτοῦ id est ex ipso ἐξ αὐτῶν id est, ex ipsis. Quia non videt, illud ex ipso quid possit referre. Ex ipsis verò refert excrementa, qualidicat, quibus ex ipsis excrementis, totum corpus, & quibus partes aliquæ læduntur. Cæterū ego non ita puto (cur enim dicam vitiatū esse codicē. cū sensus verbis haud quaquam mutatis constare possit?) sed illud ἐξ αὐτοῦ, id est ex ipso, corpus referre. vt ego in mea lectione expressi. Quod verò alij legunt læduntur, aut incōmodū subeant, ferantur, alij fruuntur. Factum est quia verbum *συναπολάβω*, quo Gal. hic vtitur, significat frui aut ferre malū, itaq; portare aut bonū aut malū, vt est phrasis Hispana. Vtūtur n. Hispani verbo gozar in bonam aut malā partē. Latini

ni non ita, sed frui in bonam partem accipere solent, proinde ego nolui legere, vt Copus, fruuntur sed incommodum subeant. Hepar per membranas peritonæ scilicet, ex quo habet suum indumentū & per omentum alligatum est costis inferioribus, vbi illis hæret septum transversum, id verò non in omnibus accidit nec hominibus nec simijs, vt docetur à G. li. 5. ca. 7. huius operis, proinde ergo modo dixit, quibus nonnullorum iecur costis alligatur.

IGITUR quemadmodum fieri nō potest, vt illeſis spirandi, tūm partibus, tūm instrumentis, difficilis fiat respiratio: (accidit autē interdū nullo existente in ipsis proprio morbo, sed transuerso septo, aut de tracto, aut oppresso, vt homo difficulter spiret) ita etiam vsu venire solet in ea sede, quæ principem in se animæ facultatem cōtinet. Nam cū & scientia, & opinio, atque cogitatio omnis in ipsa consistat, si harum aliqua lædi videatur, protinus ipsam quoque passione quapiam laborare arbitramur. Nam vbi vel in pleuritide, vel peripneumonia delirium incidit, nemo vel à costa, vel à pulmone accidens hoc prouenisse dixerit. Quippe vniuersi eam partem, in

qua princeps animę vis residet cōsentire, putāt, ac nititur quisq; vt modū cōsensus sectę suę cōformē ostēdat. Verū in aliis passiōibus nō cōsentire, sed primogenia ipsā passiōe laborare aiūt, veluti in lethargo, & phrenitide. Sēper verò pati, vbi ppriarum ipsius actionū aliqua lēditur. Proprias actiones dico, quas per nullā aliam partē, velut per instrumentū facit. Nam re vera & videre illā & audire haud quaquam negandum est, sed videre oculis, & audire auribus. Atqui vt cogitet, & reminiscatur, & existimet, & eligat, neque oculis, neque auribus, nec lingua neque alia quapiam parte vtitur. Quod si hæc animæ pars ita esset in cōtinente ipsam corpore, vt nos in domo aliqua fortasse nullam omnino ei noxā afferri putaremus à loco quoniam verò ipsam lædi videmus, quomodo lædatur, est inuestigādum. Si verò veluti forma quædam corporis est, ab ipso inseparabilis, eam lædi non inficiabi-

mur, ob suscipientis ipsam corporis alterationē. At quia de hac re inter Philosophos ingens pugna est, aliis eā veluti in domicilio cōtineri dicētibus, aliis verò ipsam corporis formā esse putātibus, idcirco quomodo lædatur inuentu perdifficile est. Quod verò lædatur, ab experientia discere licet. Etenim ubi fracto capitis ossi terebra adacta est, si quis vehemētius cōprimat, protinus sensum omnē amittit laborās. Quinetiam si inflāmatio quædā oriatur. Nam hanc etiam euenire interdum videmus. Mentem itaque lædi minime negandum est. Præterea nonnulli per vehementem capitis vstionem dilirauerūt, atque per fortes ictus capiti adactos sæpenumero itupidum soporē sequi videre est: multæ quoque passiones in capite consistentes mentem haud obscurè vitiant adeò, vt etiā populares, cū aut delirare aliquem, aut mentem quomodolibet laborare conspiciunt capiti remedia adhibenda

adhibenda esse censeant. Verùm eminuerò quod principium sensus, & motionis ab impetu prodeuntis, sedem in cerebro habeat, & quod hoc à meningibus contegatur, id in aliis commentariis, quam verissimum esse declaratum est. Nunc verò quomodo distinguantur passiones primitivæ ab his, quæ per consensum eveniunt, considerandum est. Nam huiusmodi speculatio propriè ad hoc nostrum, institutum pertinere videtur, & quidẽ nõ sine manifesta utilitate: quippe ad curandi rationẽ imprimis pertinet cuius parti remedia sint adaptanda, cognovisse. Nã per solũ cõsensum læso cerebro si ea pars, quæ primitiva passione laborat, fuerit curata priusquã cerebro propria aliqua eveniat passio nullũ in ipso relinquitur accidẽs. Quod si ex cõsensu, permanẽs aliqua fiat in ipso passio tũ nõ solũ parti, quæ primitiva passione laborat sed capiti quoq; remedia adhibere oportet. Quapropter

p s exactè

exactè definire vtrū cerebrū, an mēbranæ
 ipsius primitiue patiātur, haud magnā vti-
 litatē afferre potest. In vtraq; N. passione ca-
 piti succurritur. Igitur huic rei nō ita vehe-
 mēs studiū adhibere, sed morbi potius essen-
 tiā, qualis sit, inuenire cōuenit: quippe humi-
 dū exiccare aridū humectare, frigidū calface-
 re, calidū refrigerare oportet ac si coniugata
 fuerit passio, per contrariā cōiugationē ip-
 sam curare, vt calidā & siccā humectare, &
 refrigerare, humidā frigidāq; exiccare & cal-
 facere, atq; in reliquis duab; cōiugatiōibus
 est portione, ac in ceteris morbis omnib;, ea-
 dē ratione similiter facere cōuenit. At vnus
 cuiusq; speciē, in libro de morborū differē-
 tia psequuti sum;. Quū itaq; & cerebri, &
 mēbranarū eius, iidē morbi simili curatiōe
 indigeāt, logica magis, quā ad curationē vti-
 lis esse videtur questio in vtrolibet illorū cō-
 tineatur princeps animę facultas. Verū an in
 corde sit ea facultas, lōge diuersā, atq; omni-
 no

no differēs est quæstio. Esto N. vt à flauabile in corde & accumulata, & putredine affecta, phrenitis sit excitata, nōne delirare videbitur is, qui caput oxyrhodino p̄fundere iusserit? Nam si hoc præsidio phrenitidis causa sanari possit, non capiti, sed thoraci, ipsū adhibere poterat. Nec tamē vniuerso thoraci, sed illi duntaxat parti, in qua cor cōtinetur.

S C H O L I V M.

SCIENTIA & opinio species cogitationis sunt, pertinetq; ad cogitatiuā vim, quā teste Aristot. 1. de historia animalium cap. 1. animantium omnium solus homo habet. Propriæ actiones aliquādo dicuntur à Gal. quæ nō sunt cōmunes vt gustare, est propriū linguæ, quia nulla alia corporis pars gustat. Ita finit. 5. de locis patientibus cap. 7. Aliquādo dicuntur propriæ alicui parti quæ aguntur proprietate aut si militudine substantiæ, vt sanguinis generatio actio propria est hepatis, venis nō est propria. Quia in hepate generatur sanguis gratia proprietatis, substantiæ ipsius, in venis, nō ita, sed calore cū ipsarū, tū mēbrorū circū iacētium, tū etiā sanguinis qui ab hepate

hepate confectus venit, cocta pituita transit in sanguinem, non aliter quam multum in dolio coctum transit in vinum, quanquam vini conficiendi non est proprietas dolio. Hoc modo est vsus Gal. nomine propriae actionis lib. 6. de placitis. Hic vero in alia significatione eo vtitur dicens actiones proprias membri alicuius esse eas, quas per se ipsum obit id membrum, non proprias vero, quas obit aut membrum, aut facultas, quae in eo est, sed per alia instrumenta. Ita imaginatio, extimatio, & recordatio, propriae actiones cerebri sunt. Quia cerebrum imaginatur, extimat, & memoratur seipso, citra aliud instrumentum, vt ventriculus retinet, & coquit, & commutat: nec vero hic abusiue modus est loquendi, cerebrum imaginatur, imò proprius magis, quam hic, imaginatiua imaginatur. Nam actiones de instrumentis dicuntur per facultates, vt cerebrum imaginatrice imaginatur, ventriculus concoctrice coquit, visio, auditio, & tactio, actiones sunt cerebri, sed non propriae: aguntur. N. alijs instrumentis, oculis nempe, auribus & manibus. Caue tamen hic intelligas cerebri esse actiones, vt Manard⁹ & alij quidam, sensus omnes agi in cerebro, quanquam passionibus instrumentorum in singulis illorum fiant. Nam hanc opinionem satis refutauimus lib. 2. controuer. cap. 25. sed tandem facultate quae in cerebro residet, hac inquam ipsa oculi vident, aures audiunt, lingua gustat. Operatur scilicet ea vis vbique pro ratione instrumenti. Non est quod ad presentem doctrinam

doctrinam laboret Gal. scire quid sit anima nec quo modo in corpore consistat (præcipue cum de ea re nullam afferri posse monstrationem sæpe dixerit) nam vtrunq; ea habeat & vt cunq; in corpore sit, cōstat ad actionis læsionē læsionē instrumentorū esse satis. Quod ad curationē attinet nihil refert, cōtineatur facultas animalis in meningibus, aut in cerebri substantia, nam vt cunq; hoc habeat, medicamenta capiti imponenda sunt. Cæterum de hac re scripsimus cap. 13. lib. 2. cont. vbi retulimus opinionem Fernelij hac de re, ostendimusq; illum leuibus rationibus à Gal. recedere, statuentem vim motu-riam esse in medulla cerebri & sensitivam in meningibus. Quum tamen vnica facultate ambo hæc agantur, eaq; in medulla vt in prima sede resideat, docente Gal. 7. de plac. in libri calce.

AT QV E vt hæc à nobis pulchrè sunt definita, ita illud, non solum patientem locum, verum etiam causam illi noxam inferentem considerandam esse: vt exempli gratia, delirium est accidens eius actionis, quæ à loco mentis compote prodit: similiter sopor profundus, ac stupidus: sed à contrariis causis oriuntur, quippe & vigiliam, & delirium, causa potestate calida

lida efficit. At quotquot somnolentæ & soporosæ sunt passiones, omnes à frigida causa proueniunt : id quod ex medicamentorū natura planè discere licet . Quippe frigida stuporem, soporemq; calida verò vigilias, & varias motiones inducūt. Sed quid opus est fortia medicamenta enumerare, cū quotidie videamus & lactucas, & potabiliū, calidarūq; aquarū balneas, & vinū modicè dilutū, sanè nunq; inducere? Reliquorū medicamentorū exēplo, quæ & humectare & refrigerare possunt: quæ verò iis cōtraria sunt vigilias excitare. Itaq; tenuis ratio victus, & vinū meracius, vigilias inducūt, idq; multo magis, cum vinū meracum, aut suapte natura fuerit calidum, aut valde antiquum: Veluti apud nostrates Pergami olim accidisse, memoriæ proditū est : nec absurda videtur historiæ ipsius mirratio. Grāmaticus quidam, singulis diebus balneum petens vinum ex pueris secum ducebat, altero domi relicto

reliſto concluſo , qui rem familiarem ſer-
uaret, atq; ea, quæ ad victum eſſent neceſſa-
ria, præpararet. Puer itaq; domum cuſtodi-
ens cū vehementi ſiti cruciaretur , nec eſſet
ei aquæ domi copia vinum antiquum libe-
raliter potauit , atque reliquo tempore vi-
gil omnino permanſit . Poſtea correptus
febre, vna cum vigiliis oborto delirio pe-
riit. Cæterum animãtia quæ frigidiori ſunt
natura, per hiemẽ ob frigoris vim, perinde
ac ſi mortua eſſent latitare ſolent . Atque
tunc viperas quoque videres, ſi manibuſtra-
ctentur, deferanturquẽ, haudquaquam mor-
dere. Nam per æſtatem , tum hoc animal,
tum ſerpentes reliqui omnes maximẽ ſub
caniculæ feruore, cum vehementer æſtu-
ant, furorem præſe ferre videntur, adeò vt
ne exiguo quidem momẽto, quieſcere poſ-
ſint . Quod intelligens Nicander, ſic de
Cenchrĩde cecinit

Non

*Non temere offendas, calcando Cenchridis artus,
Dum furijs agitur.*

Verùm de iis alibi pleniorẽ inuenies & enarrationem, & demonstrationem. Siquidem calida causa ad motum excitat, atque idcirco vigilias affert: frigus autẽ otiosum, & ad motiones pigrum reddit animal, ob idq; somnum, saporẽque inducit. Igitur qui hæc intelligit, cum per ardentium febrium vigorem, hominem viderit & vigilare, & delirare, deinde inclinante iam febre & dormire, & recte sapere in capite nullã propriam esse passionem, sed à febris abundanti in caput calore delirium fieri existimabit. Sic etiam in peripneumonia & laterali morbo, cum ad vigorem febris peruenit delirium sequi solet nulla existente in capite propria passione. Quippe tum passio propria esse putanda est, cum permanere in parte quapiam conspicitur. Vnde si in laterali morbo, permanens eueniat delirium, caput

caput proprium habere morbum existima, ita ut quamvis lateris morbus quiescat, possit tamen capitis morbus permanere.

Sæpenumero enim vidimus glandularum tumorem ob vlcus aliquod obortum, vlcere curato, deinde diutius infestare. Ergo cum pars aliqua simul cum alia sic laborat ut irritata quidem vna, altera vehementius molestetur, remissa verò irritatione quiescat, eam per consensum pati putandum est. Hæc enim vna coniectura communis est. Sed de cerebro, ut dictum est, proprium sumitur indicium, si non assidue delirium permaneat sed auctam febrim sequatur. Atque eadem ratione fieri solet, ut cum febrium accessiones irruere incipiunt, sopore laborantes grauentur, quod hoc tempore cerebrum vehementer sit refrigeratum: quippe quod alioqui paratissimum est, ut noxam huiusmodi subeat, cum intemperiem habeat frigidam: non verò tantam, ut hæc sola præ-

dictorum accidentium possit esse causa, sed cum accessio ab initio processerit, frigus adeò increfcit, vt soporem queat inducere. Id verò, vt dixi, fieri consuevit, vel ab intemperie frigida vel à pituita in cerebro exuperante.

SCHOLIUM.

SOPOR semper fit à causis vehementer frigidis (est verò sopor somnus profundus, quem verius appelles cerebri stuporem quam somnum) mediocris verò & naturalis somnus non tam fit frigiditate quam humiditate, eo fit vt is non tantum à modice frigidis cuiusmodi lac & lactuca sunt, concilietur, sed etiam à modice calidis, cum ea humectantia simul sunt, & repletia caput, cuiusmodi vinum in mediocri quantitate haustum, aut mediocriter dilutum, verum hoc interest, quod modica frigiditas humiditatem cui coniuncta est in conciliando somnum iuuat aliquantulum (quanquam is ab humiditate primario procedit, nam qui à frigore procedit primario stupor iã est) calor verò humiditatem in conciliando somnũ per se nullatenus adiuuat, quin potius impedit (addidi per se, quia ex accidẽti potest

potest etiam calor excitando vapores qui repleant, somni esse causa, quomodo expurgantia medicamenta somnum videmus accerfere) quo fit vt quæ valde calida est, etsi humida maneat peruigilij causa fiat. Vt si vino meraciori immodicè vtaris, quod vt quidam statuunt calidum & siccum cum sit, non potuit, non inducere peruigilium, vt veró nos alibi diximus est calidum & humidum, & eo calidius quo generosius, & antiquius, & meracius, factum ergo est in puero præscriptæ historiæ peruigilij causa, cum quia perse calefecit vehementer, tum etiam quia ex accidenti resiccavit dissipato cerebri humore. Ad loci huius enarrationem, hæc sunt satis.

Qui de medicamentis somniferis optat audire
plura, legat capitulum.
10. libr.
10. cont. medicarum.

LIBRI SECVNDI
FINIS.

Liber tertius.

C A P. I.

Relectiuncula.

Caput hoc, quod in plerisq; codicibus occurrit in tria capitula distributū, nos vnicū esse fecimus: quia totū nihil fere cōtinet præter dictorū prius repetitionē. Cum enim hætenus Gal. duobus libris methodū cognoscendi loca patientia, & locorū passionēs docuerit toto reliquo opere insistit ei exercitationis modo: qui in proœmio lib. 2. primus numeratus est: qui per singulas particulas procedit. 3. hic liber cōtinet morbos cerebri. 4. morbos faciei, & spinalis medullæ: & pulmonis. 5. cordis, thoracis, septi transversi, gulæ, oris vetriculi, & iecinoris. 6. lienis, vetriculi, & intestinorū, renū, vesicæ, vteri, & colis. Prius tamē quā hāc exercitationē ineat, repetit Gal. plerāq; eorū quæ hætenus dicta sunt. In. 1. actionē læsam significare partē patientē. Repetit tñ modos cōpassionis antea dictos affectiones quoq; esse duplices, quasdā in habitu, quasdā in dispositione. Mōstrat deinde ad morborum curationem necessariam esse hāc doctrinam de locis patientibus: quāquam empirici medici cōtrarium statuebant, dicentes curationis rationē ex solo experimento: cū proprio: tū præceptorum: posse citra ratiocinationem quāpiam constare. Tamen Gal. de illorū secta hanc fert censuram, posse quidem illos morbos, qui frequenter occurrunt sola experientia fretos curare: ceterum in ijs qui rarissimē eueniūt, nequaquā posse id præstare: ad horum enim curationē rationali medicina esse opus.

De



E patientibus locis, (sic enim vocāt corporis ptes pauci ad modū medici scribere aggressi sunt, ac multo plura, quā attingerint omiserūt. Itaq; ceteris silētio prætēritis vnus Archigenis, haud indigne qui omnibus præferretur ineminimus. Diximus N. Eū sermonē, quo asserit actiones quasdā lædi illæsa illa corporis particula quæ ipsis deputata est, discussione egere, defendi N. potest, si pars per alterius cōsensum læsa, nō dū permanētē habeat affectionē, sed veluti vmbra quēdā, vt ipse dicebat insit hæc ei affectio. Nā si ad ignē quis p̄prius accesserit, vt fere cōburi videatur, citra tamē vstionē, dolebit quidē vehemēter, sed calfacta parte nihil adhuc patiēte, sic etiā vbi ambiēs aēr vehemēter frigid⁹, aut aqua exactē frigida, aut nix infestat, grauis admodū dolor excitatur. Atqui ablata re quæ nocuit, p̄tinus conquiescit affectio. Quamobrē satius fuerit, vt dicamus nomine id ipsum indicāte, affici

quodāmodo eā partē quæ alteri cōsentit. neq; N. pars, quæ nihil patitur sed ea, quæ cū alia patitur, cōsentiētis vocabulo significatur, quare quādo in stomachis affectiōib; similia Sympto. iis quæ in suffusis apparere solēt circa oculos fiūt, dicēdū est illos pati, elato ad cerebrū ab humorib; in vētriculo cōtētis fumoso quopiā vapore: nō tamē adeo afficiūtur, vt ablata re, quæ molestiū intulit p̄pria curatiōe egeāt rerū huiusmodi disputatio, vt dixi, ad dialecticā potius pertinet. Quæcūq; N. quæstiones vsū trāscēdūt, qualis sit rerū natura secūdū p̄priā essentiā indagātes, haud dubie logicæ esse cēsentur. Sic N. Chrisipp; philosoph; cū de animi ægritudinibus scribere instituisset, vno quidē libro curādi rationē tradidit nobis ad eārū curationē imprimis necessario, aliis verò trib; logicas quæstiōes est cōplex;. Igitur q̄ sint læsarū actionū modi, Archigenes parū accurate explicuit quāuis hæc quæstio & melior

lior, & huic nostro proposito utilior fuisset, q̄ & primo affectæ, siue pprie affectæ, siue quomodolibet nominaueris corporis sedes ita depræhédūtur, & curâdi quoq̄ facultas abūde suppetit. Ego verò in vocalibus instrumētis id iā exposui, ac in eo quoq̄ qui in manu solum amisit digitorū, iplis nō affectis. Quippe inuēta in dorsi initio pars, quæ primo afficiebatur, idoneā curationem ostēdit, sed aliter eueniūt suffusionis accidētia, affecto vētriculo: adq̄ aliter ei qui ab alto decidit, nullo existēte in vocalib⁹ instrumētis vitio, vox inter cepta est denique alia cōsensus specie laborabat, is cuius digiti sensum amiserāt. Siquidē oculi vexabātur, q̄ al
cēderet ad eos aliquid, vox autē, q̄ materia
eius esset oblecta. Sed digiti idcirco torpebāt
q̄ sentiēdi facultas ad ipsos nō descendebat
& meli⁹ quidē fuetit, existimare nihil omni
no pati vocalia instrumēta & digitos, præ o
culis. Nā his vt fumoso vapore impletis, af
fectus que laborat recipit q̄ ubi q̄ uid quo factus
affici dicitur 2^a autem et 3^a nihil sed p̄ hui⁹ aliq̄uo p̄ribatur
materia aut facultate

*tres mo di pat.
per consensum
nunciat gal.*

*q̄ 2^o modo aut.
hi tunc per consensum
respondu i illud
i. modo, nō p̄
per effi re ut ro
hiat q̄ 2^o p̄ m
p̄ter natura*

fectus ipse inest: vocaliū verò instrumētōrū
atq; digitorū officiū læditur, nō q; veniat ad
eos quippiā p̄ternaturā, sed q; ea re aut eo, q;
secūdū naturā ad ipsos venire debet, ^{præsentur} se lo igitur
nerui iuxta spinalē medullā exortu, vis
fentiēdi digitis nō influit. Guttur verò sumū
resolutis intercostalibus musculis, spiriū,
qui effilatur, nō recipit nihilominus rectē di-
xeris, in ipsis hāc esse affectionē, q; nō perue-
niāt ad ipsas partes ea, quę antea cū secūdū
naturā se haberēt, venire solebāt etenim fō-
tes affici haud absurde putaueris, si nō pue-
niat ad ipsos aqua, sic cerealiū quoq; frugū
ē terra, p̄deūtiū, squalloꝝ immodic⁹, affectio
est, & animalium, cibi, potionisq; penuria
Quoties N. alicui deest illud, sine quo secū-
dū naturā munere suo fungi nō potest, ipsū
optimo iure affectū esse putādū est. Sed hu-
iusmodi quęstiones (vt iā dixi) ad dialecticā
potius pertinent. Cæterū magna medicorū
pars negligit eas cōsideratiōes, quę vel læsis,
vel

vel de perditis actionibus, necessariae sunt. Cū
 N. duę, tres ve fuerint aliquādo huiusmodi
 actiones, accidit interdū, vt vna particula af-
 fecta, reliquę illi consentiētes in suis actioni-
 bus simul ledantur, interdū verò, vt omnes
 eodem modo afficiantur. Atque accidit in-
 terdū vt hanc aliquę affectionē habeant (vt
 ita dicam) hecticam, id est, quę tenaciter he-
 ret, reliquę verò (vt sic dixeris) catalepticae
 id est, leuiter inhaerentem, & quę facile di-
 scutitur, de quibus secundo libro de viuo-
rum dissectione, atq; in eo, qui hunc prae-
 cedit, iam diximus, ac non nil in sequētib;
 quoque dicemus, vt videlicet futurum ser-
 monem, qui sine huiusmodi definitioni-
 bus explicari non potest, perficiamus. [Sed.]
 iam enarrare aggrediamur, id quod admo-
 dum vtile fuerit predixisse, propter eos,
 qui verbo quidem demonstrare nituntur af-
 fectum ^{orum} ~~locorum~~ locorum inuestigationem medi-
 cis esse necessariam, opere verò illam euer-
 tunt

*no cadunt hic lib
 sed alius ferre ut que
 anales in spurnas.*

*2. p. reprehensio
 cupiit*

tūt. Atq; vnū aliquē affectū, pro exēplo summam, sitq; is pleuritis, in qua latus esse affectū, dolor ipse declarat, sed vtrū quæ succingēs appellari solet, siue mēbrana siue tunica (nihil enim refert) inflāmetur in pleuriticis, an alia quidē lateris particula: præterea vtrū pulmo secūdū fibras, siue apices, necessario afficiatur, an omnino affectionis sit expers, scire nihil ad rē pertinere autumāt ii, qui vsum & experimēta præferūt: multos enim pleuriticos alios vna cū præceptorib; alios sua tātū industria se curasse dicūt, obseruatis iis præceptis quæ ab Hippo. in libro de ratione victus in acutis morbis præscripta sunt. Itē quid ipsis p̄sit, & quid noceat planē noscere, euidētiaq; signa habere. quibus discāt cui venā secare oporteat. Insuper de fomētis, cataplasmatibus, victus ratiōe alui ductione, nihil sibi ad cōpletā notitiā deesse idq; ex lōga experiētia. Sed quid vel Hippo. vel aliū quēpiā illo priorē induxerit, vt hæc
inueniret

inueniret auxilia penitus se ignorare: satis ip-
 sis esse, si iā dictis remediis cōmode vtātur.
 Id q̄ alios quoq̄ artifices facere videmus.
 Neq̄ enim faber, siue lignarius siue ærarius,
 nec coriarius quo pacto artes suæ fuerint in-
 uētæ, inquirūt, sed à præceptoribus edocti,
 vsuleas probāt, & confirmat, atq̄ sic clarū
 nomen assequuntur. Equidē, vt verum fa-
 tear, cū medicos, qui se empiricos ab expe-
 rientia nomināt, talia proferentes audio, in-
 ducor certe vt probabiles putē eorum ratio-
 nes videnturquē mihi dogmatici contra il-
 los parum idonea se responsione tueri. Pro-
 inde vt cæteris in rebus omnibus temera-
 rium assensum semper cohibui, ita in inue-
 stigandis singulorum remediis diu multūq̄
 apud me cogitavi, an logica demonstratio-
 ne indigerem, an sufficerent ea præcepta,
 quæ ab experientia, & præceptoribus, atq̄
 ex meipso didiceram. Igitur ea, quæ diuti-
 na inquisitione longe optima iudicaui, ita
 me

me dii ament, veritatis amatores docere nō
 grauabor nihil enim causæ est, quam ob rē
 mentiar, quod facere solent ii, qui vni sectæ
 addicti, omnem ex ipsa gloriam quærūt.
 Quippe contentiose eos defendere oportet,
 eam sectam veram esse quam vnicā no-
 uerunt. Nam ex nullo alio disciplinarū ge-
 nere, gloriā sperare possunt. Ego vero re-
 ipsa, & publicè, & priuatim, apud eos vide-
 licet, qui sectam quamlibet à me discere cū-
 piebant, ostendi, in omnium sectarum sciē-
 tia (ne maius quicquam dixero) me esse post
 habendum nemini, quod si vni sectarū pa-
 tricinium ferre velim, ita in promptu sunt
 mihi rationes, vt nō verear ne quis me con-
 uincat. Non N. vt nōnulli faciunt, ex libris
 eas didici, sed prestantissimis in vna quaq̃
 secta præceptoribus vsus sum, nec sane odif-
 se possum empiricos, quorum præceptis
 sim institutus, vel dogmaticos. Pari enim
 studio omnibus dedi operam, versatus quē
 sum

*manifeste
 entia ab eis*

sum cū prestantissimis in vna quaque secta
præceptoribus. Itaque innotui Romæ tūm
primoribus eius vrbs ciuibus, tū impera-
toribus deinceps omnibus, & quidem ob
artis opera, non ob sophisticas rationes.

*lege librum de
notione in quod
est a galeni uis
prehenditur*

Quamobrē nihil prohibet, quo minus de
vna quaque secta vere dicam ea, quæ sentio
igitur per artis rationem comperi, eam re-
mediorem inuentionē, quæ ex vera demō-
stratione procedit, in iis quæ rarò accidunt,
experientia longe prestare. Vnde multos
morbos curaui, medicamentis ab experi-
entia maxime alienis quæ quidem in li-
bro de curandi via & ratione latius explici-
ta sunt.

SCHOLIUM.

VBI dicit, & melius quidem fuit existimare ni-
hil omnino pati vocalia instrumenta & digi-
tos, non negat hæc pati, docuit enim in primo li. &
in hoc etiam capi. docet ea aliquo modo pati, sed
dicit non pati *ὑπερ τοῦς ὀφθαλμοῖς*. Id est, præ ocu-
lis, nam oculi suffusorum laborant per consensum
ventriculi

ventriculi, quia influit in eos excrementum inutile. Digiti verò & vocalia instrumenta laborabant tantum per priuationem, digiti facultatis, vocalia materiæ. Constat verò longius abesse hanc compassionem à propria passione quam illam. quia illud est infestari à re inutili, hoc non est infestari, sed carere medici empirici & methodici negabant ad curationem morborum conferre quicquam notitiam locorum patientium. Quidam verò dogmatici, qualem fuisse Archigenem inquit, dicebant quidem necessariam esse, cæterum operibus id minime indicabant.

NVNC verò ea duntaxat perstringā,
 quæ nostro proposito magis accom-
 modata videbuntur, inueniens enim
 actionum læsiones, non solum propter
 similes partes à quibus læduntur ægro-
 tantes, sed etiam propter alias quasdā par-
 tes quarum vtilitas aliqua est, actio autem
 nulla. Inueni etiam organicarum partium
 morbos operationes lædere, atque iis præ-
 cognitiss, deinde inueni quosdam morbos
 continenter fieri solitos plerisque hominū,
 quosdam autem rarò, empiricam autem
 medici-

medicinam videns nō quod rarum est, sed
 quod crebro accidit in memoria & imita-
 tione cōtinere, ac propter hoc dimissas mor-
 borum raro euenientium, non solum cura-
 tiones, sed etiam præcedentes ipsorum cog-
 nitiones, quomodo ipsos dignoscere oportet
 primum inuestigavi, inueniq; earū quas-
 dam scientifica deprehēdi posse notitia, nō
 nulla verò artificiosa vocata cōiectura, atq;
 id circo ipsas magna ex parte rectas. Eius-
 modi enim est artificiosē coniecturæ vis.
 Verum tūc hās ipsas, tunc vel maximē quæ
 rarò eueniunt affectiones, scientificamquē
 notitiam admittunt, indigere semper in-
 ueni affectarum partium notione. Itaque ^{noamenoster}
 medicam professus, vsque ad senectutem ^{Galate.}
 nunquam in hodiernū vsq; diē turpiter me-
 gessi, neque curando, nec præsagiendo: id
 quod celeberrimis quibusdam medicis in-
 terdum accidere memini. Quod si quis glo-
 riam ab artis operibus, nō à sophisticis ser-
 monibus

monibus assequi voluerit, is nullo negotio
facili compendio colligere poterit, ea quæ
per omnem fere ætatem diligenti inquisi-
tione inueni. Idque sibi persuasum habeat,
hac via, & ratione, medicamenta me inue-
nisse, quibus morbos raro euenientes cura-
rem, cùm antea nec præceptorem vidis-
sem huiusmodi morbos curantem, ne-
que ipse aliquid expertum haberem reme-
dium. Id quod, per deos immortales, affir-
mare nequaquam timeo. Quippe vitiosa
actione, semper inuestigare studebam, quæ
nam sedes, vel ipsa afficeretur, vel alteri cõ-
sentiret. cumque eam inuenisse persuasum
mihi esset, tum affectionem ipsam quærere
atque ex vtrisque totius curatiui generis
indicationem sumere, simul remediorum
& quantitatem, & qualitatem & idoneam
materiam inuenire. Præterea cum prædi-
ctis, & ætatem & naturam laborantis, tum
anni tempus, & terram, & genus alia, quo-
rum

rum in hippocraticorum librorum enarratione meminî, perpendere operepretium ducebam. Verum superioribus duobus libris hûc præcedentibus, nisi fluxa admodû fuit memoria, didicistis affectas sedes posse depræhendi ab excrementis, atque iis, quæ affectis partibus adnascuntur, item actione læsa, quibus connumerantur & color præter naturam & figura. Sed excrementa triaria diuiduntur. Aliquando enim affectorum sedium partes, ipsarum videlicet essentia vel soluta, vel dissecta excernuntur, interdum ea, quæ in ipsis continentur, nonnunquam aliquid, quod morbosas affectiones sequitur, id quæ vel solas, vel semper, vel magna ex parte. Cùm itaque in quibusdam affectibus, nulla alia mihi pateret via, sola actionis læsio satis conducebat ad affectarum partium inuentionem.

ACTIONES instrumentis aguntur, sed propter simplices partes, ex quibus constant, scilicet in vno quoque instrumento est pars quædam simplex, quæ est instrumentum proprium illius, reliquæ omnes aut agunt, aut vsum præstant, atque ita ex primarijs actionibus quæ aguntur partibus simplicibus, prodeunt actiones secundariæ, quæ sunt instrumentorum, vt ingressus fit cruribus, carnea in illis parte hic laxata, illic contracta, nervo præstante vim, osse semper firmante, itaq; actiones omnes quæ secundariæ aut perfectæ dicuntur, instrumentorum sunt, sed causa simplicium, in simplicium siquidem temperie facultates omnes consistunt, proindequæ hoc loco Galenus dixit, non solum propter simplices partes à quibus eduntur. Nec verò quicquā hac in re interest inter sensus & motus, vt Aristote. secundo de partibus animalium, capite primo somniauit. Eodem enim modo, quo de motibus diximus, sensus contingunt. Fit scilicet visio ab oculo, sed singulis partibus illius ad visionem conferentibus, humore cristalino sustinente alterationem à visibilium speciebus, tunica cornea vicem perlucidi mediij habere, vnea attemperante splendorem internum, & externum, & aliarum partium singulis præstantibus suos vsus. Cæterum quanquam actione aliqua omnino nulla particula caret: (habet enim saltem coniunctam nutritionem

tritionem, quare dictum vere est decimo septimo de usu partium nullam particulam esse, cuius non sit actio aliqua) tamen actione instrumenti multa instrumenta sunt quæ carēt, habēt tamē usum aliquē gratia cuius instrumenta sunt. Dicuntur habere actionem, quæ ad aliquam actionem habent vim, efficaciamvê, quæ verò nullam talem habent, sed compositionem aliquam ut aliquid agatur accommodatam usum habent, non actionem ut vena, quæ præter nutritionem, quæ non inest illi ut instrumento, sed ut simplici cuius parti, nullā actionem habet, sed accommodatam habet figuram, ut per eam sanguis fluat, & distribuatur. Illud etiā quod tunica cornea præstat visioni, non est actio, sed usus. Nihil enim facit, sed peruia est facultati & speciebus. Ita intelligētur facile verba illa libelli de differentia morborum. Quod si id, cui tumor accidit corpus, nullum proprium habeat opus, vna tantum erit agritudo, & in eodem libello paulo infra ita scriptum est. Nam cum didiceris, in ijs quæ de functionibus, atque usu membrorum ratiocinationes habentur, ex omnibus animalis partibus, nonnullas quidem operationem toti animali vtilem conferre, nonnullas autem nihil agere, sed usum aliquem operationibus afferre. verum cap. hoc non indiget pluribus.

Releſtiuncula.

Iam hinc incipit Galenus agere de capitis morbis, ſu-
mitq; principium ab abolita memoria, atque vt nos ad
exercitationem deducat refert hiftoriam quandam, do-
cetq; qua via ipſe inuenerit, oblato quodam homine cui
memoria repente erat abolita, & patientem locum, &
morbi eſſenciam, interim acrius inuehitur in Archigenem
quòd quamuis operibus in hac curatione dogma ſuum de
ſede facultatis animalis aperte proderet, tamen in eo af-
ſerendo verbis proteruaret. Inuehitur etiam obiter in em-
piricos oſtendens huius ægitudinis remedia nequaquam
inueniri poſſe experientia, eo quòd non potuerunt caſu
quopiam, vt alia quamplurima contingere. Tandem do-
cet locū patientē eſſe cerebrum, & morbi eſſenciam, cū
in abolita memoria, tū etiam in omnibus ſoporosis af-
fectionibus (huiusmodi ſunt lethargus & carus, & ca-
talepsis) frigus eſſe.



IGITUR cum deperditam cuiusdā me-
moriam reſtituere oporteret, eſſemq;
adhuc iunior ac nec præceptorem vn-
quam vidiffem, qui huiusmodi affectionē
curaffet, nec apud vllum antiquorum cu-
rationem legiſſem: primum quidem apud
meipſum

meipsum inuestigauī quānā pars esset affecta, cui topica id est localia vocata remedia adhiberem, prius videlicet vniuersi corporis curatione præmissa. Id enim commune præceptum est, quod in omnibus morbis obseruare oportet. Deinde qua via, ratione, remediorum singula inuenirem. Cæterum patientem sedem eam ipsam existimaui, qua princeps animæ vis continetur. Medicamenta autem ea adhibēda esse, quæ huius sedis affectioni aduersarentur, interim oratos habere velim omnes, qui in horum commentariorum lectionem inciderint, vt scabiem aut rabiem vel insaniam quam de sectis conceperunt, deponant: deinde, sic(vt probos viros decet)dicendorum seriem considerent. Equidem cum ea, quæ iam supra pposui, perpēderem, accepi Archigenē libū quendā de oblæsa memoriæ instauratione edidisse, quo circa omnes bibliothecas illico percurri, cōueniq; biblio

polas omnes, atque medicos quoque quos
 & viri & scriptorum eius studiosos esse scie
 bam, quo eius libri copia mihi daretur, spe
 rans in eo remedia, me inuenturum, locum
 autē patientem minime, quod plane scirem
 nullam aliam à corde sedem huic affectio
 ni ipsum destinasse, secta ipsius constanter
 defendente, principem animæ vim in ea
 parte sedē sibi vindicare. Porro intelligere
 cupiebam quod intemperantiæ genus eius
 affectionis causam esse putarem, neq; enim
 dubitabam quin distemperantiam aliquam
 pro causa afferret, utpote qui sectam eius
 non ignorarem. Sciens itaque octo intempe
 rantia genera in qualibet particula posse
 consistere, quatuor simplices, & quatuor
 compositas, noscere cupiebam, quod in
 temperantiæ genus Archigenes lælæ actio
 nis causam esse declararet frigus ne, an
 humiditatem spiritus in corde, an compo
 situm ex frigore & humiditate aut aridi
 tatem

tatem cum frigore putaret huiusmodi posse passionem producere. Etenim manifestum erat eum in hac re nihil tribuisse calori. Quid igitur mihi acciderit iis qui ut dicebam lectæ insaniam deposuerint, de inde narrabo Sane primos eius libri sermones descripsi, ubi videlicet Archigenes curationem scribere aggreditur deletæ recollectionis, siue obliuionis, siue memoriæ amissæ, aut læsæ, vel utcumque eam, quam supra proposui passionem nominare voluerit, aut si non passionem, sed morbum, aut accidens aut infirmitatem appellaueris. Talia enim à sophistis tractantur, quæ ne minimam quidem vtilitatem ad curationis rationem afferunt. Verum quo clariora reddantur ea, quæ posthac dicemus, hoc prædixisse non parum refert: Archigenem vndecim libros epistolarum scripsisse, in quorum primo extat ad Marsum epistola, qua consulit ut patri memoriam resti-

in hunc ar. chri. g. n. f. d. m. i. n. t. e. a. u. t. a. b. s. t. e. m. e. m. o. r. i. e. c. u. r. a. t. i. o. n. e. m. e. s. t. h. i. u. i. t. n. e. c. i. n. h. u. i. c. a. g. e. l. a. n. s. r. e. p. r. e. h. e. n. d. i. t. u. r. s. e. d. g. e. p. u. t. a. n. s. a. r. i. g. e. n. e. s. s. e. d. e. m. a. t. u. e. r. e. n. i. t. t. a. t. u. r. a. t. q. u. e. a. b. i. n. i. t. i. o. , s. t. a. t. i. m. p. o. s. t. m. a. l. e. m. e. l. i. i. n. c. o. r. d. e.
 i. n. m. e. d. i. c. a. p. i. t. i. a. p. r. o. c. e. m. i. u. m. , v. b. i. c. u. r. a. t. i. o. n. e. m. t. r. a. c. t. a. r. e. i. n. c. i. p. i. e. r. e. t. s. i. b. i. f. a. c. i. t. u. r.
Dis. in const. auf. p. i. t. , i. t. a. a. d. v. e. r. b. u. m. f. e. r. è. s. c. r. i. p. t. u. m. e. s. t. : d. e. t. r. a.

tionem itaque sanguinis modicam, & repetitam factam esse vobis incipiente interceptione credidi nisi quæ imbecilitas obstat. Deinde rursus inquit. Arbitror autem & irrigationibus vos tempestiue vſos esse, & fomētis totius corporis, deraſo verò capiti cū-

crarius in reme. n. e. s. t. b. e. n. e. r. a. u. r. a. p. r. e. m. e. d. i. u. i. e. s. t. q. u. a. t. o. r. i. u. m. f. e. d. p. o. t. e. n. t. e. r. u. i. o. r. a. t. i. o. n. e. m. f. i. t. h. i. m. o. r. i. u. m. p. a. r. t. e. m. c. u. r. a. t. i. o. n. e. m. e. s. t. q. u. a. b. i. s. f. a. c. i. a. n. t. i. n. t. e. s. t. h. u. i. c. a. b. s. q. u. i. s. p. a. t. i. e. t. i. u. m. l. o. c. o. r. u. m. a. t. q. u. e. p. a. s. s. i. o. n. i. s. i. p. ſ. o. r. u. m. v. i. f. i. c. a. t. u. n. a. c. u. m. v. i. f. i. c. a. t. u. c. a. p. i. t. e. s. s. i. m. u. m. e. s. t. a. f. f. l. i. c. t. i. o. i. g. i. t. a. e. s. t. a. l. l. e. n. d. i. x. i. s. s. e. t. S. e. d. q. u. i. d. v. t. i. l. i. t. a. t. i. s. i. n. d. e. c. o. ſ. e. q. u. e. m. u. r. n. i. ſ. i. a. b. i. p. ſ. i. s. a. d. r. e. m. e. d. i. o. r. u. m. i. n. u. e. t. i. o. n. e. m. d. i. r. i. g. a. m. u. r. : Q. u. a. i. g. i. t. u. r. , o. A. r. c. h. i. g. e. n. e. s. , p. r. o. b. a. b. i. l. i. r. a. t. i. o. n. e. p. e. r. i. u. a. l. i. c. a. p. u. t. a. g. g. r. e. d. i. e. m. u. r. , r. e. l. i. c. t. o. c. o. r. d. e. c. u. i. u. s. c. o. g. n. a. t. u. m. q. u. o. d. d. a. m. o. f. f. i. c. i. u. m. m. e. m. o. r. i. a. e. s. t. , a. f. f. e. c. t. u. s. v. e. r. o. h. u. i. u. s. a. c. t. i. o. i. s. d. e. p. e. r. d. i. t. i. o. :

curbitulas adhibuisse, is ita lectis (vt verū fatear) vertigine affectus sum, idq; nō ab re quæpe quā de viro cōceperā frustratū me videre, quippe q̄ millies in multis commētariis suis patiētium locorū atq; passionis ipsorū scientiā necessariā ad rectam curationē esse dixisset. Sed quid vtilitatis inde cōsequemur nisi ab ipsis ad remediorū inuētionē dirigamur: Qua igitur, o Archigenes, p̄babili ratione perualī caput aggrediemur, relicto corde cuius cognatū quoddam officiū memoria est, affectus verò huius actiōis deperditio?

ditio? Quam passionē sanando, cucurbitula capiti adhibita memoriam reuocat?

Qua ratione huiusmodi suades remedia?

Ita nunc quoque inter visitandum ægros per communes consultationes video medicos inter ipsos interrogantes qua ratione hoc potius quā illud adhibere suaferit.

Atque si ne minima quidem negligunt, tantum abest ut tam grandia qualis est cucurbitula capiti adhibita prætereant. Nec video si pectori è regione cordis fuisset adhibita qua ratione Marfi patrem iuuare potuisset, Præterea propolita iam verborum

series non explicat utrum concisa ante scaturiat

pello an integra cute cucurbitulam thoraci

aptare voluerit. Si N. forte fortuna ut non

numquam euenire solet frigida aridaque fuerit

palsio sanguinis quidem detractio ad extremum

ducit periculum sole verò cucurbitulae non alio nomine quam caloris exci-

tandi gratia vtilis esse cētentur cucurbitulae

dit que quicquid quam plurimum sunt in e. N. q. cu. feritici

a quo dam medicis villis statim capiti cucurbitulae affunduntur et u

uide hic qd leni
reprobat in huc
pe cucurbitulae
conferat ali
caloris excitand
si a stillicui con
sagittis xi. et. tenu
rium remedi
ri u. l. flexioni
partem qd est p
remedi auri uer
fiat ut fecit ar. l.
metaph. critici ex
ex a. l. adu. cu. ce

læ N. atrahunt ad sese humorem ex imò id quod aride affectioni maximè aduersatur. Ignota N. passione quæ vel caput, vel membranas ipsius afficit haudquaquàm tutum fuerit in exteriores caluarie partes materiã retrahere. Sic N. prædicere debuerat, si frigida humidaq; passio fuerit, capite hoc modo affecto, curationis luminam in calfaciendo exiccandoq; statuerit, atq; presidiorum materiam quæ huiusmodi habeant facultatē adhibere oportet. Quòq; vix ex obscura me vertigine recollegissem sequentia etiam legere aggressus sum inuenire me posse sperans, si non per ordinem, saltem sine ordine huiusmodi aliquem sermonem qualis is erat quem nuper exēpli causa percurrimus. Deprehendi itaque omnia præsidia per delectum vehementer calorifica, atque exiccantia, adeò vt totum caput sinapsimo, ab ipso vocato calefaceret quamuis vehementissimū sit medicamentum. Deinde
ablato

ablato sinapi caput initio cōspergere mox
aqua calida rigare iubet quo medicamine
nullum in arte medica violentius inuenies
siquidem dolorem velutī cauterium exci-
tat: sed diutius durat eius operatio. Itaq; Ar
chigenes inferens inquit igitur intolerabi-
lem habet dolorem, neq; vlli vel máximo
rum præsidiorum cedit hoc medicamentū.
Quin etiā ex sinapi nasturtio, grano gnidio
vua taminea (*σαφισαγγία*, Græci vocāt) apo
phematismos instituit ac sternutamenta
mouere, & potiones propinare iubet vtra-
que ex vehementer calidis aridisque medi-
camentis componens: vt facile constet ip-
sum credidisse ad humiditatem & frigi-
tatem vel cerebri vel membranarum hanc
passionem pertinere. Huiusmodi N. passio
si caluariam tātum affecerit hominem me-
moria haudquaquā priuabit. Verūm
hec obiter propterea dixerim quod exiccan-
tia calorificaque remedia inducit. Quan-
quā

quam nusquam ab ipso explicatum est humore frigoreque obliuionem constare. Sed quis non indignabitur videns caput tot vexari modis alia videlicet parte patiente? Cæterum id quod de cucurbitulis ab initio indeterminate protulit postea pergens huiusmodi verborum serie manifestissime declarat. Atque irritationes (inquit) quas sinapi cucurbituleque inferunt leuare oportet: Quippe quæ interdum mitiores interdum vehementiores esse solent. Atque efficaciores sunt ille quæ concisa prius cute adaptantur verum hoc clarissime Archigenes nulla tibi suffragari ratio potest quam obrem capiti ista adhibeas si passio consistat in corde. Neque enim ab experimento ut interim empiricos alloquamur, talia possunt inueniri. Nam estuans quispians sub ardenti febre frigidam aquam per intemperantiam ingessit, & non nihil presidii expertus medicis imitationis viam nulla interueniente ratione apperuit

apperuit cucurbitula verò, nulla fortuita occasione duce, sed sola indicâte ratione adhibetur. Neq; N. sua spõte cucurbitula se se adaptare, neq; etiã si hoc detur perfortui tam occasionem aliquam capiti adhiberi potest, præsertim in ea affectiõne quæ raro euenire solet. Interroganti verò, mihi nostræ tespestatis medicos præcipue senes & exercitatos curassent ne vnquam huiusmodi passiõnem omnes pene responderunt, nunquam id se tentasse, vno duntaxat excepto qui diceret curationem quidẽ aliquãdo se aggressum nihil verò profecisse quo pacto igitur eorum quæ ex casu quodam fortuito accidunt auxilia imitatione cognoscemus? cû rarò eueniat huiusmodi passio nec fieri possit vt cucurbitula per se casu quodam capiti adaptaretur? Frigida N. portio cæteraq; id genus remedia quorum quotidie in multis creberrimum facimus periculum per experimenta inueniri possunt: sed

sed cucurbitule appositio, siue cōcisa prius
 cute, siue ea integra fiat: ab experiētia occa-
 sionem accipere non potuit. Cum N. reli-
 quarum passionum sedes, quamuis nō exa-
 ctè ad inuentionem remediorum satis sen-
 sibus dignoscuntur: in memoria id concedi-
 tur minime. Reliquas voco passiones vt la-
 teralem morbum, peripneumoniam, ne-
 phritidem, passionem colicam, hepaticam,
 splenicam aut vesicæ, aut vteri passio, atq;
 id genus cæterarum partium. In quibus om-
 nibus & dolores & ea quæ per meatus ex-
 cernuntur, & si non exactissimè saltèm in
 latitudine sedem affectum declarant. In la-
 terali N. morbo facilè est vniuerso lateri a-
 dhibere quidquid volueris similiter ventri
 in colica quemadmodum si hepar aut lien
 inflametur Hypochondriis: atque haud
 secus in ceteris partib⁹. Deperdita verò me-
 moriâ nullum patientis loci signum, nec
 tumor præter naturâ, nec dolor aliquis, nec
 excretio,

excretio, neq; aliud quidpiam extat. Quē-
admodum neq; in melācholia, phrenitide
inania, morbo comitiali, lethargo, sopore,
& in ea passione quam recentiores medici
catochen vocant & in catalepsi ac ne in iis
quidem passionibus quæ vel toto corpore
resident vt spasmis & palpitationibus, vel
altera duntaxat medietate vt paralysi. Nul-
lum enim signum ab his tanquam ex radi-
ce prodit: quippe nec tumor præter naturā
nec dolor, nec color à priori mutatur, nec ex-
crementa vnde Archigenes potuisset inue-
nire remedia, si quidem nugaces sunt empi-
ricorum fortuite occasiones atque Archi-
genis sermo, nos ducit ad cor. Verum si cō-
cedamus ab experientia dictarum passio-
num auxilia prodiisse, nunquid manifestè
depræhendetur falsa illorum arrogātia qui
dogmatici vocantur? Acne simplex quidē
illa reprehensio erit sed gemina atque vtra-
que fortis. Si enim vsque adeò vtile est expe-
rimentum

rimentum vt non solùm citra rationẽ inue-
 niat remedia verum etiam coarguat ratio-
 nem tanquam à parte falsam tantum abest
 vt ratio dogmaticis medicis sit vsui vt etiã
 nocere videatur sed (vt aiunt) satis erat eam
 inutilem esse ostendisse verum si ratio ali-
 quando etiam nocere videatur quod ma-
 gis argumentum desideras quo rationis vi-
 tium ostendatur: porrò multas de principe
 vi animæ rationes dialectico more interro-
 gando inductas vna cum patientium loco-
 rum vsu quibus euincere possis in anima-
 libus affectibus auxilia cordi adhibenda es-
 se, ita subito contempsit Archigenes alio-
 qui in curandi ratione exercitissimus, vt
 neglecto pectore capiti cucurbitulas adz-
 ptaret ipsumque licet haud quaquam pa-
 tiens & incideret & vreret. Num igitur, per
 Iouem mētītus sum paulò ante cum dicere
 rationalem viam quod ad remedium in-
 uentionem pertinet omnino prodi ab his
 scilicet

scilicet, qui patriæ quâ sectæ suæ proditi-
onem equiori ferrent animo? Quippe prodi-
tionem esse arbitrantur si vera dicendo dis-
sentiendum sit his quibus ea secta defendi-
tur. Igitur ut in presentia turpem contentio-
nem manifeste declarât, sic etiam haud ob-
scure dementiam suam produnt, cum pu-
tant omnia sua decreta turbari, si aliquan-
do, vel in vno reprehendantur. Placitorum
N. alia, mutuo consequentia cohærent, alia
inter se pugnant, alia neq; consequuntur se-
se nec pugnant ut in hac ipsa de principali
animæ potestate quæstione. Siue N. in cor-
de, siue in capite sedem ei statueris, poteris
de nostre elementis, quamcunque volue-
ris eligere opinionem cum priorē senten-
tia nec pugnando nec consequens aliquod
adducendo. Haud secus de generatione quo-
que, & corruptione, de animæ essentia, de
viis, de prouidentia, de fato, item genitus ne
sit mûdus, an ingenus: finitus an infinitus:
f præterea

præterea an plures sint mundi, numeroque incōprehensibiles, an vnus duntaxat. Quippe nulli iam dictorum placitorum repugnat, neq; ad vllum ipsorum sequitur ea que de animæ vi principali habetur opinio, Siue in corde siue in cerebro eam contineri dixeris. Itaq; vniuersam suam seclam dogmatici produnt, qui huiusmodi scribunt curationes, cū de præcipua animæ vi adeò manifeste sint demonstrationes, vt omnibus fere hominibus nota sit pars, in qua residet solis medicis, summisq; philosophis, qui in corde eam collocant, non appareat. Demonstrationes verò ipsas in commentariis quos de Hippocra. Platonisque decretis edidi, iā dixi Porro rationalem animæ vim in cerebro, virilem verò atque irascentem in corde concupiscentem in iecore sitam esse, nemini non persuasum est: id quod quotidie dicentes audiendo, discere licet. Quippe fatuum, aiūt cerebrum nō habere, timido & pusilla-

pusillanimi corde esse. Titio verò iecur ab aquila erodi non solum poëte : verum etiā pictores, sculptorésque fingūt: sed tempus est vt ad propositum redeamus. Sanè in confesso est omnibus medicis si opera quæ rationali potestate patiente laborantes faciunt, caput propriam rationis esse sedem. Proinde consideremus oportet, qualis sit in vnaquaque passione affectus, de læsa memoria principium facientes, si quidem de ipsa loqui statuimus. Hec autem crebro nobis occurrit, vitiata simul quodammodo ratione quemadmodum si ratio lædatur, memoriam quoque lædi contingit, vtriûsque noxa ab eadem passione procedente, quæ vbi vehemētius intēditur, simul cum memoria ratio quoque deperditur quæ passio stultitia nominatur.

*Testa mem. ex
ap. Gal?*

SCHOLIUM.

VIDERI possit commune illud præceptum de vniuersi corporis curatione ante topica remedia non habere locum in abolita memoria, saltē non semper habere locum. Nam ea passio autore Galeno est intemperies frigida. Esto ergo nuda sine humore, (potest N. esse) ac si lubet sit cum siccitate: (Nam & hoc potest vt ex verbis Galeni palam fiet) quorsum mittatur sanguis? Aut quorsum expurgetur vniuersum corpus, quòd cerebrum intemperatum sit? cum positum sit illud sine fluxione laborare, atque cum ea intemperies qua laborat, non calida, & quæ fluxiones possit conuocare, sed frigida, quæ magis repellit, sit? Certe est non parum necessaria corporis totius vacuatio, cum quoniam intemperies, quęcunque easit, debilitat membrum, in membrum autem debile facile mittunt reliqua, si tantum habent redundantia, tum etiam quia cerebrum eo tempore à parua etiam fluxione replebitur multum, vtpote refrigeratum, quodque nihil discutit. Sanguis igitur mitti debet ante omnia, aut expurgatio molienda est: vt hoc aut illud exiget corpus. Verum licebit in hac affectione, si nondum incipit caput laborare fluxione, vt in quacunque alia capitis nuda in temperie, venam secare, quæ nullam habeat, cum capite rectitudinem, vt venam in talo, aut internam in cubito. Nō enim

enim ex capite haurire sanguinem, tunc temporis mense est, sed alia membra in penuriam deducere. Quare quod à Galeno, paulò pòst dicitur, vbi ita scriptum est. Si enim sit affectio vt potest, si ita res ferat, frigida & sicca esse, detrachere sanguinem extremū est malum, intelligi debet de sanguinis detractione quæ ex ipso capite fit vt affixis cucurbitulis capiti, cum scarificatione, aut scisa vena in ipso capite. Hoc enim, non potest non esse malum in hac affectione, extremum verò, cū ea est frigida, & sicca. Ergo vbi ego legi detractionem igitur sanguinis modicam, & repetitam factam esse vobis incipiente interceptione credidi, habetur in Græcis codicibus, πεποιήσθαι ἡμᾶς. Censeo autem eos esse deprauatos, legendumque esse cum. υ. ὕμᾶς. Nam hæc verba, ἀφαίρεισιν μὲν ὃν αἷματ' ὅ· σύμμετρον καὶ επαφαίρεισιν πεποιήσθαι ἡμᾶς ἀρχωμένης τῆς ἀποθλίψεως πεποιήσθαι. Nō videntur mihi bene coherentia, vt ego legi hærent aptè, & reddunt bonū sensum, quòd modo inuestigat Gale. & paulò ante scire cupiebat ex Archigene, à quo intemperatiæ genere aboleretur memoria, videbitur fortassis alicui inanis quæstio, quādoquidē videtur posse actio hæc nō minus quā alia quæcunq; , à quauis intemperatiā cū multū exorbitat corrūpi, cū celebratissimū sit apud omnes medicos, maximeq; apud ipsum. Gal. omnē immodicā intemperatiæ deijcere actum cuiuscunq; virtutis. Nimirum virtus omnis, aut facultas (nam nihil interest) aut temperamentum
f 3 ipsum

ipsum est, aut simul cum temperamento tollitur (dicet Galenus paulò infra in hoc ipso libello) cum ergo temperamentum exorbitantia cuiuscunque qualitatis corrumpatur, omnis facultas exuperantia cuiuscunque qualitatis corrumpetur. Certè videtur hic sermo probabilis, verum Galenus, ita potest effugere calumniam. Cum sint tres propriae cerebri actiones, recordatio, extimatio, & imaginatio, cumque in cerebri cauernulis, quæ quatuor inueniuntur, nulla in his ipsis consistente actionum ipsarum differentia, saltem quam nos possimus sentire, sed omnes agantur in omnibus cauernulis (Hoc enim partim est in superiori sermone dictum partim secundo libro controuersiarum à me monstratum, partim monstrabitur postea in hoc ipso sermone) ad memorandum indiget cerebrum intensiori calore, quam ad extimandum, aut imaginandum, ad hæc verò indiget moderatiori quam ad memorandum. Hinc fit vt cum refrigeratione intemperatur, citius amittat memoriam quam rationem & imaginationem, quia quod maiori calore indiget minus potest sustinere illius subtractionem: quàm cui minor sufficit. Tamen cum per calefactionem excedit cerebrum suum temperamentum, citius læditur secundum extimationem & imaginationem quàm secundum memoriam. Ergo cum memoria repente sine alijs cerebri læsionibus minuitur, aut tollitur, frigus in causa est, aut solum, aut cum siccitate aut humitate. Nam si

calor

Argum. n.º.

calor foret, necesse esset multo ante læsas esse imaginationem & rationem. Galenus verò hic de memoriæ læsione sine dementia disputat. Verùm *nota* oportebit dictis adijcere, frigus actiones incipere, statim ac lædit minuere, & deinde tollere, calorem verò nullam actionem tollere, nec minuere, quin prius deprauet. (Tres enim tamen læsionum modi possunt actionibus contingere). Nam cum facultates omnes vtantur vt instrumento calore naturali, & frigus nullius actionis sit effectuum per se (vt a nobis monstratum est capite decimo. libri quinti controuersiarum) sed omnibus fit per se aduersum, crescente frigore minuitur instrumentum actionum, puta calor, crescente calore fit præternaturam & prauum instrumentum. Igitur si frigore intemperatur cerebrum, primum amittitur memoria, eaque sola, si frigus plurimum crescit, læditur etiam ratio, verùm ea læsio non deprauatio, sed amissio, est aut diminutio, appellaturque ea affectio fatuitas. Si verò calore cerebrum intemperatur, primum deprauantur ratio & imaginatio, memoria nihil læsa, deinde si calor multum crescit, memoria etiam deprauabitur primum, deinde nihil mirum si tollatur etiam, per accidens, corruptione facultatis quæ in tēperamento habet essentiam: verū satis constat, quàm facile distingatur illa læsio memoriæ ab ea quæ per se incipit, de qua hic differitur. Constatque vt non inepte quæramus à qua intemperie ea contingat, quanquā à quacūq;

de humiditate
ci tale memoria
hur est arist. lib.
moriam cap. 1.
cas. filias causas
inute aut ablati
orie adducit

intemperie possit omnis actio tolli verum addes,
 solam humiditatem aut siccitatem posse memoriæ
 officere per se, citra frigus, eo quod memoria ad fa-
 cilem apprehensionem humiditate quadam, & ad fir-
 mam retentionem quadam siccitate indigeat. Hoc
 quoque ita potest distingui. Humiditas & siccitas
 nude & citra succum non possunt repente ingruere,
 sed paulatim, ac multo tempore, ab humoribus
 verò illis qualitatibus affectis citius fient aliæ pas-
 siones, vt grandines, aut vertigines, quàm memo-
 riæ abolitio. Itaque si quis repente memoriā est
 priuatus citra presentem insaniam is cerebro est
 refrigeratus. Sed illud quoque oportet dictorum
 gratia adijcere, posse memoriā non minus reliquis
 facultatibus pati, non minutionem solum & aboli-
 tionem, sed deprauationem etiam (quanquam Ga-
 lenus id Symptoma. libello de Symptomatum,
 differentia videtur omisisse). Nam si quis species
 quas memoria conceperat nullatenus amisit, sed
 confundit ita vtque Petri sunt, Paulò, (gratia exem-
 pli), quæ Pauli Petro tribuat, recordatur sanè iam sunt
 verba illa Galeni. Hæc passio crebro nobis occur-
 rit vitiata simul quodammodo ratione quemadmo-
 dum si ratio lædatur, memoriā quoque lædi con-
 tingit, vtriusque noxa ab eadē passione proceden-
 te, quæ vbi vehementius intenditur: simul cum me-
 moria ratio quoq; deperditur: decisa etiam obiter
 est controuersiola quæ hoc loco solet cogitari,
 an cum

an cum memoriâ necessario lædantur ratio & imaginatio, sed modo distinctioris doctrinæ gratia enarrabo iterum. Quacumq; ex causa memoria minuat, tollaturue, patiuntur aliæ duæ facultates quodam modo, id est per compactionem, priuatione materiæ, defectu inquam specierum, quas memoria illis solet supeditare. Id certe esse quam verissimū hac ratione intelliges, fieri potest ut homo alioqui solertissimus malum aliquod imminens non prævidet, quod rei cuiuspiam alterius, quæ illud portēdebat oblitus sit. Oportet ergo eum virum qui sit prudenter coniectaturus, non modo solertem esse. sed & firmæ memoriæ, priuatur ergo suo munere quodammodo ratio læsione memoriæ, quod contra non accidit. Nihil enim prohibet imprudentem hominem esse firmissimæ memoriæ, verum si non de priuatione compactione loquaris, oportet causas distinguere. Si memoria frigore læditur primum sola læditur, nulla propria passione serpente in alias potentias, deinde verò crescente frigore, reliquæ etiam læduntur, omnium noxa ab eadem passione procedente. Cum ex calore procedit memoriæ læsio, multo ante rationis læsio incipit, hæc proculdubio ita intellexit Aetius qui libro sexto capit. 2. ita scripsit, at verò ubi memoria deperdita est in febrilibus morbis, simul perit omnino & ratio & imaginatio. Non enim sine causa adiecit Aetius in febrilibus morbis, sed quia cum frigore memoria læ-

*imo arist. lib. de
moriæ cap. 1. a
na ex parte qui
habetur que sunt
in memoria
sunt qui celari
aliis in sciencia*

282 DE LOC. PAT. G. CVM SCH.
ditur, non necesse est reliquas facultates simul pe-
rire.

par
PEreunt autē ambo hæc & in lethargis,
in omnibus soporosis passionibus, atq;
affectionem ipsarum necesse est, vnam
esse genere: secundum quidem primum ge-
nus intemperiem (Ostensum enim est eam
simplicium partium quæ primo operatur
comunem esse affectionem) secundum al-
terum verò frigidam omnino intemperie
esse. Hæc enim animales actiones torpidas
efficit, id quod animalia quæ per frigora la-
tere coguntur, haud obscurè declarant, id
etiam in frigidis medicamentis videre est,
ac frigidis quoque cibis: si quidem lactuca
graues inducit somnos, si multā ipsius quā-
titatem quis ingesserit. Verum etiam ca-
pitis grauitates, quæ videlicet sine mor-
daci infestant dolore, somnum, soporemq;
afferunt, quibus apophlegmatismi magni-
ficè opitulari videntur. Ad hæc non me-
diocri

diocri argumento sunt capitis & ardor, & perfrigeratio: siquidem ardor vigilias: perfrigeratio soporem inducit. Item biliosi calidique morbi vigilias, deliria, phrenitides: contra pituitosi, frigidique ignauiam, soporemque efficiunt. Quippe quod ad vigilias soporesque per morbos pertinet calida frigidaque intemperies primam sibi facultatem vendicat: altera verò ab hac ad humiditatem ariditatēque refertur, nā balneæ eo q̄ caput madefaciunt, soporiferæ sunt. Haud secus vini moderata potio, omnes cibi humectantes atque ex ætatibus pueritia quidem ob humorem somnolenta est: Senes verò ob ariditatem vigiliis vexantur, igitur omnia hæc argumento esse possunt ad animi ignauiam inducendam, humiditatem præter naturam secundas partes obtinere: frigiditatem verò priores. Proinde ut humiditas abundans vel sola longos profundosque somnos: ita ariditas quoque so
la

la vigilias efficit. De quibus passionibus ab Hippocrate dictum est : somnus aut vigilia si alterutrū modum excessit malum est, quod si frigus cum humore sufficienti cōiungatur soporem, stuporemque cōstituit: sine hoc verò memoriæ nocet, fatuitatēq; inducit. Cum itaque non solum in frigiditate humiditateque verum etiam in ariditate & calore non paruum secundum magis & minus sit discrimen, nihil mirum si multifariæ inueniantur causæ quæ animales actiones lædere possint. Cæterum clarioris doctrinæ gratia rationalis animæ actiones, principales: irracionales verò, morales vocentur. Sed has in præsentia silentio præterire decreuimus. Nōdum enim vel cordis, vel iecoris passionibus tractare proponimus. Igitur quemadmodum somnus & vigiliæ si modum exceßerint illę ob humiditatem hæc verò ob temperatiam fit arida: ita & in his ipsis, & magis, & minus tum in som-

nis

nis, tùm in vigiliis sequitur maiorẽ aut minorem vel humiditatem vel siccitatem.

Cumque bifariam (vt iam declaratum est) fiant huiusmodi intēperies, duplex quoq̃ erit vtriusque passionis modus: vnus quidem in humidis siccisque humoribus, alter verò in corporibus solidis: si aliquando in easdem intēperies solidæ partes atque molles inciderint. Præterea quamuis iam dictæ temperies sint contrarię, fit tamen ex ipsis mistum quoddam temperamentum, vt in vigilantī sopore cum pituitosus biliosusque humor abundauerit: Ita in calidi frigidiq̃e cōtrarietate eosdem quoque modos inuenire licet, tum simplicibus intemperantiis, tum ex ambabus compositis. Pituitę enim si bilis misceatur, flaua dico mista fit ex calido frigidoque passio. Quod in solidis corporis partibus mistam ex cōtrariis passionem fieri fateamur, tres ita prodibunt in vna quaque contrarietate primæ intemperies.

ries. Igitur huiuscemodi passiões oēs capiti aduenire solent, sed inter se differunt, nō solum mistionis varietate, aut eo quod magis minúsue intenduntur, cū in simplicibus tūm mistis passionibus, verūm etiam quod ventriculi cerebri interdum afficiuntur huiusmodi intemperātiis : interdum vniuersa eius vasa, aut humiditas quæ per corpus cerebri dispersa est. Accedit ad hæc quartus quoque modus cū videlicet ipsummet corpus cerebri intemperatum red datur.

S C H O L I V M.

LETHARGI nomen nonnunquam accipitur pro ea affectione de qua propriè dicitur, quam comitatur somnus grauis per totum morbum cum continua febre, quæ affectio phrenitidi est secundum speciem contraria, nonnunquam pro quacunque delatione in somnum, ita vt grauis somnus qui solet per accessiones quarundam febrium accidere, & qui propriè appellatur Carus, & Vternus qui per consensum hypochondriorum solet accidere, hoc nomine dicantur. Aetius libro secundo tetra bibli. cap.

cap. tertio, nos admonet harum nominis acceptio-
num quas Galenus hoc loco respexit dicēs, pereunt
ambo hæc in lethargis, & omnibus soporosis affe-
ctionibus. Iam verò quod omnes has affectiones se-
cundum primum genus intemperies esse, secundum
alterum verò soporosas esse frigidas, vigilias & de-
liria calidas, satis apertè significat, quod nos scili-
cet libro controuersiarum monstrauius, phreniti-
dis nempe, & lethargi essentias haud quaquam con-
sistere in tumoribus præter naturam. Sed in cere-
bri intemperantijs cum effluëtia humoris, quæ nisi
præscindantur auxilijs, firmanur in tumores. Ergo
omnis causa quæ suapte natura moderatū & natura
le quodpiam accidens solet gignere, si in quātitate
modica sumitur causa sit grauis symptomatis. Hoc
dixerim propter lactucam quam Galenus capi. vl-
timo libr. 2. leuiter inducentibus somnum annu-
merauit, & modo dicit graues somnos facere si im-
modicam ipsius quantitatē quis ingesserit. Quod
ad somnum inducendum à Galeno dicitur fri-
gus habere primas, de sopore intelligdēum est. Nā
naturalē somnum primas habet humiditas, cū ve-
re somnifera dicantur medicamenta tantum humi-
da primò de symptomatum causis capi. ultimo. Vn-
de satis patet perperam omnino Copum verba pau-
lo inferius scripta ita transtulisse. Quod si frigus cū
humore vehementer intendatur, soporem stupo-
remque constituit, sine hoc verò memoriæ nocet,
stultitiāq; inducit. Nam hæc verba apertè signifi-
cant,

cant, frigus etsi vehementer intensum sit, si tamen
 sit sine humore non facere soporē, sed p eo fatuitate
 tem & obliuionem, quod dictis paulò ante repug-
 nat. Nam cum solus humor somnum possit facere,
 si solum frigus non potest, falso tribuantur frigori
 in conciliando somnum primæ. Præterquam quod
 per se est falsum, frigus vehemens etsi solum sit, nō
 stupefacere. Nam medicamenta quamplurima eo-
 rum quæ soporifera dicuntur sunt frigida & sicca, vter-
 ex his verbis Galeni quinto de simplicium medica-
 mentorum facultate cap. 17. licet colligere. At eam
 quæ *καταφορα*, id est soporem epota moliuntur,
 ac proinde *ὕπνοτικά*, hoc est somnifera à plerisque
 nuncupantur temperiem fortiuntur vel summe ad-
 uersam ijs quæ re vera sunt anodina. Refrigerant si-
 quidem omnia corpus, & sensum consueque obstupe-
 faciunt, vt si paulò liberalius ebibantur, mortē ad-
 ferant. Caterum ad vsum propositum optima sunt
 quæ deficcant. Propterea igitur nos curauimus hūc
 locum fideliter transferre, habet verò græca litera
 in hunc modum *εἰ δὲ ψυχρότης μὲν ὑγρότιτος ἰκανὴς*
προσέλθῃ κατὰφορικῶς, καὶ κατὰ δὴ πᾶσιν συνίσταται,
χωρὶς δὲ ταύτης, οἷ τε τῆς μνήμης βλάβαι, καὶ αἰ
γέ μορσεῖς, id est si autem frigus cum humiditate
 sufficienti coniungatur soporem stuporemq; indu-
 cit, sine hac verò, memoriæ læsionem, & fatuitatē.
 Hic quidem non fit mentio de vehemēti frigore
 (nam quod tale est nullo humore indiget, vt som-
 num inducat) sed de eo quod solum non faceret
 somnum

omnium, & cum quodam humore possit facere, si-
 uita eo vero si non scirem, ad memoriæ abolitionē
 ug-licet minor frigoris gradus (cūm ftigus solum
 re,ft) sufficit obesse memoriæ, quam stupefacere: fri-
 oriditas verò & humiditas vtralibet per se, cum ve-
 oc- mens est, valet stuporem facere, cūm est mode-
 nōita nulla illarum per se facit, ambæ coniunctæ fa-
 o-unt somnū. Vbi nos legimus & vini potio mo-
 yterata, in nonnullis codicibus habetur *ἡ εὐκρασία τοῦ*
καὶ οὐκ ἐνὶ μέτρῳ id est moderata, sed *ἀνέμετρος*, id est
 emmoderata probaturq; à nōnullis hæc lectio, quia
 vident multos à vini meracionis potatione sopiri.
 sed erum ego putauerim legendum à moderata. quia
 ammoderata quanquam nōnullos sopire possit, qui
 sius scilicet cerebrum nō facile ardet, & exciccatur
 amen multos agit in peruigilium vt indicauit in fi-
 de secundi libri hystoria pueri, ad quam modo re-
 spiciens Galenus, dixit potio vini moderata.

CAP. III.

Relectiuncula.

Ex tribus rebus docet Galenus cognosci posse in abo-
 ita memoriā num cum frigore coniungatur, humor, an
 ccitas, an earum qualitatum neutra, ex somno scilicet
 ut vigilia; aut in his ipsis mediocritate, & ex ijs quæ ex
 apite destillant per os, & nasum, & ex causis procata-
 ticis. Hinc facile colligit curationem qua in ea ægritudi-

ne vti oportet. Est enim ea aut sola calefactio, aut calefactio cū humectatione, aut cū desiccatione, ut fuerit affectus. Refert interim historias quorundam quibus cū desiccatione, abolita memoria est, alteri ob vigilias & studia, alteri ob laborem immodicum, vt interim nos doceat has causas solere simul siccare, & memoriam tollere. Deinde repetit dictorum quædam. Primum quomodo distinguende beant hæc mala, cum propria sunt parti ab iisdē cum per consensum fiunt. Inuehiturq; rursus in eos qui animalem facultatem in corde sitam esse asseuerabant, cum essent medici, quos oportuit ipsa curatione admonitos, contrarium intelligere.



V V O R V M itaq; vel memoria vel intellectus perit, somnos obseruare oportet, (quippe intellectus amissio stultitia est) vtrū vehementer an modicè somnolēti sint, aut omnino non somnolenti, sed quantum ad somnum pertinet, secundum naturam sese habeant. Sic enim vincētem inuenies intemperiem. Præterea considerandum est vtrum excernant quippiam vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite defluat, an aridæ huiusmodi partes sint

partes sint, quippe ex his passionē ipsam cōsequi poterimus. Quemadmodū in destillatione, & grauedīne vsu venit. Siquidē in iis & qualitas, & quantitas excrementorū, atq; causarum quæ præcesserunt contēplatio capitis passionē declarat: siue calida fuerit vt in ardore: siue frigida vt in perfrigeratione. Nisi n. omnia hæc discretē cognoueris idoneā cuiq; passioni curationē haud quāquā inuenies. Cum igitur vel periit, vel grauiter læsa est memoria, frigida intēperies est: quo circa calefacere ipsam oportet: at verò exiccare, aut humectare nō necessariū est, sed si humiditati copuletur arefacere: si ariditati madefacere, cæterū si inter his medium obtinet ipsū cōseruare oportet. Equidē noui quendā qui ob laborē in studiis, atq; vigilias memoriam penē amiserat, læsa etiam ratione, item agricolā qui ob labores quos vites colendo subierat, ac tenuem victū eodē modo affectus est. Atq; ii exiccantibus calidioribusq;

calorificisq; lædebantur, in deficiencia verò quæ calefaciendi quoq; vim haberet haud mediocri ipsi erāt præsidio. Interdū verò vbi principales actiones læsæ sunt, febris quoq; accidit vt in phrenitide, & lethargo. Interdū sine febre vitiū est, vt, in mania, & melancholia: id est quod modò per cōsensum, modò primaria passione cerebro laborante accidit. Cū igitur propriis accidentibus exactè discernuntur huiusmodi vitia, & perpetua sunt, neq; aliis præcedentibus superuenerunt, primogenia passione: cū verò propriis accidentibus discerni nō possunt, nec perpetuo permanent atq; ad alias passiones consequuntur, per cōsensum ipsa constare dicimus. Nec latere nos debet, vbi per cōsensum quis patitur fiatq; adhuc passio, quod deletis efficientibus ipsam causas, ipsa quoq; simul deletur. Si verò cōsentientes partes permanentē iā habeant passionē, quāuis quiescat causa efficiēs ipsa tamē permanebit

manebit passio. Igitur quod in cerebro consistant omnes principaliū animæ actionum passiones in cōfessione habēt omnes medicini: si quis vni fortasse sectæ addictus, aliter in animo sētiat, aliter depromat ex ore, at qualis sit intemperies nō sine negotio inuenitur, *omnis inter
seuipartem
similis* medicūm q̄ requirit, non qui laboret quomodo antiquis cōtradicat de animæ principatu, re adeo aperta & perspicua, vt eā in cerebro esse etiā inter priuatos cōueniat: Sed qui laboriosus sit, & inquirēdo non defatigetur. Sed Philosophis fortasse vt pote in angulis desidētibus facilius pro hoc errore quis veniā dederit, medicorū verò q̄ in operib⁹ medicis cōsenuerūt indigna venia est cōtentionis libido aut vt veri⁹ dicā impudētia quādoq̄ de vigilātibus, delirātibus phreniticis lethargicis caput irrigare cōsueuerūt, nā & arc. quo q̄ vbi uitiata memoria medicāda est aut stultū medicari aggreditur capiti remedia adhibet, quis vnquā exercitatus medicus

t 3 apople-

apoplexiã morbũ comitalem Opisthotonon Emprosthotonon neruorũ distentionẽ aliter curauit? Quis deniq; dimidiam partẽ corporis resolutã? Nunquid verò vbi nerui cõuulsionẽ patiũtur, omnes medici velexperimẽta etiam professi: summa curationis esse cẽsent primis vertebriis remedia adhibere? Quẽadmodũ vbi dimidia quoq; vniuersi corporis pars resoluta est. Porro cerebrũ quoq; calfaciũt, quẽadmodũ apoplecticos quoque curare cõsueuerunt, morbũm q; comitalem. At eum vel in stomacho, vel in alia quapiã parte passio cõsistit, eam maximẽ, & imprimis curare præcipiũt cerebrũ verò ita præparant vt non ita facile afficiatur. Hęc itaq; potissimũ inquirenda sũt nõ principalis anime vis, quàm nemo nisi peruersa fuerit mente, non apertissimẽ cognoscit, nec neruorum originem diuinantium more à diis petere, sed ab experto disfectore discere oportet.

Scholium.

SCHOLIUM.

PASSIONES quę cum ex alijs principium acceperint, habent iam propriam permanentiã, vt inguinum inflammatio ex cruris vlcere, non tam debent appellari, morbi per consensum. Iam enim facti sunt proprij, quam secundarij, verum Galenus nomina minus curans, omnes secundarios morbos appellat hoc loco compaſsiones, & diuidit postmodum morbos per consensum, in eos qui simul cum causa tolluntur, & eos qui propriam habent permanentiam. Quo loco intellige nomine causerum, morbum primarium, non vt alij intelligunt quamcumq; causam, putantes omnes morbos fientes esse re vera compaſsiones, quod falsum esse superius est monstratum.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Occasione sumpta à disputatione de neruorum principio transgressionem facit ad tractationem de conuulsione, docetq; illius duas tantum esse causas, repletionem & inanitionem, deinde quomodo ex causa procatartica à qua excitata conuulsio est, facile sit coniectare, ex repletionem, an inanitionem fiat.

apoplexiã morbũ comitalem Opisthotonon Emprosthotonon neruorũ distentionẽ aliter curauit? Quis deniq; dimidiam partẽ corporis resolutã? Nunquid verò vbi nervi cõuulsionẽ patiũtur, omnes medici vel experimẽta etiam professi: sum mã curationis esse cẽsent primis vertebris remedia adhibere? Quẽadmodũ vbi dimidia quoq; vniuersi corporis pars resoluta est. Porro cerebrũ quoq; calfaciũt, quẽadmodũ apoplecticos quoque curare cõsueuerunt, morbũq; comitalem. At eum vel in stomacho, vel in alia quapiã parte passio cõsistit, eam maximẽ, & imprimis curare præcipiũt cerebrũ verò ita præparant vt non ita facile afficiatur. Hęc itaq; potissimũ inquirenda sunt nõ principalis animẽ vis, quàm nemo nisi peruersa fuerit mente, non apertissimẽ cognoscit, nec neruorum originem diuinantium more à diis petere, sed ab experto dissecatore discere oportet.

Scholium.

SCHOLIUM.

PASSIONES quę cum ex alijs principium acceperint, habent iam propriam permanentiā, vt inguinum inflammatio ex cruris vlcere, non tam debent appellari, morbi per consensum. Iam enim facti sunt proprij, quam secundarij, verum Galenus nomina minus curans, omnes secundarios morbos appellat hoc loco compaſsiones, & diuidit postmodum morbos per consensum, in eos qui simul cum causa tolluntur, & eos qui propriam habent permanentiam. Quo loco intellige nomine causerum, morbum primarium, non vt alij intelligunt quamcumq; causam, putantes omnes morbos fientes esse re vera compaſsiones, quod falsum esse superius est monstratum.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Occasione sumpta à disputatione de nervorum principio transgressionem facit ad tractationem de conuulsione, docetq; illius duas tantum esse causas, repletionem & inanitionem, deinde quomodo ex causa procatartica à qua excitata conuulsio est, facile sit coniectare, ex repletionem, an inanitionem fiat.



VNT n. nonnulli qui sibi iā per-
 suaferūt neruos à corde oriri, eo q̃
 nequeūt inter ligamentū neruūq̃
 discernere, quibus nō nihil etiā suffragari vi-
 detur ipsa homonymia, quippe ligamenta
 multis medicorū colligātes nerui appellā-
 tur. Verū nulla vexabimur nominis inuidia
 si modo nō ligamēta ipsa, sed voluntarios
 (vt ipsi aiūt) neruos intelligāt, quos s. à cere-
 bro initium accipere dicimus: Neque n. illi
 aut cōuulsionē aut paralyfin ad ligamēta
 referūt, sed eorū neruorū qui volūtatis impe-
 rio obediūt passionē esse dicūt. Conuulsio
 enim vniuerso corpore omnes quidē autu-
 mant pati talē quāpiam partē, quæ vt in ar-
 bore caudex ramorū, sic ipsa sit omniū ner-
 uorū cōmunis origo: Idq̃ veluti caudex nō
 paucorū in vna parte, quēadmodū ramus:
 vt si vel crus vel altera manus forte fortu-
 na conuellatur, totius mēbri conuulsio ner-
 uorum qui ad ipsum proueniunt originem
 affectam

affectam fuisse declarat, rami cuiuspiam exemplo in arbore. Quòd si vniuersum corpus patiatur, cõmunem originem omnium, infra faciem neruorum, quæ arboris caudici proportionē respõdet affectam esse putandũ est, quæ sunt primæ spinalis medullæ partes. Proinde exercitatissimi, quique medici huic remedia adaptant: cordis verò in hac passione, nullam omnino mentionẽ fecerunt. Si verò simul cum vniuerso corpore, facies quoque conuulsa videatur, non solũ eam partem, quæ ex spinæ medulla procedit, verũ etiam cerebrum ipsum curamus: etenim labra quoque sæpenumero conuulsa videmus. Item oculos, frontis cutem, totam mandibulam, similiter & linguæ radicem. At quia omnes iam dictas partes à musculis, ex cerebro neruos suscipientibus moueri, ex anatomie didicimus, cerebrum ipsis, sic laborantibus credimus pati. Vbi verò ipsis illæsis, cæteras partes con-

t s uelli

uelli viderimus spinę medullę, initium patifatemur. Hęc igitur sunt, quę promptę discere, mox ipsorum passiones considerare oportet. Sed sunt nōnulli medici qui passiones ipsas, ne agrediuntur quidem, sed certant super rebus manifestę apparentibus, iacturam temporis nos facere cogūt, quod non erat consumendum, respondendo iis, qui recta medicorum discreta euertunt, sed inueniendo potius ea quę illi silentio præterierunt. Vel haudquaquām res ipsas definiunt, aut ea sine demonstratione, aut sine idonea distinctione, aut non satis abundę explicauerunt: quemadmodum Hippocrates, vbi neruorum conuulsionem vel ad plenitudinem, vel vacuitatem fieri dicit.

SCHOLIUM.

NON quācunque membri alicuius contractionem præter voluntatem contingentem appellant medici conuulsionem, sed cum proprię vtuntur hoc nomine, de neruorum motoriorum conuulsione

inulsione illud dicunt. Nam nihil prohibet membrum aliquod contrahi, vsto aut vtcumque aliter contracto ligamento, quod musculus nervo alligat, cum & vsta, aut male ad cicatricem ducta cute, sine nervorum malo membrum aliquod contractum manere contingat, tamen contractiones illae non sunt convulsiones. Quamquam si cui libet omnem membri alicuius contractionem convulsionem appellare potest, modo distinguat convulsionem ligamenti, atque aliarum partium, à convulsione nervorum motoriorum, intelligatque antiquos medicos hanc solam convulsionis nomine solitos significare. Quod arbitror eos facere quod per alias contractiones, quae sine nervorum malis fiunt, non apparent signa, quae convulsionis appellantur, quibus illi vtuntur ad cognitionem & curationem, puta convulsivus pulsus, & motus convulsivus antecedens, & talia quaedam. Itaque convulsio proprie dicta nervorum est, quamquam neque ita dici vellem, sed instrumentorum voluntariorum, musculorum scilicet, aut nervorum. Ita N. dicit Galen. primo, de causis Symptomatum, & certe videas Galenum, hanc passionem modo referre in nervos, modo in musculos, modo in ambo hæc, unde ego illud intelligo convulsionem ambo esse, tamen modo esse passionem propriam totius musculi & compassionem nervi, vt cum convulsio fit musculo distento multo flatu quem in seipso generat, (nam ita posse fieri Galenus ipse docet) modo esse nervorum propriam, & compassio-

nem

nem in musculo, vt cum repletionem aut inanitionem, fit ipsius nerui.

ETENIM verus est sermo eius quibus verò rationibus fulciatur vt fides ei adhibenda sit, non popularibus, sed doctis duntaxat viris, & qui diligenter prima medicinæ rudimenta didicerunt, notum est. Hæc igitur cum didicissem facile mihi persuasi, conuulsionem fieri ob eas causas, quæ ab Hippocrate dictæ sunt.

SCHOLIUM.

INDICATVM est à me libro. 5. controuersiarum cap. 14. verissimam esse sententiam illam Hippocratis, conuulsio omnis ex repletionem, aut inanitionem fit, nec præter dictas, esse aliam conuulsionis causam, quare vanum prorsus est, quod barbari dicunt, de spasmus non proportionato (ita illi loquuntur) ad materiam. Eo quod mala quæ sine repletionem aut inanitionem sunt, vel non propter repletionem, aut inanitionem, non tam conuulsiones sunt, quam motus conuulsioni quodammodo similes. Sed hæc dicto loco docuimus. Illud etiam hoc loco sciri expedit, conuulsiones, quam repletio facit cum

ea quam facit inanitio, si morborum essentias consideres, non esse eiusdem speciei morbum, imò vero neque eiusdem generis, sed esse duo mala genere diuersa, quæ similitudo symptomatis, contractionis inquam membrorum efficit, vt vno nomine dicerentur. Constat si quidem contractionem, non esse morbum sed symptoma, & actionem deprauatam, morbum verò esse affectionem illam nerui, quæ de prauatæ actionis causa est, per se & primò: ea vero est aut ariditas nerui, aut distentio quæ ab humore fit, distentionem hanc constat esse morbum in magnitudine nerui, ariditatem in temperamento. Est N. nihil aliud quam extrema siccitas. Ergo altera cōuulsio (affectus considero nō actiones lasas) est morbus in compositione, altera in temperamento. Tantum abest vt eadem species morbi sit. Hec apperte colliguntur ex Gal. loco presenti. Inquit N. humor madefacit ipsas vt in tumorem præternaturam attollantur, qui mox eas extendit. At veluti sol ea que reliccantur contrahit, ita siccitas chordas, & trahit, & extendit. His verbis apperte Gale. reijcit conuulsionem ex plenitudine in genus tumoris præternaturam, & eam quæ est ex inanitione in genus intemperiei simplicis, quòd primo de causis Symptomatum cap. 2. multo clarius dixit his verbis, Quoniam autem duplici ratione tenditur (erat illi sermo de retentione tunicae vuae, sed quod ad causas huius mali attinet nihil interest, de ijs, aut illis fibris loqui) cum vtique suapte natura id patitur vel siccata

*In multis ex 9.
stet. differt
genere a 9.
ex inambitione
nq huc est m
intemperam
illa inquant
aucta.*

cata vt corpus simile, vel humectata vt instrumē
 tale. Verū quādo hāc appertē iam monstrauius,
 ad aliud venio quod prescripta etiam verba decla
 rant, quodque quam plurimis videtur valde diffi
 cile, nempe quomodo differat, inter conuulsionem
 ex repletionē (Namque ex inanitione fit appertē
 dissidet) & paralysin. Videntur N. pāsiones hāc nō
 nullis sola ratione maioris aut minoris diuersa, eō
 quod mediocris obstructio deprauati motus neruo
 rum causa sit, maior verō illos sensu & motu omni
 no priuet. Res tamen nō ita habet. Sed ea paralyfis
 quæ humorem consequitur, (Non N. omnis fit hu
 more, sed quædam solo frigore aucto ex stupore,
 quædam etiam neruorum constrictione, aut com
 pressionē. primo. de causis Symp. cap. 4.) generatur.
 ab humore, humectante emollienteq; & obstruēte
 neruos, nequaquam tamen in tumorem eleuāte, cō
 tra conuulsio fit, vt hic a Gal. dicitur, quia humor
 in tumore præter naturam attollitur. Paralyfin er
 go facit humor, non tam replēs caua, & fibras a se
 ipsis multum distrahens, quam ipsas magis penetran
 do, emolliens. Habet ergo intemperici plus paraly
 fis. Conuulsio enim minima etiam fieri potest, hu
 more, aut flatu tumefaciente neruos, aut etiam ven
 tres musculorum. Proinde tenduntur fibræ per con
 uulsionem, laxantur per paralyfin. Differt itaque
 specie inter duos hos morbos, quantum inter intē
 periem humidam cum obstructione, & tumorem
 præter naturam interest.

Quippe

nomina dis
 quantur
 et sic, etiam
 ita.

QUIPPE si omnis motus qui à voluntate procedit attractis musculis in eas quibus innascuntur partes fieri videtur, nec possit fieri attractio, nisi ad suam originem retrahatur musculus: constat convulsionem, in convulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali differre quod præter voluntatem fit. Itaque quemadmodum in eo qui secundum naturam habet, voluntas in cerebro iuxta nervorum originem ordinata motionis principium primis dat nervis, ac per ipsos musculis: ita si sine huiusmodi principio inuenerimus quæ causa nervos conuellere possit, modum quo convulsio fiat nos iam scire non temerè profitebimur. Etenim si videris aliquando nervosa corpora ut lyrae chordas ob ambiētis aeris immodicam intemperiem adeò vehementer ut rumpantur intentas, haud difficulter intelliges, idem in animantium quoque nervis posse contingere. Sed quomodo affecto
aëre

aëre tenduntur chordæ vt rumpantur: Si
 vel nimis aridus, vel admodū humidus sit
nēpe humor madefacit ipsas, vt in tumore
præter naturā attollantur, qui mox eas extē-
dit. At veluti sol ea quæ resiccantur contra-
 hit, ita siccitas chordas & trahit, & extendit.
 Sic lora quoque cum ad ignem exiccantur
 contrahi tendique videntur his itaque præ-
 cognitīs haud difficile inuētū fuerit, vtrum
 ariditate quæ est humidæ essentiæ defectus
 & vacuatio, an humoris plenitudine quæ
 defectui aduersatur, & ab Hippo. repletio
 nominata est passio ipsa prodierit: quippe
 cum conuulsio fit, vel à labore, vel vigiliis,
 vel fame, vel sollicitudine, vel arida æstuan-
 teque feбри qualem in phreniticis videre est
 causam eius esse ariditatem, vacationemq;
 rectè putaueris. Si verò temulento, cui piam
 ac omnino pleno homini qui videlicet in
 otio degit id euenire conspexeris, non ab re
 à contraria causa conuulsionem ortum ha-
 buisse

nostr.

*laxa vacuatio
 in febribus
 febris.*

buisse iudicabis. Atqui euacuationi contraria est repletio.

S C H O L I V M.

NON præter rationem vbi Gal. dicit, cõstat cõnuulsionem, in conuulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali differre, quòd præter voluntatem: fit addidit in conuulsis partibus.

Nam si simpliciter diceret (vt plerique dictum intelligunt contractionem nerui: aut musculi quæ per conuulsionem fit, nulla alia ratione differre à motu voluntario, quàm quod inuoluntaria sit, falsa prorsum esset assertio. Nā cum mūsculus quispiā resoluitur, aut per mediū secatur, cõtrahitur alter qui cõtra positus ei est, id est præter voluntatē, cum tamen nulla cõuulsione laboret. Imò verò cum sanus omnino sit, trahitur siquidē per paralyšin mēbrū, versus partē sanā, cõtrā ac per cõuulsionē. Nec verò arbitror, cuipiā in mentē subeat dicere eam cõtractionē nō esse inuolūtariā, quāuis à sano musculo agatur. Ridiculū N. si, qui tortura oris laborat, Per paralyšin libēter putetur bucas cõtòrquere, cū tamē id omnes agerrime ferāt. Certe nō cõtrahitur musculus quispiā cū contrarius musculus paralyšin patitur voluntario impetu, sed naturali quadā suarū fibrarū cõtractionē, simili ei quā vides fieri vbi in

*hac doctrina
potest fieri
forte hanc
et cõuulsionem*

de mortuo homine musculū per trāuersum secas
 Nimirū fibræ omnes cum disſentē prius à te alia,
 remitti incipiūt, deponūt tētionē, corrugāturq; ſua
 ſpōte, facultas volūtaria nō poteſt naturali huic fi-
 brarū cōtractioni: vbi cōtrarius musculus reſolutus
 eſt, aut ſect⁹, obliſtere. Nā musculus omnis habet im-
 petū ad cōtractionē, ad laxationē nō habet. Sed cō-
 trarij cōtrarios diſtēdūt, nō ipſi ſeſe. Itaq; dicta cō-
 tractio eſt musculi, & eſt inuoluntaria, volūtariæq;
 omnino ſimilis, tamē cōuulſio non eſt. Quare malē
 putāt hāc eſſe cōuulſionis definitionē, eſt motus in-
 uoluntarius ſimilis volūtario. Nā huic quā modo
 produximus oratio hec quadrat, nomē cōuulſionis
 nō quadrat. Sed intelligendū eſt verē eſſe dictū om-
nē cōuulſionē eſſe inuoluntariū motū ſimilē volūta-
rio, nō tamē vim definitionis eſſe in illa orationē,
quādoquidē nō omnis motus inuoluntarius ſimilis
volūtario eſt cōuulſio. Quanquā poteſ definitionē
ita accipere, eritq; tūc cōuulſionē cōtinens. Eſt paſ-
ſio inſtrumētōrū volutariorum, per quam ad ſitum
talem, qualem per voluntatem comparere ſolent à
cauſa quapiā prāter naturam in ipliſ exiſtente
trahuntur. Si ita interpreteris quæ à Gal. 2. de cauſis
Symptomātū dicuntur, habebis tibi definitionē. Nā
ea cōtractio, quam ex paralyſi factam obijciebamus
nō ſit à cauſa quapiā prāter naturā exiſtente in muſ-
culo qui contrahitur. Nulla N. alia ea eſſe poſſet:
quām repletio, aut inanitio, quam nullam habet is
musculus. Quin potius benē valet, ſed cōuulſionis
 eſſentiam

ſtude ſimilis
 alioquin quāto
 nāctur argum^{to}.

essentiam & causam ex dictis modo, atque in libris
controueriarum, nemo non assequetur.

CAP. V.

Relectiuncula.

Transgressionem facit Gale. ad epylepsiam, & melan-
choliā, docetq; ambos hos morbos in cerebro fieri, a *era*
sis succis: epylepsiam, siue ij sint pituitosi, siue melancholi
ci, obstruentibus ventres cerebri, melancholiam à melan-
cholicis afficientibus ipsam cerebri substantiam. Obiter
differit de numero & principatu ventriculorum cerebri,
& de speciebus crassorum succorum, atq; deinde de modo
quo melancholia differt à phrenitide (quanquàm vtriq;
accidit perpetuum delirium) & à delirio accidente per fe-
brium vigores.



TQVE morbus quoq; comi-
tialis conuulsio est omnium cor-
poris partium non perpetua vt
in Emprosthotono & Opisthotono atque
Tetano videre est, sed que ex temporum ac-
cidit interuallis: nec solùm hac re, sed men-
tis quoq; ac sensuum obliæione à iam di-

*definitio
p. 113*

tur accedit ad hæc: vt is qui sic laborat, nec videat, neq; audiat, neq; vlllo sensu quicquã percipiat, ac ne consequi quidẽ possit quid factum sit, siquidẽ cū memoriæ viribus ratio quoq; læditur. Ex his igitur omnib; plañe cõstat in cerebro, hæc passiõẽ consistere impediẽte humore animale spiritum, qui in ventriculis eius cõtinetur quò minus possit exire. Porro quamobrẽ hic spiritus vocetur animalis, aut quæ sit eius potetia in eo cõmẽtario quẽ de Hippocratis Platonisq; placitis scripsimus, iam demonstratũ est. Sanẽ cū ea quæ per dissectiones apparere solẽt accuratẽ consideraremus, rationi cõsonũ videbatur, animam in cerebri corpore sedem obtinere, atq; in ipso & rationis vim & sensibilibus imaginum memoriã resistere, ac primum ipsius instrumentum, tũ in sensibilibus actionibus omnibus, tũ in his quæ à consilio & voluntate prodeunt, spiritum esse qui in ipsius vetriculis, maxi-

Vas p. b. an. l.
 ubi est p. an.
 affectu
 ex quo stat q
 op. sedantur
 modus quo
 sanatur alic
 tia sunt ab o
 tract. actione
 abstin. m. p. l.
 te humore
 B. motus d. p.
 habet. Neis
 principio. Te
 quatenus et
 quod dixit
 p. a.

neq; postremo continetur : quamuis non contemnendus, sit medius ventriculus perinde quasi non valentissimus sit. Multę N. rationes nos ad hunc adducunt & à duobus anterioribus abducunt verum exacta horum notitia ad curationis inuentionem nihil conducit. Nam satis fuerit ad probe curandum nosse sedem patientem esse cerebrum atque in eius ventriculis humorem crassum & viscidum comprehendere.

S C H O L I V M.

PR O P R I V M & inseparabile Epylepsij signū est, cōcussio totius corporis per interualla facta, quę quanquam à Gal. hoc in loco conuulsio nō perpetua omnium corporis partium appellatur, tamen, vt alio loco docuimus, re vera non est conuulsio. Ea N. non fit præ repletionē, aut innanitionē cōtractis neruis, sed est motus quidem conuulsiuus ab ipsius cerebri facultate, conante expellere profectus, appellatur tamen conuulsio à Gal. in significatione latiori accepto nomine vt cōuulsiuum etiam motum significat, vel quia cum motu, illo conuulsiuo in epylepticis semper coniungitur contractio, quædam

*Epylepsia nict &
ultrio Tenere,
& motus conuulsiuus.*

quædam membrorum, quare vera est conuulsio, & fit à repletionem, atque id quod statim subdit, dicens, ac fortassis per morbum comitalem conuulsio, haud ab similis est his quæ ab spinali medulla incipiunt conuulsionibus, singulorum neruorum irrigatis processibus, de contractione epylepticorum dictum intellige. Nam concussio satis dissimilis est neruorum ab spinali medulla ortorum, conuulsioni, immò verò singultui est similis motus, conuulsioni veræ non ita. Aut si de concussione hoc etiam videtur, causa consequentis sermonis intelligendum, ita intellige. Conuulsionem per morbum comitalem, id est conuulsiam illam concussione, similem esse conuulsioni. Non in motus specie, aut efficiendi causa, sed in materia morbi, eo quod vterque horum motuum fiat humore incidente in neruorum radices. Quod à Gal. dicitur, velocem discussionem indicare, causam epilepsiæ esse humorem crassum, non est dictum ad differentiam humoris tenuis (Velocior N. est discussio tenuis humoris, quàm crassi) sed ad differentiam ariditatis. ratione ita procedente, cum epylepsia conuulsioni similes habeat causas, eæque sint aut crassus humor, aut inanitio, inanitioque nulla ratione possit repetere, aut fieri, aut discuti, vt fit, & discutitur Epylepsia, habebit ea profecto ortum ab humoribus crassis. Quæ de spiritu animali hic dicuntur, septimo libro de placitis monstrata sunt à Gale. Quibus rationibus adduci posset, vt postremum. Cerebri ventriculum,

quæ modo in
Jahn 2. de
in Causa, qui
sunt Epilepsia

reliquis omnibus praponat , & medium duobus prioribus, non latis intelligo . Nam quod plerique putant , tres sensus interiores imaginationem , rationem, & memoriam locis disfidere, tenereq; imaginationem priores ventriculos, rationem mediū, memoratricem vltimum, atque perfectioni sensuū, perfectionem ventriculorum respondere, eo quod perfectissimus sit qui reminiscitur , imperfectissimus qui imaginatur , vanum prorsus esse iudico , & libro secundo controuersiarū demonstravi. Qua N. ratione possis mihi suadere hos sensus, ita esse in cerebro collocatos ? Aut qua ratione dum ita distribuis , non videaris imperare potius quam demonstrare ? Nam anatome ad hanc rem nihil præstat. Video enim esse quatuor ventriculos, duos priores à lateribus incumbentes alijs , tertium in medio sub his collatum quartum, postremum, & infimum: tamē illos imaginationem, hunc memoriam continere, nunquam vidi. Nec ratio curatiua potest mihi quidquam præstare . Nam vtcunque lædantur sensus interiores eidem parti sunt imponenda medicamenta, puta capiti ad futuras, potissimumque ad coronalem docente Galeno decimo tertio Methodi, capite vigesimo primo, quare verissimè dictum est hoc loco ab eodem Galeno , exactam horum notitiam ad curationem nihil conducere. Nam siue sensus illi interiores locis differant, siue secus: siue vētriculorū cerebri par sit dignitas, siue impar, siue hi illis præstēt, siue illi his, vtcūq; læda-

tur

tur mēs eidē parti imponi debēt medicamēta. Quare ad physiologiā pulchra disputatio est hęc, ad medicinā non est necessaria. Errauit itaq; Leonhartus Fuchsius in curatione phrenitidis ita scribens, vt locis horum sensuum instrumenta distare intellexerent, quod scire non parum in medendo, vt recte præsidia adhibeantur, prodest. Hęc inquit. tamen oportuit illum ex anatome didicisse, & si imaginatio & ratio locis differrent, quare earum læsiones diuersarum partium patientium essent, tamē non posse illis, diuersis partibus medicamenta imponi. Nam ventriculus medius, neque anterior est nec posterior prioribus, sed lubstat illis loco exactē medio. Cum ergo non possis ô Fuchsi medicamenta intrinsecus in ipsis ventriculis specillo admouere, cui cranei parti admouebis, ex qua ventriculū tertium respiciat, priores non attingens? Itaq; ratio curatiua nullatenus indicare potest sensuum interiorum diuersas sedes, nec ventriculorum cerebri imparem dignitatem. Quid igitur hoc possit indicare? Num læsæ actionis species? quod scilicet, nunc læditur imaginatio sine ratione, nunc sine imaginatione ratio, quod non contingeret nisi locis dissiderent? At ratio hęc, quicquid probabilitatis præ se ferat (nam quantum id sit expendimus alibi) illud vnum colligitur, sensus differre locis, tamen hunc esse in hoc, illum in illo loco, alia peculiaris ratio deberet suadere, quæ tamen est nulla. Sed vt sensus omittamus, nondum video quæ tam

*ad inguini
nāz texty.*

multæ rationes nos adducant ad medium ventriculū, & abducāt à prioribus, vt Gal. dicit. Nam si ab exortis argumentari volumus, ratio videtur cedere in contrarium. Nerui enim plurimi, & ij plurimo sensu præditi ante vltimum ventriculum exoriuntur, ab ea cerebri parte qua vltimus fit, nullum oriri video, præter septimum par, & fortassis sexti quandam portionem. Quod maior noxa sentiatur, vulnerato tertio ventriculo quam solis prioribus nihil facit ad maiorem medij ventriculi dignitatē. Nam cū non possit vulnus in tertium ventriculū penetrare prioribus non vulneratis, quanquam sit indignior, per se feret maiorem noxam vulneratus. vnicum mihi videtur superesse dignitatis medij ventriculi argūmentum à situ desumptum. Cū enim natura soleat ea quæ digniora sunt, & quorum maiorem curam gerit, in reconditori loco collocare, collocans priores ventriculos in loco sublimiori atque craneo magis vicino, medium verò sub his, ac sub corpore quod appellant cameratum quarum sub his omnibus in loco profundissimo, videtur nobis maiorem horum & minorem illorum dignitatem significasse.

IGITVR quemadmodum hæc ad curationes quarum gratia & patientes sedes, & earum pāssiones inquirimus, sunt vtilia: sic crassorū quoq; humorū differētæ

vtrum

*ratio dignitatis
mihi ex me
ori loco.*

eos nominari, cū simpliciter itā dicimus
utrū pituitæ, an atræ bilis naturā habent, si
tamē in prelētia nō obliuiscamur: videlicet
pituitosos qdē in quibus humiditas, frigidi
tāsq; melācholicos verō in qbus siccitas at-
que frigiditas dominātur: quāuis magnę pe-
culiarēsq; interim differentię, tum pituitæ,
tūm atræ bilis inueniantur. Pituitæ quidem
vnum genus est, quod quotidie vel secrean-
do, vel vomendo, vel emungendo educi-
tur, vaporoso scilicet spiritu plenum, vt
ne sensum quidem lateat ipsum esse dissi-
milare, alia verō pituita similis qdē vide-
tur, licet fortasse nō sit similis qualis est,
tūm crudus humor qui in vrinis substat, tū
is qui à Praxagora vitreus appellatur. Atq;
ex hoc genere esse videtur saliuā, quæ nec
fluida admodū est nec aquosa. Verūm sali-
uā non vnica dūtaxat qualitate gustum af-
ficit, ne dum vniuersa pituita. Sæpenume-
ro enim & salām & acidam, ac salūgino-
sam

sam in ore saliuam manifestè deprehendi-
 mus, veluti cùm sani degimus nulla quali-
 tate infecta, sed perinde quasi aquosa saliuam
 gustui offertur. Sic atra bilis quoque ob sub-
 stantiæ varietatem non obscuras habet dif-
 ferentias. Nam alia est veluti fex sanguinis
 quæ admodum spissa est fæcibus vini haud
 absimilis. alia verò quam superior essentia
 est multo tenuioris, atque vomentibus eam
 & olfacientibus accida videtur, quæ etiam
 terram radit, attollit & fermentat, atq; am-
 pullas quales feruentibus iusculis superna-
 tare videmus, excitat. Sed ea quam crassæ
 fæci similem esse dixi, in terram effusa nō
 inducit feruorem, nisi fortè in ardenti feбри
 ipsam præassari contingat, minimè autem
accida qualitate participat, tūmq; ipsam
 nominare cōsueui melācholicum succum,
 aut melancholicum sanguinem. Hæc enim
 meo quidem iudicio non rectè atra bilis ap-
 pellari potest. Prouenit autem huiusmodi
 humor

*habili dicitur
 habile me
 vltimū notātem
 ysternāly.*

*abilis quæ feru-
 dit attollit, exfer-
 untat est accida
 & Dōctōr Chā-
 rari.*

*claudia nācū
 est accida.*

*recte appellat
 rabilis*

te moueri, non solū medici sed priuati quoque dicere consueuerunt. Phreniticos autē non appellant, eo quod phreniticorum infania non quiescit mitigato febrium vigo-

Arunt tñ q̄ se re. Igitur quemadmodum in phreniticis
est signa ad infirmitatem
separabile a febris vnum quoddam accidens affectio-
malicia, demencia
em est signu su nis cerebri, cenletur sic è conuerso in ar-
mentu febris fa dentibus febribus demētia multis elatis ad
lis. q̄ si quisi
gali. im huc lē ipsum vaporibus. Similis est huic eorū que
sequenti pagina
in mine. ubi di in suffusis apparent symptomatum genera
hipo condriacali
itū p̄ se uocat ast tio, ab affectionibus ventriculi excitata.
ione melancholici
istia sequitur
et se uis q̄ a cū
em demencia
ilime dēuic
stuy ventriculo
Pha p̄pter nea
t cūctas ad os
ntiendi dēuic
ntes, q̄m n. May
i.
Est hanc p̄pau
ony exemplis
S. elois cap. 5.
adit exemplis.
rammatul epi
hici. I senty ven
uuli

Namque cerebrum ventriculo, & ventri-
 culus cerebro, suas passiones transmittit,
 idque propter neruorum à cerebro ad os
 ventriculi descendantium magnitudinem,
 per quos etiam sensus huic particulæ, quā
 vlli reliquarum corporis partium acutior
 est. Quocirca capitis fracturas cū ad mē
 branas vsq; perueniunt, biliosus vomitus,
 ac interdum dolores capitis quomodocum
 que fiant, nausea, stomachique morsio co-
 mittatur

mittatur. Hiponchodriacas verò & flatuofas vocatas paffiones melancholica triftitia fequitur, haud fecusquam acutam febrem dementia & quafdam oris ventriculi paffiones ea, quæ in accidentibus fuffufioni fimilatur, paffio. Sic neruofis partibus inflâ matis, promptius, quam reliquis delirium fuperuenire folet, idque afcendente ad caput, interdum per continuas partes fôlo calore, interdum verò fpiritu vaporofô, vel fumofo vel fuliginôfo.

*Hic in inter
fit, & thymia
calor.*

SCHOLIV M.

PITUITAE nomen aliquando dicitur de eo tâtum humore qui cum ê numero fit humorû quatuor, in via eft ad fanguinis generationem, aliquando latius patet, diciturq; pituita etiam fuccus crudus, (ita appellatur humor qui folet eſſe in crudis tuberculis, & ſubſidere in vrina) qui à reliquis pituitæ ſpeciebus differt craſſitie (Craſſus enim eſt) à vitrea pituita differt lentore, eo quod vitrea pituita, vt eſt craſſa, ita eſt lenta. Diuidi folet pituita ab authoribus variè, nunc in plures, differentias, nunc in pauciores, quod duplici de cauſa fieri reperies, aut quod differentiæ earum iuxta diuerſa pituitæ

tuitæ accidentia sumuntur: aut quod differentia aliquot earum quæ alicubi dicuntur, alio in loco tãquam ad alias relate dimittantur. Videas ergo Gal. nonnunquam capientem differētias pituitæ ex modo substantiæ, nonnunquam ex saporibus, nonnunquam ex vtrisque. Atque ex modo substantiæ, non vnico modo diuisionem facit. Neque enim substantiæ modus vnum est accidens, sed modò in eo cõsideratur crassities aut tenuitas, modò æqualitas aut inæqualitas partium. Itaque potest pituita multis modis diuidi, quanquam omnes diuisiones perfectæ sint. libro secundo de differentia febrium ca. sexto, diuisit Gal. per sapores, fecitquè pituitæ species quatuor, vitream, acidam, salſam, & dulcem. Quarto etiam de ratione victus accutorum commẽtario. 13. per sapores diuidens fecit tres species, redigens nimirum vitream ad acidam. Nam duobus his locis non aliorſum inueſtigabat, species pituitæ, quàm vt inueniret febrium diffentiã, & ex multis alijs pituitæ speciebus tam diuerſæ febrium figuræ prodeunt, quam ex his quæ ſumuntur ex ſaporibus. Vitreãverò ommiſit 4. de ractiõẽ victus, quia vt dixi ſub accida cõpræhendi poteſt, & re vera eſt differentia ex modo ſubſtantię potiùs ſumpta, quã ex ſapore, quã tamẽ in opere de differētia febrium, nõ oportuit omitti, quia inſignẽ facit figuram febris. Primo de alimentorũ facultate, ca. 1. multarum differentiarum pituitæ meminit diuidens ſecundum ſapores in quatuor, acidam, ſalſam, dulce, & incipidam,

spidam, secundum modum substantiæ dupliciter, primum in crassam & tenuem (intelligi oportet mediocrem, & si non dicatur) deinde in viscidam & dissipatu facilem. Nimirum in opere de facultatibus naturalibus has omnes differentias dici oportuit. Sunt enim alimentorum quædam, succi tenuis, quædam crassi, quædam lenti, quædam succi sine lentore, quædam dulcis, quædam falsi. Dixit verò hic saporum differentias quatuor, quia addidit inspidam, quæ est naturalis pituitæ species, quæ in opere de differentia febrium non debuit dici, naturalis enim pituita talis manens, non potest fieri febris causa. Hoc etiam in loco simile quoddam artificium est. Quoniã enim de pituita quæ in cerebrũ incidens obstructions facit, est disputatio, hoc verò nulla qualitate ita fit, sed aut è qualitate partiũ, aut inequalitate quæ ex admistione flatus nascitur, aut crassitiæ aut tenuitate. Ab hac diuisione incipit Gale. deinde sapes addidit, quia ad enarrandam acidam melancholiæ qualitatem erat facturus transgressionem. Vbi Gal. dicit, alia quidem pituita similis videtur, licet fortasse non sit, alludit ad sententiam Platonis, qui censuit omnem pituitam esse dissimularem ex multis inuisibilibus ampullis cõflatam. Quod verba hæc ex Timæo declarant. Sæpe verò tenerioris recentisq; carnis portio quædam, vnà cum aëre colliquescit, deinde vëto inflatur incluso, humiditate protinus circumfusa fiuntq; ex hoc ampullæ, quæ sigillatim propter par-

uitatem videri non possunt: lunctæ verò simul in-
 grādiorem tumefactæ molem, conspiciuntur. Colo-
 rēque propter spumæ generationem habent al-
 bum. Omnem hanc tenerioris carnis eliquationem
 vna cum spiritu factam, quæ ex humiditate vento
 circumfusa tumescit, albam pituitam appellamus.
 Saluare vera non est pituita, quāquam verba hæc
 (Salua non vna qualitate duntaxat gustum affi-
 cit, nedum vniuersa pituita) illud videntur signi-
 ficare. Sed est humor quidam in oris & fauciu glan-
 dulis genitus propriam substantiam habens.
 Quod appertè intelliges ex saluæ viribus, quas de-
 cimo de simplicium medicamentorum facultate
 Gal. scribit. Constat enim illas nullius speciei pitui-
 tæ esse, sed quoniam admistione humorum qui re-
 dundant, maximeque pituitæ varios sapes induit
 salua, & quia cum salua quæ verè salua est,
 multa pituita quotidie spuitur illam appellat pitui-
 tam, atque ex illa sapes pituitæ iubet explo-
 rare. Vbi legimus, sæpenumero enim & salam &
 acidam, & falsuginosam, à quibusdam legitur, a-
 maram, & acidam, & falsuginosam, ab alijs acrem,
 & acidam, & falsuginosam, tamen non sine errore
 Nam præterquam quod dictione ἀλυκόν neque a-
 cris, nec amara significatur, sed salsa, sensus etiam
 fit vitiosus. Nam cum occasione pituitæ, mentionē
 faciat saluæ, oportet quæ de salua dicuntur ad pitui-
 tam transferri, itaq; dici speciem aliquā pituitæ a-
 crem aut amaram, quod nē apud Gal. ipsum neque
 apud

apud alium quempiam authorem inuenias. Omnes enim ex saporibus quatuor tantum species numerant, (id quod à Platone ipso fluxit) salsam, acidam, insipidam, & dulcē (nam sicubi apud Auicenam amaris dicitur, acida significatur) nimirum pituita nullo modo alterari potest, vt amarescat, antequam in bilem permutetur. Quod si miscetur cum bile, aut ea est modica, redditq; salsam, aut copiosior, rapitq; denominationem, estq; bilis. Itaq; nulla pituita est amara. De atræ bilis speciebus libro 1. controuersiarum cap. 21. satis à me disputatum est. Sed quod de naturali melancholia hoc loco dicitur (minimè etiam acida qualitate participat) videri posset alicui falsum. Cum Gal. ipse soleat hunc eundem humorem acidum appellare, nec solum acidum, sed & acerbum appellauit. s. de usu partium his verbis: Acerba enim est, & acida nigra bilis. Nec verò nomine nigræ bilis loco illo alia intelligi debet quam naturalis melancholia, disputat enim de ea quam lien secundum naturam congerit, & quotidie reijcit in ventriculum. Tamē cum hic à Gal. dicitur *ἡ κίσα μετέχει πικρότητος & ὀξείας* id est, minime participat qualitatem acidam, ne intelligas quod nonnulli intelligunt, quasi dicat nulla qualitate acida participat, sed *ἡ κίσα πάντως* id est minimè omnium (supple specierum melancholiæ) acida qualitate participat, quæ dictio non significat melancholiam naturalem non esse acidam, sed minus acidam esse omnibus speciebus præter natu-

*Thy melanco
nalis sit*

ralis melācholiæ. Iam verò quod 3. de vsu partium
 dicitur *σφιγνὴ γὰρ ἐστὶ καὶ οξεία, ἢ μέλαινα* nolim itā
 transferri. Acerba n. est & acida, sed, astringens n.
 est & acida, & vt nomine astringentis nō significetur
 sapor intenior acido) nā melancholiā naturalē
 haud parum est esse acidā) sed vi astrictoria. s. om-
 nia acida aliquatenus astringunt. Ergo temperamē-
 ta nō debere definiri per humores, sed per qualita-
 tes, monstratū est lib. 1. cōtrouerſiarū, & ab alijs an-
 te me. Quare nō est idē dictū tēperies melācholica,
 & tēperies frigida & sicca, sed quæ tēperies sit per
 quam, multa melācholiæ copia in corpore colligi-
 tur, nunc definire oportet, non n. est vt prima frō-
 te videri possit tēperies frigida & sicca. Nā quæcun-
 que natura frigida est, vtcumq; habeat in passiuīs
 qualitatibus, eorum humorū generat copiam, qui
 crudiores sunt sanguine, quique citra sanguinē cō-
 sistentes appellantur. Huiusmodi sunt solū pituito-
 si, vt videre licet 4. de tñeda valetudine, vbi de bi-
 liosis ac pituitosis humoribus ita scriptū est, siquidē
 sanguis qui medio est biliosorū, atq; horū quorum
 genus appellare licet vel crudum succū, vel pituitā.
 Illi namq; ex sanguine fiunt, vbi supra iustū modū
 est percoctus, hi verò ex eo nōdū perfectō, hæc Ga.
 vnde facile est intellectu calorem minorē quam vt
 possit sanguinem perficere, nec melācholiæ magnū
 prouentū facere, sed pituitā id quod senes etiā de-
 clarant, qui cū frigidissimi sint ac siccissimi, nō ta-
 mē sunt melācholici, sed pituitosi: itaq; melācholia

2. quæ temperies
 est crudior
 et acida?

supra naturalē mensurā non gignitur à frigidis & ficcis, sed calidi, & ficii sunt quicunq; generāt multam aut melācholiā, aut bilē flauā, aut atrā: (qui n. calidi sunt & humidi sanguinē colligunt, qui frigidi siue cū humiditate siue cum ficcitate, pituitā) nō tamen omnes eodē gradu, sed qui aliquādo calidiores sunt iusto, quia à maiori calore crassior gignitur sanguis & veluti taurinus, melācholiā: qui multum calore iā vrente tenues partes sanguinis, flauā bilē qui maximē, atram bilē, calore vrente iam etiā partes crassas sanguinis, & tenues alioqui vstas perurēte. Hoc docuit Ga. haud obscurē 3. li. de causis symptomatum capi. 2. ita scribens. Sed alteratricis potētiae intemperies, quæ ad calidius sit versa, aliās biliosum, aliās melācholicū efficit excrementū, quemadmodū aut vtrūq; in alijs est traditū. Ad frigidius verò mutata, vel pituitosius vel aquosius facit excrementū. libello etiā de atra bile ca. 4. ita scripsit, sanguis igitur in vena secunda crassior & nigrior in siccorū calidorūq; corporū naturis conspicitur. Hæc in illo loco, ex quib⁹ euidenter patet eū docere naturā calidā & ficcā gignere melācholiæ multā copiam. Nam melancholiæ redundātis nullū est apertius signū, vt sequēti ca. dicetur quā sanguis è vena fluens melācholicus apparēs, (niger & crassus puto) quid ergo, non omnes melancolici sunt calidi? non omnes. Sed quicūq; maiore melācholiæ copiam colligere iniijciant quā pro natura ciborū quibus vtūtur, calorem habent moderato maiorem, hi verò i-

psi diuturnitate possunt frigidi euadere, manebūtq;
 nihilominus melācholici, non gratia temperatura,
 (hæc enim pituitosa esset) sed quod consuetudo mem-
 branæ nutriri melancholia, eam expectant, ac gratia
 similitudinis quam cum ea contraxerunt, omnia in
 melancholicum sanguinem transmutare tentent,
 nō aliter quam leucophlegmatici hominis mēbra
 in pituitam. Itaq; constat ut possit tandem frigidus
 simul ac melancholicus esse homo, sed constat non
 minus homines natura sua atq; à prima generatio-
 ne frigidos, & siccos, & pituitosos esse, nō melācho-
 licos. Quod præter dicta, illa etiā quæ à G. sequēti c.
 dicuntur apertè declarant, describens enim eos ho-
 mines qui facile colligunt multam melancholiam
 ita inquit, macri, nigri, & hirsuti & quibus latè sunt
 venæ, & impense rubri, & flauī: quæ omnia con-
 stat esse signa calidi temperamenti: sed de his sta-
 tim dicemus. Nerui ex sexta coniugatione in os vē-
 triculi venientes compassionis illius cum cerebro
 sunt causa, & acer sensus, qui præ alijs omni-
 bus corporis partibus huic inest, quo fit,
 ut hæc sola fame & siti crucietur,
 quoniā scilicet nulla alia est,
 quæ cum tam acri sensu
 tantam suctionem
 sustineat.

Relectiuncula.

Docet Galenus cerebrum non eundem semper morbum à crassis humoribus pati, sed diuersos cùm quoniam crassi humores diuersi sunt pituitosi scilicet aut melancholici: tũ etiã quia ij diuersimode lædunt cerebrũ, nonnũquã enim lædunt illud vt partem instrumentalem, nonnunquam ut similem, vt instrumentalem: vt cùm obstruunt, faciuntq; ita epylepsiam, vt similem, vt cum ex melancholico succo melancholia morbus fit, huic contingit, vt epylepsia, & melancholia facili in se inuicem commutentur. Quanquam non æque vtrumque in alterum, sed melancholici omnes possunt fieri epyleptici, non tamen omnes epyleptici melancholici, quia epylepsia à quocunque crasso succo fieri potest, melancholia verò haud quaquam à pituitoso, quare epylepsia pituitosa nõ potest mutari in melancholiã, potest tamen in apoplexiam. Post hæc inquit Gale. melancholiam tripliciter fieri, aut redundante melancholico succo in solo cerebro, aut hypochondrijs, aut in toto corpore, præstatque signa, quibus dignoscatur redundet in toto corpore, an: vnico aliorum membrorũ, ex corporis habitu melancholico, & victu antecedente, & rezentis melancholicis vacuationibus, & modò substantiæ sanguinis fluentis. Signa verò hypochondriacæ melancholiæ petit ex Diocle.



ORRO', quemadmodum
 hæ pafsones, quibus caput
 per confenfum patitur, ita il-
 læ quoque, quæ primogeniæ
 ipsius pafiones funt, non pa-
 rû inter fe differunt. Igitur craffi humores,
 qui in cerebri fubftantia abundât, interdû ei
 vt inftrumétali, interdû vt fimilari parti no-
 cent. Cùm enim meatus obftruuntur, vt
 inftrumétali, cùm verò temperamentum
 alteratur vt fimilari: proinde totus hic fer-
 mo in fine fexti libri de vulgaribus morbis
 præfcriptus eft: melancholicique magna
 ex parte comitiali morbo afficiuntur, & cõ-
 tra morbo comitiali laborantes efficiun-
 tur melancholici: atque horum vtrumli-
 bet magis accidit, prout vel in hanc vel in
 illam partẽ infirmitas repit, Si enim in cor-
 pus comitiales, fi verò in mentem, melan-
 cholici redduntur. Hoc fermone primum
 quidem declarauit quod nõ femper fed ma-
 gna

gna ex parte harum passionum altera in alteram transit. Quippe non solum atra bilis, verum etiam pituita morbum comitialem committit. Igitur ea quam atra bilis constituit, in melancholiam aliquando transit, quæ verò à pituita parta est, in aliam passionem de qua paulò post dicturus sum, permutatur, melancholiam verò, haud quam efficit. Altera verò Hippocratici sermonis pars non paruum contemplandi locum desiderat: quippe cum anima sit, aut temperamentum actiuarum qualitatum, aut ab ipsarum temperamento permute- tur: Bilem: cum cerebro veluti parti instrumentali nocet, ad cerebri corpus conuerti ait, id quod in obstructionibus fieri constat: cum verò temperamentum mutando, ei vt simili nocet ad mentem eam repere dicit. Verum hoc, quod medici dereliquerunt, de finire imprimis necessarium esse videtur, nempe vt in manifestis corporis partibus,

interdum omnibuseadem apparet temperies vt in morbo regio & elephante sic vocato, & aqua inter cutem, & malo habitu. Insuper in his, quæ ab hepate, atq; splene pendent, colorum vitiis. Interdum verò vnius duntaxat partis, quæ videlicet, aut biliosum, aut pituitosum, aut melâcholicum humorem suscipit, temperies permutatur. Ita etiâ cerebro accidit vt nonnunquã vniuerso in venis sanguine melâcholico effecto, ob cômune vitiũ, ipsum quoq; lædatur. Nonnunquam verò reliqui corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro cõtensus est, alteratur, idq; bifariam fit. Aut N. aliunde in ipsum deriuatur, aut in ipso met melancholicus humor genitus est, generatur autem à multo calore interno asfante crassiolem, & nigriorem sanguinem. Atq; hæc doctrina non paruum habet in curatione momentum, siquidem vbi vniuersum corpus sanguinem melancholicum continet,

continet, curationem à venæ sectione incipere oportet. Vbi verò solum cerebrum, infirmus (quod ad hanc passionem attinet) sanguinis detractione non indiget, quamvis ob aliam quampiam causam sanguis mitti possit. Vtrum verò melancholicus sanguis vniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, ita discernendum est. Imprimis vniuersi corporis habitum qualis sit, consideres velim, meminerisq, quod molles, & cãdidi, & obesi nequaquam humorem habent melancholicum. Macri verò & nigri, & hirsuti, & quibus latæ sunt venæ, aptissimi sunt vt huiusmodi in ipsis humor cumuletur: fitque interdum vt impenitus rubri homines affatim in melancholicam temperiẽ decendant, atque post hos flauï, idque maxime quando, & vigiliis, & multis laboribus & solitudine, & tenui victu fuerint educati. Quibus hæ quoque notæ conueniunt, an hæmorrhoids aliqua restricta sit, aut alia que
piam

piam consueta sanguinis vacuatio aut mulierum menstrua. Insuper quibus cibis quis fuerit usus, vtrum iis, qui suapte natura melancholium sanguinem pariunt an è diuerso. Porrò qui melancholicum sanguinem efficiunt hi fere sunt caprina, bubulaque caro, magisque hircinæ, & taurinæ, sed maxime asinorum, camelorumque carnes, nam & his nonnulli vescuntur: item vulpinæ, caninæque carnes: atque magnâ in huiusmodi sanguinis generatione vim obtinet ex lepore cibis, sed multo magis ex apris: ac limaces quoque melancholicum sanguinem pariunt, si frequens sit eorum usus: præterea omnes terrenorum animalium carnes salæ conditæ, aquatiliū quoque carnes vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem brassica fere sola, huiusmodi sanguinem gignere consuevit, quemadmodum & arborum germina, vbi vel muria
vel

vel oxyhalme cōdiuntur præcipuè lentisci, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminum verò omnium maximè lentes, inter melancholicos cibos numerantur, mox panis furfuraceus, & qui ex tipha, atque vitiatis seminibus factus est, quorum apud quasdam nationes vsus loco frumenti habetur verū de iis in primo libro de ciborum facultate iam dictum est. Præterea vina crassa, nigraque aptissima sunt, ut ex ipsis melancholicus humor fiat, præsertim si quis abunde ipsa ingerens, incommodâ oblatâ occasione, in multo corpus calore contineat. Vetus denique caseus ubi forte fortuna in corpore fuerit super calefactus, facilè huiusmodi parit humorē. Igitur si quis antea, quàm in morbum inciderit, huiusmodi victus ratione fuerit educatus, maiorem quandam inde licet facere coniecturam. Si verò boni succi cibus vsus fuerit, considerare oportet exercitationes ipsius, inestitiam, vigilias, sollicitudines.

334 DE LOC. PAT. G. CVM SCHO.
dines. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles
(vt dictum est) morbos, melancholicum
humorem contraxerunt, atque ad efficacio-
rem notitiam, non parum confert anni tem-
pus, ac præterita, præsensque constitutio,
item terra, ac laborantis ætas. His itaque om-
nibus præconsideratis, cum speraueris in v-
niuersi corporis venis melancholicum san-
guinem contineri: quo certiore habeas no-
titiam cubiti venam seca, præcipueque me-
diam, quæ communis est, & ei, quæ hume-
ralis nominatur, & ei quæ per axillam ad
manum fertur, quòd si tunc fluens sanguis
non videatur melancholicus, statim sup-
primatur. Si verò talis appareat, vacua quã-
tum pro laborantis corporis habitu satis
esse conieceris.

SCHOLIUM.

NISI nuperrimè monstrauiſſemus melanco-
lici succi magnū prouentū cū nō culpa victus
fit, ab intēperie calida procedere, meritò quispiã
intelligeret omnem melancholiam propriam cere-
bri esse ināniam, ex illis verbis Gal. Aut N. aliunde in
ipsum

ipsum deriuatur, aut in ipso met melancholicus humor genitus est, generatur autem à multo calore, in terno affante crassiores, & nigriorem sanguinem. Verum omnem melancholiæ prouentum nimium, indicare calidam temperiem sequentia declarant, Quales N. dicit esse melancholicos? Macros, nigros. & hirsutos, & latis venis. Hos tamen omnes calidos esse natura, docet libro artis medicinalis cap. 56. his verbis, calidior simul, ac sicciior est quæ hirsuta magis, ac calida, & dura existit, & pinguedine caret tenuisque est, & capillos nigros habet. Si verò multum in caliditate excedat, calor quoque niger illi adest. Hæc Gal. quibus aperte docet quos modo depingit nullatenus esse naturâ frigidos, si qua ratioe frigidi esse possunt, id quidem erit quod ætate tales redditi sint, vt cum prius essent biliosi, in tempore decrementi redditi sunt frigidi, hi euadunt melancholici, quia naturâ calidi in consistendi tempore habent calorem minorem iuuenili qui omnia in bilem commutabat, maiorem verò quam reliqui consistentes qui pituitosi fieri incipiunt, proindeq; ipsi melancholici ea ætate sunt, quod dictum est. cap. 59. artis medicinalis. quo etiam cap. Qui natura sua sunt frigidi & sicci graciles, & glabri esse perhibentur. Vbi nos legimus fitque interdum vt impense rubri affatim in melancholicam temperiem decidant. Legit Copus, qui rufi colore sunt, non sine magno errore. Nam præterquam quòd Græce habetur *ἐξερπύλοι ἀνθροποι*, falsus prorsum sensus redditur

ditur illa versione, nam rufus color cap. 58. artis medicinalis naturam significat frigidam & humidam quam constat esse pituitosam. Ergo Typha quātum ego, ex primo de alimētorum facultate possum colligere est genus frumenti quòd Hispane appellatur centeno. Quod genus vere est melancholicum. Fit N. ex eo panis grauis odoris & ater.

EST præterea tertium melancholię genus, morbi comitialis exemplo, cum ortum à ventriculo habuerit. Solentque medicorum aliqui, hanc dispositionē, Hypochōdriacū, flatuosumq; morbū nominare. Sufficit autē mihi ea percurrere symptomata quæ Diocles illi assidere scripsit in eo libro cui titulum fecit passio, causa, & curatio. In eo N. Diocles ad verbū ita scripsit. Porro alius oritur à vetriculo morbus, qui supra propositis non dissimilis est, nominaturque ab aliis melancholicus, ab aliis flatuosus, quem sumpto cibo, maxime coctu difficili, & ardorem inducente, sputum humidum, idemque multum comitatur, item ructus

uctus accidus flatus, estus in præcordiis, fluctuatio nō illico, sed cū retinuerint : interdū ventriculi quoq; vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum vsq; procedūt, concoctis deinde cibis quiescūt, mox aliis ingestis eadē rursus reuertuntur acidentia quæ interdum ieiunos, interdū etiā à cena molestāt, atq; euomūt crudos cibos, & pituitam, vel subamarā, vel calidam, vel acidā, adeo vt nonnūquam dentes stupore afficiātur. Atq; horum plurima ab ineūte statim etate eueniunt, vt cumq; tamen acciderint omnibus producuntur. His præscriptis, Diocles mox causam subiungens ita scribit: cæterū flatuosos vocatos, suspicandū est, plus caloris, quàm expedit, habere in his venis, quæ alimentum à vētriculo excipiūt sanguinemq; in ipsis crassiorē factū. Quippe in his venis sanguinē cōtineri cōstat, vel hoc argumento, quod alimentū corpori non distributo, sed in vētriculo manet incoctū, cū ipsum

y meatus

meatus antea susciperēt, magnamq; ipsius partē in imum ventrē excernerēt. Itē quod postero die vomāt, vt potē nō digestis per corpus cibus. Sed quod calor id, quod secundum naturā est, facili mē intelliges, tūm ab estu qui in ipsis accidit, tūm ab his, quæ ingeruntur. Siquidē iuuari videntur refrigerantibus cibus, qui videlicet calorē refrigerare, extinguerēq; solent. Deinde alia quoque Dioclesiam propositis in hoc sermone addidit. Aiunt autem nonnulli os ventriculi, quod intestinis continuatur, in huiusmodi passionibus inflammari, ac ob inflammationem ipsam & obstrui, & prohibere, ne alimenta statuto tempore ad intestinū descendāt. Quamobrē diutius, quam decet in ventriculo manētia, & tumores & estus atque reliqua quæ prædicta sunt, efficiunt. Hæc sunt quæ Diocles quidē literis prodidit. Verū in hoc symptomatum catalogo præcipua totius concursus silentio præterit,

riit, quæ videlicet & melancholiã, & flatuofam, hypochondriacamq; paffionem, tanquã caractere quodã designât, atq; omiffit (vt puto) huiuscemodi accidētia, eo quòd ex morbi ipfius nomine manifestè declaratur. Etenim ab Hippocra. didicimus: si metus & mēstitia longo tempore tenent, melancholica est huiusmodi paffio. Verùm haud absurda quæstio est, quare Diocles cùm causas aliorum accidētium redderet, quàm ob causam mens lædatur, non scripserit. Siue N. venarũ, quæ vētriculo contiguæ sunt, calor exuperat, siue partes, quæ iuxta portã sunt inflāmatione laborât, quid causę sit, cur melãcholica comitētur accidētia, derelictũ est. Etenim quod vēter flatuoso spiritu impleatur, ac deinde eructãdo ipsum leuetur, ac præterea, quæ dicta sunt vomitione quoq; iuuetur, vt nihil dicente Diocle manifestum est. At propria melancholiæ acidētia, simul cum dicta ventriculi paffione

y 2 sione

sione scriberet, haud ita facilè ei fuit. Nos igitur hoc adiiciamus, affectum ipsum manifesta interpretatione enarrantes. Atq; videtur quidem in ipso inflammatio esse. Sanguis autè in parte inflammata contentus & crassior, & magis melâcholicus. Itaq; què admodum elato ex ventriculo ad oculos fuliginoso quodam, aut fumoso habitu, aut crassis quoq; vaporibus, similia suffusorum accidentia cōtingunt. Eadem ratione sublata ad cerebrum, ab atra bile euaporatione, melancholica eueniūt in mente accidentia. Quinetiam quàm frequētissimè videmus, flaua in ventriculo bile contenta, caput dolore affici, vt ea per vomitum eiecta, illico dolorem mitigari. Atq; huiusmodi dolorū genera, mordendo, exedendoq; infestant, Quemadmodum alia grauitate, alia tensione, alia sopore molestare videntur. Atq; inter optimos medicos conuenit, non solūm accidentia, verū etiam morbum comitialem,

*vt comitia
a ventriculo*

lem, capiti à ventriculo procedere. Igitur
vt melancholicos timor nunquam deleat,
ita præternaturam eis visa non semper eo-
dem genere continentur. Siquidem alius te-
stam se factum putauit, atque idcirco ob-
uiantibus cedebat, ne collideretur: alter gal-
los cantare audiens, vt hi alarum, sic ille
brachiorum plausu latera quatiens, animã-
tium sonum imitatus est. Fuit item alter, ti-
mens ne Atlas, qui mundum sustinere dici-
tur grauatus sub tãto onere, ipsum à se ex-
cuteret, atque ipse cum illo collideretur, ac
nos quoque cum ipso periremus. Sunt alia
huiusmodi infinita eorum visa. Differunt au-
tem inter se melancholici. Nam omnes ti-
ment, merent, vitam damnant, odio habent
homines, sed non omnes mori cupiunt. Ete-
nim hoc ipsum nonnullis melancholiæ ca-
put est, quod mortem pertimescunt. Quos-
dam etiam alieno admodum, atque extra-
neo videbis animo: vt pote qui simul &

y 3

mortem

mortem metuant, & tamen mortem sibi consciscant. Proinde rectè videtur Hippocrates omnia ipsorum accidètia in duo hæc coegisse, metum, & mestitiam, mestitia nimirum eos inducit, vt odio prosequantur omnes quotquot viderint, nunquam nõ tristitiam præ seferentes: ac terrentur vt in tenebris pueri, atque ex adultis indocti. Sanè quemadmodũ externæ tenebræ omnibus ferè hominibus pauorem inducunt, nisi vel audaces admodum, vel edocti fuerint: sic atræ bilis color, mentis sedem tenebris obũbrans timorem efficit. Etenim summis, tũ medicis, tũ philosophis, in confesso est, & humores, & omnino corporis temperantiam animæ actiones variare posse: id quod nos quoque vnico commétario docuimus quo demonstratum est, quòd animæ potentie corporis temperaturam sequuntur.

Quocirca humorum viũ ignorantes (in quorum numero & Erasistratus est) ne scribere

bere quidem de melancholia quicquam au-
si sunt. Nec indignum est admirari tùm cõ-
munes hominum sententias, tùm plurima
quoque dogmata, quę & philosophi & me-
dici per ignorantiam præterierunt. Igitur
ab omnibus passio ipsa melancholia vo-
citatur, indicante nomine humorem, qui ip-
sius causa est. Quum circa ventriculum, pri-
ma inceperint accidentia, ipsisque auctis
melancholica sequatur passio, deinde alui
deiectione, & vomitū, & proba concoctio-
ne, ructibusque leuetur is, qui laborat, hy-
pochondriacum flatuosumque morbum,
ipsum nominabimus. Accidētia verò ipsius
dicemus & mestitiam, & metum. Quum
autem propria melancholiæ accidentia au-
ctiora vidētur: circa ventriculum verò, aut
nulla, aut parua admodum sunt: haud ab-
re existimaueris primitiuam in cerebro pas-
sionem consistere, ob atram bilem in ipso
congestam. Cæterum quibus signis discer-
y 4 natur,

iratio.

natur, vtrum in solo cerebro, an in vniuerso corpore huiuscemodi humor contineatur, paulò ante dictum est. Interim monendi sunt mihi amici, qui me curantem viderunt, frequentibus balneis, victùque humido, bonique succi, nullo alio adhibito præsidio, huiusmodi me morbum curasse, vbi nondum ob longum temporis tractum, nec cuius humor multum vacuationi resisteret. Quum N. diuturnus iam factus est morbus, fortiora prædictis oportet adhibere remedia. Fit autem huiusmodi melancholiæ species affecto prius calidis passionibus cerebro, aut ex estuatione, aut inflammatione, aut phrenitide quoque ipsum afficiente, interdum à solitudine, mæstitia, vigiliis. Verùm satis fuerit, hæc de melancholia dixisse.

Scholium.

SCHOLIUM.

CVR si hypocondriacus morbus æstus est aut inflammatio circa ventriculum, ructus acidi fiunt ex assumpto cibo, ac non potius nidorosi, quales verisimile erat calidam intemperantiã subsequi, an quia multa melancholia, succus alioqui acidus, quæ eo tẽpore hæret circa hypochondria miscetur cum cibis, ipsosq; acidus reddit? De modo quo ater melancholiæ color metum & mestitiã parit, disputatum à me est libro 5. controuer. modo illud vnum satis sit dicere, non minus expedire, vt spiritus animales lucidi sint, quo actiones animales eis, vt instrumentis, citra noxam agantur, quam vt bene temperati, non minus ergo vitiabuntur, atq; cum ipsis animales actiones, conturbati, denigrati-que, quam mala temperie affecti.

CAP. VII.

Relectiuncula.

Trifariam fieri morbum comitiales docet hic Gal. aut per passionem propriam cerebri, aut per consensum, idq; biffariam, aut consentiente cerebro cum ventriculo, aut cum alia quapiam parte. Refert etiam duas hystorias vt doceat quo modo tertia hæc epylepsiæ species fiat, ac docet causam qua motus convulsivus per morbum comitiales fit.

y s

Atq;



ATQVE de morbo comitiali
 deinde dicendum est, quandoqui-
 dem hic quoque interdum ipso-
 met affectu, interdum aliis consentiente ce-
 rebro, euenire solet. Vt enim tria melácho-
 liæ genera, ita hunc quoque morbum, tri-
 bus contentum differentiis, omnes ferè me-
 dici distinguere neglexerunt. Verùm omni-
 bus commune est, quod cerebrum affici-
 tur vel consistēte in ipso passione, id quod
 pluribus comitialibus accidit, aut à ven-
 triculi ore (quod stomachum vocare solēt
 medici) ad cerebrū per cōsensum ascendēte.
 Atque hoc genus proportionē respondet
 accidentibus, quæ oculis à stomacho ad-
 ueniunt, veluti in suffusionibus. Fit etiam,
 sed rarò, tertia morbi comitialis species
 (nec refert siue genus, siue differentiam no-
 minaueris) cū à parte aliqua cui id fore for-
 tuna accidit, incipit passio quæ deinde sentie-
 te ægro ad cerebrum vsque ascendit. Hoc
 genus

genus primum vidi in puero qui tertium
decimū ætatis annum agebat , cū equidē
adolescens etiā dum, cum optimis eius tē
pestatis medicis conuenissem , ad idoneam
ipsius curationem inueniendam , audiui, tū
narrante puero , passionem ipsam à crure
initium capere , mox illhinc recta ascende-
re per femur , & imminentes illi lumbos, ac
per latera ad ceruicem, donec ad caput per-
ueniret, quod cū primum pertingeret, i-
psū haud quaquā sibi cōstare. Interrogā-
tibus autem medicis, quale esset id , quod
ferebatur ad caput, nihil habuit puer quod
responderet. Alius deinde adolescens com-
pos mentis(quippe qui satis poterat & sen-
tire quod fiebat, & alteri enarrare) dicebat
veluti frigidam quandam auram esse id,
quod ascendebat.

Videtur aut nullā epylepsiā posse esse compa-
sionē, aut nullā esse propriam passionē. Nam
aut cōpassionis nomē ita intelligimus, vt quod per
se propriam permanentiam habet, compassio non
sit, atque ita nulla epylepsia erit compassio, cū sit
obstructio propria laborantium particularum: aut
omnem morbum secundarium appellamus hoc lo-
co compassionem, atque ita omnis epylepsia vide-
tur compassio. Non enim potest fieri humoribus in
eadem parte genitis, quæ obstruitur, sed necessario
à parte alia in eam quæ obstruitur impetum faciūt,
aliter enim non repenti fieret, ergo necessario fit
alia parte congerente materiam obstructionis, & a-
lia obstructa. Cæterum animaduertendum hoc lo-
co morbum secundarium dici compassionem, atq;
hinc temporis solum compassionem cerebri dici,
cū illud cum parte alia consentit, nam cū idem
secum, quanquam secundum diuersas partes id fiat,
vt substantia ipsius cerebri mittente in ventriculos
humorem aut flatum, merito cerebrum dicitur pri-
mario patiens. Facta est mentio in diuisione hac
trimembri, ventriculi per se, eo quod frequenter
solet epylepsiæ esse causa. Quanquam potuit etiam
vteri mentio fieri, hic enim mulieres frequentissi-
me facit epylepticas.

Vnde

VNDE ex duobus alterum Pelopi præceptori placuit, aut quod qualitas quædam alteratis per continuationem partibus, aut flatuosa quædã substantia trāsmitteretur. Nec mirandum esse dicebat, tam validã vim esse humori, qui in patienti parte præter naturam genitus fuisset, vt perniciosarum ferarum venenis possit comparari. Quis enim crederet, vel scorpionum, vel phalangiorum ictibus, totum corpus ac tam vehementi mutatione affici; nisi sæpenumero id accidere viderer, præsertim minimam quandam rem feris in ipsũ demittentibus. Quum itaq; phalangium aliquem momordit, quamvis paruum sit animal, existinare tamen debemus, venenum ex ipsius ore in ictum corpus descendisse. Porro marinæ turturis, quemadmodum & terreni scorpionis aculeus, in partem extremam acutissimam illam quidem finitur, vbi nullum foramen est,

est, per quod venenum deiici possit: necesse tamen est, vt excogitemus, substantiam quandam esse, aut flatuosam, aut fluidam, quæ vt mole minima, ita facultate quam maxima est. Etenim cùm nuper iustus quidam esset à scorpione, videor mihi videre, inquit, quod grandine percussus sim, eratq; omnino frigidus, sudore etiã frigido accedente: sed tandẽ debitis adhibitis remediis, non sine negotio seruatus est. Itaque Pelops, nõ impossibile est, inquit, in corpore similem aliquem essentiam generari, non accedente causã extranea, quæ vbi neruosam aliquam partem occupauerit, per continuas partes vsque ad neruorum principium vim suam transmittit, siue id per alterationem, vt ipse dicebat, fiat, siue flatuosa essentia, veluti aura, ad ipsum elata. Sæpenumero enim infigente aculeum scorpione, aut in neruum, aut venam, aut arteriam, manifestè videmus percussos, vehemētissimis infestari

festari accidentibus. Atqui scorpionis aculeus, totam cutem penetrando, ad profundum usque potest peruenire. Phalangiorum verò parvorum ictus solam afficit superficiem. Vnde constat, interdum à sola cute, veneni vim ad totum corpus deferri: quippe tota cutis & continua est & nervosa. Proinde haud quaquam impossibile est, cum ex ista parte, per totam ipsam celeriter distributa sit veneni vis, eam inde eodè rursus contactu, in singulas subiectarum ei partium recipi mox ex illis in alias continuas, atque iterum ex his, quæ patiuntur in aliascumque ad dominantium partium aliquam peruenit, tum mortis periculum homini instare. Ad hanc rem imprimis conferunt vincula superioribus partibus iniecta: id quod in viperarum scorpionumque ictibus, item aspidum quoque, quod propter imminens subitaneæ mortis periculum, magis incredibile est, expertus sum. Etenim cum

Alexan-

Alexandriæ essem, rusticus quidam non lō
 ge ab vrbe, in vno manus digitorum ictus,
 eius radicem apud palmā validissimo vin-
 culo ligauit, accurrēsq; in vrbem, ad fami-
 liarem sibi medicum, totum digitum ab
 ipsa coarticulatione ad post brachiale vsq;
 abscindendum præbuit, sperans inde se ni-
 hil mali passurū. Nec frustratus est sua spe,
 quippe nihil aliud faciens, saluus euasit. Si-
 militer alium noui qui epoto ex viperis me-
 dicamento, rescisso prius digito, à pericu-
 lo liberatus est. Vidi præterea rusticū cuius
 totum digitum vipera momorderat, qui fal-
 cē, quam tunc fortē habebat (erat enim vi-
 nitor) ab vltimo articulo ictam partem re-
 secans, deinde inducta in digito cicatrice,
 nullo sumpto medicamine sanatus est. Sed
 puerum quoque, cuius morbus commitia-
 lis à crure oriri consueuerat, medici, qui tūc
 ad curationem eius conuenerant, sanare spe-
 rabant, si in primis vacuato vniuerso cor-
 pore

pore medicamen ex tapfia , aut sinapi parti adhiberent,ligato interim mēbro, supra eā videlicet partē,quę primaria pafsione laborabat:atque hoc pacto,accessionem reuerti prohibuerūt,quamuis antea quotidie puerum infestare consueuisset. Verūm hæc obiter,atq; ex abundantia dicta sint , ne quis miretur, quo pacto,ab ignobili aliqua parte tantus morbus ortum contrahere possit. Supereſt autem causam veſtigare , quāobrem in huiusmodi per cōſenſum paſſioni bus,comitiales fiant conuulſiones. Nam ne Pelops quidē vllam ad hāc rem attulit probabilem perſuaſionē:nec etiam alius quifquam,cum quo nobis aliqua fuerit consuetudo.Mihi itaq; per huiusmodi cōſenſum, videnti aliquādo laborantem, sine vehemēti cōuulſione cōcidere, simul quod p̄ interualla,breuibus quibusdā motibus quateretur probabile viſum eſt, quemadmodū frequentissimē ſingultū fieri cernimus, patien

te stomacho, ita hanc quoque passionem euenire. Etenim meipsum quoque singultus illic inuadere solet, si piperis aliquando immodicam quantitatem ingesserō. Id quod aliis quibusdā non paucis, quibus scilicet facilis erat oris ventriculi sensus, accidisse meminimus atqui iam supra memoratum est, id non solum medicis, verum etiam vniuersis hominibus stomachū appellari. Itaque cum cecidissent, qui non ex propria cerebri passione sed per consensum cōmitiali morbo laborabant, eos citra perpetuam conuulsionem, veluti palpitante quadam agitatione, per interualla concuti videbam. Proinde existimaui similem aliquem cerebro motum euenire, qualis stomacho, interdū à re quapiam molestato accidere solet: quippe cum à ciborum mole grauatur, aut vbi corruptis cibis mordicus infestatur, tūm singultum pati conspici-
tur. Atque acrem quoque humorem, non singultum modò, verum etiam conuulsionem per
vniuer-

vniversum corpus efficere sæpenuero vidimus: deinde vomitu eiecto eo quod mor dicabat, illico quiescere. Quo minus mirandum est, si neruorum principium huiusmodi motu concutiatur, dum festinat ut à se expellat, quidquid fuerit id quod à parte primū patiente ad ipsum affertur. Ad hunc modum reliqua quoque accidentia omnia, quibus nervi concutiuntur, fieri putaverim. Vbi verò deperdito sensu quis cōciderit, non accidente motu conuulsorio, aut palpitante, id à vehementi frigore ortum trahere censeo. Huius autem generis est & lethargus.

SCHOLIUM.

NVDAM qualitatem non putaverim posse epilepsiam esse causam. Non quod quamplurimæ admirandæ actiones non agantur per simplices alterationes, tum in nostris corporibus, tum extra illa, sed quod nuda qualitas non possit obstruere. Opus ergo est substantia quæ obstruat, ea est aut humor aut flatus, fumusve, quæ quidem in via animalis influxus hærentia consistunt, non gra-

Z 2

in est opus
quæ obstruat
vbi est flatus
cit eat que quæ
tate & multæ
in ikt ad exp
sionem. mōti
932 agitatione
accidenti obstr
uit. ventricul

tia crassitiei, nam per densiores alias substantias penetrat, cum per ipsorum nervorum fibras penetret, sed quia caliginosa sunt, atque splendori non peruia, ut sunt quamplurima extra nos, quae cum sint crassiora splendoris transitum minus impediunt quam alia tenuiora. Sane cristallum, & vitrum, ac laminae corneae densioris substantiae sunt aqua, aut caligine, aut nubecula, tamen lumini sunt magis peruia. Itaque mirum non est solum flatum caliginosum, & substantiam humoris à quo est excitatus referentem, influxum animale, quem irradiationem quandam esse antea diximus impedire.

APOPLEXIAE autem, quod subito eueniat, aut frigidum succum, aut crassum, aut viscidum, qui principes cerebri ventriculos affatim implet, non totius substantiae intemperiem, causam esse manifestum est: veluti lethargi, phrenitidis, insaniae melancholiae, stultitiae, amissae memoriae, sensuum hebetationis, resoluti motus. Porro in omnibus his passionibus, in quarum numero apoplexia quoque continetur, periculi magnitudinem

ex

*affectiones horum
mole humiliter
aliquando morbi?
referant.*

ex respirationis no cumento conicere oportet. Sanè quemadmodum dormientes spirant, quamuis nulla alia fungantur actione, quæ à consilio prodeat, nimirum cum supini iaceant in cubili: ita in soporosis passionibus omnibus, quanquam nec sentiat corpus nec moueatur, tamen sola spiratio seruatur, quæ musculorum thoracem mouentium est opus, huius enim firmam habemus fidem, & demonstratiua lege factam. Quemadmodum & quod musculis etiam omnibus, motus principium ab innatis ipsis neruis accedit. Atqui ex anatomicè didicimus, neruos omnes à cerebro primum sumere initium. Nec simpliciter initium, sed primum dixi, id quod spinalis medullæ gratia orationi adieci.

Quamuis enim permulti ex ea nerui prodire videantur, vim tamen omnem, quam habet, cerebrum ipsi mittit, cumque itaque spirationem vehementer impeditam

difficultérque procedentem videris, non paruum in cerebro morbidam passionem esse coniicere debes, idque in soporiferis morbis, quos nimirum omnes in cerebro fieri manifestum est.

S C H O L I U M.

OMNES soporosas passiones ortum trahere à frigore dictum antea est. Dictum non minus antea est de lethargi, phrenitidis, mania, melancholia, stultitia, amissa memoria, sensuum hebetationis, & resoluti motus essentia. De apoplexia, quodque illius grauitas ex respirationis difficultate cognoscatur, dicetur decimo cap. Illud videtur in hac parte difficile quod Galenus postquam dixerat soporosas passiones à frigore nasci, de apoplexia, ita scripsit. Apoplexia autem (loquitur verò de apoplexia ad differetiam aliarum) quod subito eueniat, aut frigidum succum, aut crassum, aut viscidum, qui cerebri ventriculos affatim implet, non totius substantia intemperiem, causam esse manifestum est, Veluti lethargi, phrenitidis, insaniam, melancholia, stultitia, amissa memoria sensuum hebetationis resoluti motus. His verbis appertè videtur docere Gal. apoplexiam non fieri

prop-

propter substantiæ cerebri intemperiem, vt letargum, phrenitidem & reliquos morbos, sed propter humorem frigidum aut crassum, aut viscidum. Qui tamen sensus videri possit alicui falsus, quandoquidem & lethargus fit propter humorem, non propter solam intemperiem. Nec verò videntur verba illa alium à dicto modo sensum accipere posse. Nam si ita legas, apoplexia non fit propter substantiæ intemperiem, sed propter succum frigidum vel crassum, vel viscidum, vt & lethargus, & phrenitis & cætera, longius aberit à veritate sensus. Nam phrenitis non fit à crasso neque à frigido, nec à viscido humore, amissam memoriam quam tamen illic retulit nihil prohibet à nuda intemperie nasci. Quid ergo nobis significant illa verba? quod modo dico. Quamquam pleraque harum ægritudinum ab humore male afficiente cerebri nascantur, atque in illis ferè omnibus cerebrum ab humoribus & obstruatur, & distemperetur, tamen symptomata apoplexiæ (hoc idem dictum puta de epylepsia) immobilitatem inquam & insensibilitatem repentinam, non fieri ab humore, quia distemperat (hoc enim non facit repente) sed quia obstruit. Lethargi verò & phrenitidis ac reliquorum passionum symptomata, non tam sequi obstructionem quam cerebri intemperantiam. Nimirum somnus lethargi à frigida humoris qualitate fit magis, quàm à crassa substantia, deliria, & pervigilia per phrenitides calefactionem & desiccationem

*immobilitas, &
sensibilitas. Te-
tingit apoplexi-
epilepsia non fit
ab humore quod
tenet distemper-
at, sed quod ob-
struit. & qui*

tionem cerebri consequuntur. Hæc intelligent facillimè qui prius intellexerint quæ de phrenitide, & lethargo paulò antè diximus, ac multò difusiùs, libro quinto controuersiarum, vbi monstrauius illorum morborum essentias, non tam consistere in tumoribus præter naturam, quàm in intemperatijs, cum affluentia humorum. Quare qui hæc nondum capit illa legat.

CAP. VIII.

Relectiuncula.

Hoc cap. est de vertigine, quo Ga. docet vertiginosis omnia videri in girum agi, maxime si in circulum rotentur ipsi, aut alium rotari viderint, siue rotam, aut aquarum vortices. (Nam hæ causæ alios etiam solent ita afficere.) Verùm alij nisi ab his causis aut coeuntibus omnibus, aut valde intensis non patiuntur, vertiginosis vnica illarum atque adeo non admodum intensa satis est ad passionem docet etiam hoc fieri, quia humores, & spiritus in eorum capitibus inordinate mouentur, idq; ab humoribus flatuosis, ac flatibus, atque vertiginosos solere iuuamen recipere à sectione arteriæ post aures, quamquam non omnes vertiginosos iuuat hæc sectio. Docet etiam vertiginem fieri, aut primogenia passione, aut per compassionem cum ventriculo. Scribitq; signa, quibus dignoscuntur.

Is autem



S autem qui scotomaticus, id-
est, ob tenebratius, aut vertigi-
nosus vocatur, ex ipsa appella-
tione qualis sit, constat: quia à parua occa-
sione obtenebrantur, qui sic laborant, adeò
vt interdum cadant maximè, si aliquādo ip-
si in circulum rotantur. Quòd N. aliis in
multis circūrotationibus, euenit illud ipsis
ab vna. Proinde vertiginē innuerunt, siue
alium quempiam, siue rotam, aut id genus
aliud quippiam, aut ipsos quoque in aquis
vertices circumagi viderint. Id verò maxi-
mè, cum vel sub sole estuauerint, vel aliam
ob causam calefacto fuèrint capite. Nam
quòd aliis, cum in circum frequenter ver-
tuntur accidit, hoc ipsis citrà circuitiōnem
euenire videmus. Atqui vbi quis crebro ver-
titur, inæqualem, & turbulentum, & inordi-
natum motum, tum humorum, tum spiri-
tus, in eo fieri in confesso est. Rationi igitur
consonum est, huiusmodi accidentia verti-

ginem patientibus itidem euenire. Quamobrem nonnulli horum, ab arteriarum sectione præsidium petierunt, arterias pone aures ad tantam scilicet altitudinem recantes, vt medius inter duas partes locus cicatrice induceretur. Sed constat, non omnes huius auxilii beneficio fuisse curatos. Etenim aliæ arteriæ, iis maiores ad cerebrum ex ipsius basi per retiformen plexum ascēdunt: per quas huiusmodi passionum fieri rationi consentaneum est, elato per ipsas vaporoso, calidoq; spiritu, atq; implēte cerebrum. Atq; fieri etiam potest, vt inæqualis cerebri intemperies huiusmodi spiritum producat. Igitur hanc passionem ad caput pertinere, ex ipso vertiginosorum sensu, manifestum est. Oritur verò interdum capite primogenia passione laborante, interdum vero, cum ori ventriculi consentit: id quod Archigenes quoque fatetur, libro primo de longarum passionum notitia de hac vertiginosa passione

passione ita scribens. Porro ea bifariam oritur. Aut N. in ipso capite, aut in his partibus, quæ circa præcordia sunt. Quin etiã genera eius distinguere aggreditur. Nam ubi ex primaria capitis passione vertigo dependet, aurium sonos, & capitis dolorem, grauitatemq; præcedere dicit: itẽ olfactus, atque alterius cuiusque sensus inde prodeũtis, oblaesionem. Eos sensus (vt equidem puto) significare volens, qui à capite initium sumunt. Vbi verò ab ore ventriculi oritur, cordis morsionem, nauseamq; præsentiri. Verùm vt iam antea sæpenumero monuimus, licet caput per alterius partis consensum patiatur, genita tamen passio ipsius esse censenda est.

S C H O L I V M.

N V L L V M reticularem plexum in hominibus esse Andreas Vesalius nos primum docuit, deinde nos quoque rem ipsam explorantes, ita habere vt is dicit inuenimus Gale, fortassis aliorum animalium

lium sectione deceptus est. Verum quod ad vertiginem attinet, nihil permutatur, siue sit plexus ille, siue non. Illud vnum est verissimum arteriam illam, quæ ab utroque latere in caput ascendit, in duas secari, aliamque post aures tendere, atque cum vena iugulari distribui, aliam tendere ad capitis basim, illincque in cerebrum ipsum penetrare, per ventriculorum medium. Nec verò puto quanquam vertiginis causa in hac arteria non contineatur, omnino fore inutile illam post aures secare. Nihil enim mirum est, cum communem radicem non longe, à sectionis parte habeant, & omnia in nostro corpore sint conspirabilia aliquid sanguinis in vna illarum contenti per aliam fundi. Non enim ad vertiginem, & cephalicam, & inueteratas alias capitis passiones arteriæ secandæ tantum sunt, sed permittendum etiam est mediocriter fluere. A capite initium sumentes dicuntur illi sensus, qui aguntur per nervos, ortum trahentes ab ipso cerebro, huiusmodi sunt quatuor, olfactus, gustus, auditus, & visus. Quod in ultimis capitis verbis dicitur (verum ut iam antea sepe numero monuimus licet caput per alterius partis consensum patiatur, genita tamen passio ipsius esse censenda est) nihil aliud significatur, quam quod læpius libris primo, & secundo repetitum est, nempe partem cuius actio læditur, licet per consensum patiatur re vera pati.

CAP. IX.

Relectiuncula.

Cap. hoc est de doloribus capitis, distinguit ergo Gal. cephalæam, à cephalagia, & ambas has, ab hemicrania. Deinde hos omnes dolores docet fieri posse interius in memingibus, aut exterius in pericraneo. Atq; vbicumq; fiat, posse ab humore replente, aut mordente, aut à flatu fieri, aut citra hæc omnia, propter acrimoniam sensus partium circa caput, docetq; hæc omnia signis distinguere.



TQV E de ea quoque, quæ cephalæa à medicis nominatur, nemo dubitauerit quin capitis sit morbus. Est N. (vt breuiter quis dixerit) passio hæc, dolor capitis diuturnus, difficulterque solubilis, qui à parua occasione vehementes habet exacerbationes, vt neque strepitum, nec vocem vehementiorem, nec luminis splendorem, nec motum tolerare possit infirmus, sed tranquillitatem obscurūq; cubiculum quærat, idque ob doloris vehementiam.

mentiam. Quippe nonnulli veluti malleo se percuti arbitrantur: alii caput frangi distendique sentiunt. Non paucis ad oculorū quoque radices dolor extenditur. Quin huiusmodi exacerbationum accessiones, veluti in morbo comitiali intermissiones habent, interceditq; tempus, quo perfectè liberati videntur. Igitur constat, quod sicut in cephalalgia, ita in hoc morbo caput facillimè patitur, atque hoc est ipsis commune: verum per cephalicā patientes partes multa redduntur, quàm in cephalalgia, debiliores. Cæterum inter capitis dolores, non nihil discriminis inuenitur: nam sunt nonnulli, quibus caput aptissimum est, ut impleatur, ac vniuersi quoque corporis habitus ad ipsum implendum admodū idoneus. Alii etiam ipsas similes partes aptas habent ut patiantur. Quibus ubi vitioso victu utuntur, accidit ut cephalica arripiantur. Quo minus mirandū est, si horū aliis membranæ cerebrum

cerebrum continentes dolorem patiantur, aliis pericranium. Discrimen autem ab oculorum radicibus sumitur, considerando vtrum veniat ad eas malum, nec ne. Siquidē consentaneum est, vt quibus intra caluariā dispositio est, iis ad oculorum vsque fundamenta dolor extendatur, eo quod & à cerebro, & ab vtraq; membrana, atq; à vasis, quæ in ipsis continentur, veluti germina quædam deducuntur. Sed & eorum quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (solent autem vocari hemicranici) alii extra caluariam, alii in capitis intimis partibus dolorem sentiunt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguit futura per longitudinem ipsius protracta, iuxta quam intra capitis ossa linea medium cerebrum diuidens protenditur, ad quam etiam peruenit anteriorū duorum ventriculorū septū. Porro ea corpora, suapte natura, idonea sunt, vt ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus

porosus, calidusq; spiritus generatur, aut quibus biliosa excrementa cumulantur in ore ventriculi. Atqui spiritus dolores inducunt tensiones: qui idcirco sic vocati sunt, quod extensionis sensum inducunt. Biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine procedentes grauitatis sensum afferunt. Quibus si rubor accedit, atque calor, calidos: sed sine iis non calidos humores significant. Sūt quibus caput assiduè dolet, vbi vel liberalius vinum ingesserint, vel meratius, idque magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, vt styracis, aut cypheos, atque in totum odorata omnia suffita capitis dolorem pariunt, adeo vt nonnulli, ne thuris quidem odorem ferre possint. Nec verò absurdū est, vt quosdam ob sensus exuperantiam, dolor infestet, quemadmodum in ore ventriculi accidit. Sūt N. nonnulli, in quibus id tam exactè sentit, vt neq; acetum, nec sinapi,

napi, nec aliud huiusmodi ferat. Quippe videntur aliqui, vel ructare, vel vomere quædam vsq; adeo vitiosa qualitate infecta, vt nos ne odorem quidẽ sustinere possimus, cum tamẽ ipsi interea nihil ferẽ morfus sentiant. Nihil igitur prohibet quominus in hominum cerebro similes notentur differentiaẽ, vt eosdem odores aliqui impune sustineant perinde, ac si omnino ab ipsis distarent, alii eos sine molestia ferre nõ possint igitur quod omnes huiusmodi passionnes ad caput pertineant, iam manifestum esse videtur.

SCHOLIUM.

QVI volet copiosorem de dignoscendis speciebus dolorum capitis à Gal. audire sermonem, simulque curationis modum, legat caput de cephalæa libro. 2. de compositione medicam. Secundũ locos. Ciphus quid sit vide apud Dioscoridem. cap. 28. libri primi. Ergo vt per hemicraniam dimidia tantum partis dolor fiat, nunc dextræ, nunc sinistra, non tam est causa futura longa quam sagittalem
& talem

lem vocant (quanquàm hæc quoque aliquid facit) quàm illa linea quæ est intra capitis ossa secundum cerebri longitudinem protracta totum cerebrum diuidens in duas partes, in hac linea fit sinus oblongus duræ meningis, qui factus est quasi ex membrana plicata, estq; pro arteria, & pro vena, peruenit per partem anteriorem vsque ad os cribrosum. Per posteriora penetrat profundè inter cerebrũ, & cerebellum. Iam verò vndeque penetrat profundè ea membrana vsque ad partem cerebri, quæ quia duos ventriculos priores diuidit, interseptum appellatur, quo fit vt substantia ipsa cerebri tota ferè ab hac membrana in duas partes dextram, & sinistram secetur in quas partes ab oblongo illo membranæ sinu æqualiter venę distribuuntur. Non ergo mirum est cum tam insignis diuisio sit, causam doloris modo in partem dextram, modo in sinistram incumbere. Sutura sagitalis etiã facit aliquid, verùm hæc non secat os occipitis, neque os frontis, nisi in tenebris, ac recens natis, & alijs perquam paucis.

C A P. X,

Relectiuncula.

Per apoplexiam in cerebro esse obstructionem, eaq; maximam, docet hoc cap. Gal. quia omnia membra ita affectis priuantur sensu, & motu. Quod non fieret nisi ipsa met facultatis prima sedes laboraret. Nam contingit vnicum,

nicum, aut duo, aut plura membra resolui, vt propria alicui, aut communis aliquibus, hisq; duobus, aut pluribus rariis patitur. Tractat hunc locum Ga. longiuscule, narratq; de hac re aliquot hystorias, docet etiam grauitatem, aut leuitatem apoplexiæ ex læsione respirationis maiori, aut minori diuidi eare.



T verò ægritudo resolutionis, & conuulsionum totius corporis (quo in genere tetanus est) non similiter cognosci potest sensu, sed opus est ratione nos ducente. Itaque si aliquândo per totum corpus, neruorum actio vitiosa red datur, ipsorum principium pati constat. Id verò ex sola anatomice cognosci potest.

Quum igitur omnes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint apoplexia huiusmodi passio appellatur. Vbi verò alteri lateri, aut dextro, aut sinistro, id accidit resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit, interdum dextræ interdum sinistræ. Quòd si in artuum aliquo idem euenerit, eiusdem membri resolutio
& 2 esse

esse dicitur. Nam & tota manus, & totum crus interdum resoluitur, atq; solus in crure pes, & quæ sub genu sunt. Sic etiam de tota manu similiter proportionem dicendum est. Cæterum ex anatomice didicimus, quod omnes animantis partes sub ceruice posite, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, neruos habent qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata medulla. Atqui sæpenumero audistis, eam spinalem vocari medullam, addita scilicet medullæ appellatione, interdum verò sine additione simpliciter spinalem nuncupari. Vidistis etiam in corporis dissectione, neruos, qui thoracem mouent ex ea spinæ medullæ parte, quæ in ceruice est, ortum deducere. Ipsa verò ex transuerso incisa, si tota fuerit dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt, corporis partes, sensu motuque priuari, vt potest suscipiente spinali medulla à cerebro, vim tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio.

Præterea

Præterea in anatomice vidistis, vbi per trāsuerſas ſpinalis medullæ incisiones, ad medium vſqꝫ ſecundum longitudinem ſecaretur, non omnes ſuppoſitas corporis partes ſed eas duntaxat, quæ è regione ſectionis erant. Reſolutas dextras quidem, dextræ ſpinæ medullæ parte diſſectâ: ſiniſtras verò, vbi reliqua pars eſſet inciſa. Itaque manifeſtum eſt, quòd circa primum ſpinalis medullæ proceſſum, facta aliqua paſſione, per quam cerebri facultas quo minus ad ipſam perueniat, prohibetur, omnia inferiora mēbra, dempta facie, ſenſu, motuqꝫ priuabuntur. Vbi verò media eius proceſſus pars fuerit paſſa, non omnes inferiores partes reſoluentur, ſed vel ſiniſtræ dūtaxat vel dextræ. Videntur autem huiuſmodi reſolutionum aliqua, faciem quoque infeſtare, ſed tum reſolutum latus ad alteram faciei partem trahitur. Quūque ex anatomice didiceris neruos qui per faciei partes ſparſi ſunt, à cere-

& ; bro

rebroy demitti, ſi earum aliqua ſimul cum toto corpore reſoluta eſt, haudquaquam vos latere debet, reſolutionis paſſionem in ipſo cerebro conſiſtere: vbi verò illæſæ permaſerint, ſpinalis medullæ initium pati ſciendum eſt. Accidit verò nonnullis, vt faciei partes duntaxat patiantur, quemadmodum & reliquarum quoque partium interdum aliquæ, vt lingua, oculus, mandibula, labium. Etenim non omnibus ab vno loco principium influit, vt pote quæ ex diuerſis cerebri partibus neruos ſuſcipiunt: id quod in anatomicè haud obſcure conſpicitur. Igitur apoplexia omnibus animalibus actionibus noxam inferens, cerebrum pati manifeſte declarat.

SCHOLIUM.

NIHIL eſt quod ad eò referat ſciri ad capitis huius plenam enarrationem, quàm diſſectionem neruorum de qua breuiter, quantum ſcilicet inſtitutum

stitutum huius libelli,ferre potuit,diximus,in scho-
lijs sexti.cap.libri primi.Illa ergo resume,si non vi-
dentur esse satis, lege quartum librum, de humani
corporis fabrica Andreae Vesalij.

DISCERNITVR autē passionis
magnitudo ex noxæ, quam spiratio-
ni infert,vehementia.Quum N.natu-
ralem ordinem plurimum egreditur, ma-
gnam: cū verò paulum impedimēti est,
paruam in cerebro noxam esse coniicere o-
portet.Sane omnium pessima spiratio pu-
tanda est,quæ & intermittitur,& magna cū
volentia trahitur. Quippe mori contingit
apoplecticos,ob id quod spirare non pos-
sunt. Nam homo qui corporis partes mo-
uere nequit,ad vitæ quidem functiones cen-
setur inutilis,quamuis huic subitæ mortis
periculum haudquaquam immineat. Itaq;
vidimus quendam, qui reliquis partibus
omnibus resolutis, nullam, quæ ad faciei
partes,pertineret actionem amisit, serua-
& 4 batur

batur autem in ipso respiratio proculdubio. Quomodo enim viuere posset diutius ipsa deperdita? In hoc, primario pati collegimus illam spinalis medullæ partem, quæ paulò inferior est processu neruorum ad septum transversum tendentium. Manifestum autem quod & vrinas, & excrementa præter voluntatem eiiciebat. Insuper vidimus alium cui propter casum omnes inferiores partes, demptis manibus resolutæ essent. Igitur quemadmodum vbi vniuersæ corporis partes, quæ sub facie constitutæ sunt, resoluuntur, faciei partibus illæsis, passionem in spinalis medullæ initio esse certum est: ad eundem modum, si toti corpori conuulsio acciderit, faciei partibus omnino seruatis, eundem spinæ medullæ locum pati declarat. Quòd si hæc quoque patiantur, cerebro noxã iam illatã esse ostēditur. Vbi verò pars aliqua conuulsa est, neruū qui eius motioni deputatus est,

aut

aut musciculum pati necesse est. Igitur si ex anatomice neruorum ad singulas partes venientium principia didiceris, perquam facile earum & sensum, & motum deperditum curabis. Verum hæc indeterminata relicta sunt & Herophilo & Eudemo, qui primi post Hippocratem neruorum anatomicen accuratè scribentes, non mediocrem medicis dubitandi occasionem prebuerunt: quo pacto per neruorum resolutionem interdum sensus dūtaxat, interdum voluntarius motus, nonnunquam ambo simul pereant. Itaq; neruorum resolutio potissimū dicitur vbi motus deperditus est. Vbi verò partium aliquarum sensus perit, eam partē sensus expertem esse, resolutam verò non adeo dicere consuevimus. Quamquā sunt nonnulli, qui hanc passionem, sensus resolutionem vocitant. Nos verò semper iubemus vt cuiq; nominibus pro arbitrio vti liceat. Etenim hoc nobis esto propositum,

& 5 vt

vt patientem scilicet sedem, simulque passionem eius inueniamus. Nisi enim hæc accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus vel sensibus, vel motus vitiatum est, rectè curabimus. Sanè Pausanias Sirus sophista, cum Romam aliquando venisset, secundum duos minores sinistrae manus digitos, atque medii partem dimidiam, sensum imprimis quidem difficilem habebat, postea male curantibus medicis, sensum omnino amisit. Quibus equidem cognitis, omnia, quæ præcesserunt, inuestigavi, atque ipsum, cum per viam duceretur, vetriculo excidisse, atque in dorsi initio læsum, mox partem læsam, breui quidem curatam, sed auctum in digitis sensus vitiū audiui. Igitur remedia, quæ illi digitis adaptauerant, læsæ parti adhibere iussi, atque sic vir ille celeriter sanitati restitutus est. Etenim id quod imprimis scire oportet, quod videlicet nervi per vniuersæ manus cutē dispersi, quibus

bus sentiendi ad ipsam facultas defertur, proprias quasdam habeant radices, quodque neruorum musculos mouentium sunt alia, medici ignorant. Verum latius, quam proposueramus, iam nostra expatiata est oratio: proinde quiescere eam decet. Quippe nostra intentio erat, ut hoc commentario omnes passionem, quæ caput, maxime verò cerebrum infestare consueuerunt, inueniremus, at quia ab ipso nerui originem ducunt per consequentiam, ad neruorum usque passionem sermo peruenit: cui etiam finem imponendo, passionem, quæ reliquis capitis partibus accidere solent scribere aggrediamur, si prius hoc tantillum superioribus addiderimus.

SCHOLIUM.

NULLA in ægritudine earum, de quibus hactenus disputatum est, tam curauit Gal. vehementem à non vehemente distinguendam, quam in apoplexia, quia nulla alia tantum intererat distinguere. Nimirum ut in aphor. 42. sectionis secundæ

dæ dicitur ab Hippo. Apoplexiam fortem soluere
 est impossibile, debilem non facile, refert ergo
 quamplurimum eas dignoscere, ne aut in forti cu-
 randa operam perdamus, aut debilem, vt incurabi-
 lem dimittamus. Cùm verò significari possit apo-
 plexiæ grauitas, grauitate aliorum accidentium, in-
 sensibilitatis inquam, & immobilitatis, nullo tamen
 melius quam noxæ circa respirationem contingen-
 tis magnitudine. Gradus vehementiæ distinguit G.
 in commentario illius aphoristicæ sententiæ, dicēs,
 si respiratio prohibeatur, maxima est, & acutissima
 hæc apoplexia, Quicunque verò respirant quidem
 sed magna cum vi, fortis adest istis apoplexia, for-
 tis autem adest & illis, sed minus qui neque inten-
 tam neque violentam inequalem tamen ac inor-
 dinatam, ac præterea intermitentem habent respi-
 rationem. Sicut in quibus aliquem seruat ordinem,
 debilior existit. His verbis Gal. docuit quantæ re-
 spirationis noxæ sufficiant, vt apoplexia meritò
 grauis dici possit. Verùm occurrit hoc loco qua-
 stio contemplatione digna, de causa, qua cum om-
 nes alij voluntarij motus intercipientur, respiratio
 sola seruetur. Respondit Gal. paulò antè ad finem
 septimi capi. (nisi sumus obliui) sane quemadmodum
 dormientes spirant, etsi nulla alia fungantur actio-
 ne quæ à consilio prodeat. Verùm hæc comparatio
 nihil declarat. Rogo enim hoc idem de somno, cur
 dormientes respirant, si respiratio est actio volun-
 taria? Respirationem esse voluntariam actionem,
 monstratum

mythio-

monstratum à nobis est lib. tertio controuersiarum cap. secundo. Verùm monstratum nihilominus etiã est libr. quarto eusdem operis cap. quarto. per somnum non accidere membris priuationem integram sensus, & motus, sed cessationem quandam non integram, quandoquidem multæ voluntariæ actiones per somnum etiam agantur, & multa sentiantur. Hoc idem intellige dictum de apoplexia. Quamquam apoplexia tanto magis accedit ad priuationem integram quam somnus, quanto à maiori obstructione pendet, & quanto difficilius est excitabilis, tamen integra priuatio nondum est ea apoplexia, cum qua seruetur respiratio. Quum ergo hoc ita habeat non est mirum aliquem motum voluntarium agi per somnum, & per apoplexiam, nimirum influit interim, dum uiuit animal, facultas aliqua, etsi ea perexigua. Sed cur hæc actio quam spirationem dicimus agatur, magis quam alia, cum nerui illi ministrantes obstructi sint, non minus quam qui reliquis actionibus ministrant, nondum diximus. Gale. nuper citato commentario ita inquit, videtur autem hoc fieri propter respirationis necessitatem, quæ neruorum vim excitat ad operationem. Quæ verba significant facultatem apponere conatus maximos ad hanc actionem gratia necessitatis maximè. Quo fit ut quamquam ad hanc actionem facultas influat per id tempus exigua, tamen defectum suplen-
te conatu, actio illa obeatur, alijs voluntarijs interceptis. (Verùm quandoquidem non apponuntur illi
conatus

ali psych

conatus à consilio, aut deliberatione, mente ita cō-
 filiante, hæc actio agatur, illę cessent, oportet vt cau-
 sa alicuius irritationis in respirationis instrumētis
 cōtingētis, maioris quā in aliarū actionū, fiat. Quod
 Gal. intelligens addidit necessitas maior quæ in-
 strumenta respirationis excitat ad actionem. Itaq;
 cordis feruor totiusq; thoracis ardor instigat tho-
 racem, multo magis quam aliarum actionū instru-
 menta instigantur. Proinde non mirum thoracem
 laborare, alias partes otiari, vt aliarum partium
 quæcunque cū irritatur, moueri solet, quietis a-
 lijs. Vt si dormientis hominis digitum vnum pun-
 gis, videbis illum contrahi alijs incontractis. Illud
 vnum superest scitu dignum. Videtur falsum quod
 de irritatione partium respirationis diximus. Nam
 quæ dormientium corporum partibus molestiā in-
 ferunt, eadem irritatione solent dormientes excita-
 re. Vt si digitum dormientis hominis vellices, pri-
 mum facies vt refugiat, deinde etiam excitabis.
 Ergo si tanta in partibus spirantibus irritatio acci-
 deret, eadem irritatione homo excitaretur. Verū
 oportet hic aliud obseruari, quod circa dormiētes
 accidit. Ab irritationibus consuetis minus pertur-
 batur animus, eoq; minus excitantur homines, vt
 videas hominem mollissimum, pulicis morfu exci-
 tari: rusticum tamen, aut illum etiam hominem, si
 multis diebus in loco sordido dormire feceris, totū
 corpus mouere & versare ad excutiendum pulices,
 tamen non excitari. Itaque consueta irritatio non
 excitat

ira dubitatio

excitat, cùm ergo tam consueta ac naturalis nobis sit ea irritatio quæ à necessitate respirationis contingit, non est mirum sufficere eam irritationem ad permouendum thoracem, permittere tamen animæ quiescere. Si causam qua cõsuetam minus perturbant insuetis scire cupis, lege capite quinto libri 8. controuersiarum, cui titulus est de consuetudine & natura. Illud velim in præsentia animaduertas Galenum non negare posse per apoplexiam hominem viuere sine respiratione, sed posse diutius viuere. Experimur enim quotidie, cùm mulieres vteri præfocatione laborantes, tùm etiam apopleticos, sine respiratione (vanum enim sit respirationem fingere, quam nulla ratione sentio) viuere, plus etiam quam quatuor horas. Quod cùm sit, subit dubitatio consideratione non indigna, cur apoplexia laborantes viuere possint sine respiratione tanto tempore, cum ij qui laqueo suspèduntur, nec quartâ horæ partem expectare videantur? Potissimum cum Gale. dicat hoc loco mori contingit apoplecticos ob id quod spirare nō possint, quo eodem mortis genere constat, mori eos qui suspenduntur. Verũ (quantum ego intelligo) causa huius euentus est, quòd apoplexia non minus quam vteri præfocatio est affectio frigida, per quam quia minima est aëris necessitas, nihil mirum est si sola transpiratione aliquantisper seruetur anima. At verò ijs qui suspenduntur nihil aliud accidit, quam quod priuentur respiratione, eadem de causa, si cui per anginam, quæ non est frigida

*alia =**alia*

gida passio, spiritus omnino intercipitur, statim ac intercipitur morietur. Nec verò hæc quæ diximus quidquā afferunt rationi dissonum. Non enim tantum per apoplexiā frigus in capitis partibus fit (quāquamneque id esset minimū, ad tolerantiam apneæ cum cerebrum propriam respirationem habeat) sed etiam vt à Gal. dicitur commentario. vigesimo septimo quarti de ratione victus in acutis, in corde, hepate, & vena caua, quæ hæc coniungit viscera: Nimirum à magno humorum impetu per naturales alueolos facto fit interclusio spirituum, qui naturaliter sunt impetum facientes, atque hac causa sanguis congelatur. Hic accidit (quod sæpe experimur) Vt etiam si secetur his vena, sanguis nullus profluat. Nihil ergo mirum in tanta refrigeratione seruari posse animal aliquot horas sine respiratione. Ad reliqua omnia quæ hoc capite dicuntur nihil opus est scholijs, sed satis erit ea relegere, quæ sexto capite primi libri diximus. Hic non est opus pluribus.

Cap.



Relectiuncula.

Agit de lésionibus virtutis odorandi, docetq; eam lædi aut per intemperiem anteriorem cerebri ventriculorum, aut obturationem ossium colatoriorum, eo quod odoratorum sensus in ventriculis cerebri agatur, atque ita læsio contingat, vel ipso instrumento proprio intemperato, aut via, quæ ad ipsum est interclusa.



VBI olfaciendi vis læditur, nõ eorum meatuum, qui in naribus cõspiciuntur, sed vel anteriorũ cerebri ventriculorũ, cùm intemperantiã quandam potiuntur, noxa est: aut meatuũ, qui in colatoriis ossibus sunt, cùm obstruũtur, siquidem odoratorum sensus in prioribus cerebri sinibus perficitur, elatis ad ipsos percoli foramina à vaporibus, quẽadmodum in lib. de instrumẽto odoratus demõstratum est.

SCHOLIUM.

NISI Ga. putaret proprium odoratus instrumẽtum esse in ventriculis anterioribus cerebri,

A. finem

finem iam imposuisset huic tertio lib. & caput hoc ultimum in 4. librum reseruasset, cum hic à principio fuerit dicatus passionibus cerebri, & quartus passionibus partium circa faciem. Atqui ego ita fecissem, si meum hoc esset opus, quandoquidem hac in parte censeo Aristotelis & Platonis sententiam esse veriorē, agiq; olfactum circa internā nasi pelliculam, ac fortassis etiā nonnihil in tota regione respirationis. Huius sententiæ confirmationem scripsimus lib. 2. cōtro. quæ si vera est, ut mihi videor aperte docuisse, constat, non omnes causas læsi olfactus Gale. hoc loco enumerauisse, sed reliquisse intemperie propriam partiū circa nasum, quæ lætio, vel sola est per primariam passionem, id est per instrumenti primarium morbum (nec verò dubium est si quis partes internas sui nasi medicamine aliquo vehementer refrigeret, quin is odorandi potentiam sit amissurus) nam cum ossa colatoria obturantur, priuamur olfactu, non quod vapores intro non penetrent, sed quia aër non penetrat, eoq; respiratio impeditur, quare cum animalia respiratione prædita non olfaciant sine respiratione, ut pote per respirationē veluti suctu quodam assumētia tenues vapores in intimos tunicæ internæ nasi poros, sit ut priuētur odorandi vi intercæpta respiratione, ea potissimū quæ in cerebro agitur. Nā monstratū id à Ga. euidenter est, esse respirationē quandā cerebro propriā. Sed de hac re dictū est illo in loco quantū ad plenā intelligentiā est satis, quare minus opus est, ut hic immoremur.

Liber

Liber quartus.

DE LOCIS PATIENTIBUS.

CAP. I.

Relectiuncula.

Quum duobus primis libris explicatum sit, quara-
tione patientes sedes inuestigare oporteat, & tertio libro
capta sit exercitatio in morbis in cerebro habentibus
partes patientes. In hoc quarto libro inquit Gale. agen-
dum sibi esse de morbis faciei, atque primum omnium de
morbis oculorum toto hoc capite differit, non quidem de
omnibus, sed ijs tantum qui latentes habent sedes, cuiusmo-
di obstructio in nervo optico, convulsio aut paralisys ali-
cuius musculi mouentium oculum, qui septem sunt nume-
ro, in quos omnes inferuntur nervi secundæ cōiugationis:
aut distortio pupillæ ad aliquem angulorū, aut ad super-
nam infernamve partem, aut obliquè facta, quas omnes
duplicatam rerum omnium visionem facere dicit, præter
eam quæ ad aliquem angulorum fit. Huiusmodi etiam est
suffusio per consensum ventriculi aut cerebri, quas suffu-
sionum species exemplis illustrat, & signis quampluri-
mis docet distinguere.



QUA via & ratione patientes
 sedes scrutari conueniat, duo
 bus primis libris certis quarū
 dam partium exemplis satis
 explicauimus. Quoniam ve-
 rò, vt iam diximus atque in aliis libris de-
 monstrauius, circa res particulares exerci-
 tari oportet eū, qui singula artis opera, quæ
 vniuersali via & ratione didicit, tuto, & cele-
 riter perficere voluerit, opere precium me-
 facturum mihi videre videor, si rationales
 quasdam notiones, omnium corporis par-
 ticularum, quæ sensum effugiunt, cū quo-
 modolibet patiūtur, præscripserat, sumpto
 à capite initio. Igitur de memoria & intelli-
 gentia vitiata, atq; reliquis animæ functio-
 nibus, quas principes nominare consueui-
 mus in huius commentationis lib. 3. iam di-
 ximus, simul in non paucis passionum ge-
 neribus, via, & ratione inducto exercitatio-
 nis modo. Nam & de phreniticorum defi-
 pientia

disipientia & de ea, quæ citra febrē accidit, quam maniam nominant, præterea de lethargo, sopore, morbo comitiali, melancholia, vertigine, cephalea, hemicranea, apoplexia & similibus, ibi iam dictum est.

Non est opus scholijs in primam hanc particulam,

At in presenti libro qui huius commentarii quartus est, de faciei partibus, quæ intrinsecus patiuntur, sermonem faciemus ab oculis incipiendo. Nam modo ipsorum sensus, modo motus, ac nonnunquam tam sensus quam motus resolvitur: idque interdum in altero, interdum in utroque accidit oculo. Nonnunquam solius palpebræ, nonnunquam etiam eius partis, quam propriè oculum vocamus, vel sensus, vel motus læditur. Quum igitur nullo in oculis malo apparente cernendi sensus deperditus est, demissus à cerebro nervus causam, ut vel

A 3

inflamma-

inflammationem, vel duritiem in se continet, aut ex humorũ defluxu, aut aliter quomolibet meatus ipsius duratur. Et hæc quidem, vt organicę parti illi accidere necesse est. Quæ verò ei vt similari, adueniunt, octo intemperantiæ generibus continentur. Præterea aliud quoq; ipsorum vitium est, cùm vel nihil omnino, vel exiguum admodũ, splendor spiritus, à principio, quod in cerebro consistere putandum est, ad eos descendit. Si verò vteruis oculorum, motũ duntaxat amiserit, secundæ coniugationis neruum, qui à cerebro oritur, molestari necesse est, ab aliqua videlicet earum passionum quas alteri neruo, qui à prima coniugatione nascitur, nuper accidere diximus. Quoniam verò, vt ex anatomice didicimus, musculi oculum mouentes, senario numero constant, ac præter eos, alii quoque sunt, qui descendentes in ipsum, meatus radicem amplectuntur. (quippe disse-

ctores

ctores ita nominare consueuerunt , primæ coniugationis neruum , eò quòd soli manifestum sit foramen) accidit interim, quanuis ipse haudquaquam patiatur , vt musculorum aliquis, aut in propria essentia , aut in neruo ad ipsum descendente, ab aliqua nuper dictarum passionum infestetur. Siquidem singulis horum musculorum pars quædam nerui à secunda coniugatione orti transmittitur, haud secus , quàm iis quoque musculis, qui meatum ipsum comprehendunt, siue ii duo, siue tres, siue vnus duntaxat , dicendus sit. Id enim ad præsentia non refert , modo nouerimus horum musculorum munus esse , vt & trahant oculum , & firment, ne molli ille neruus quem & visificum , & meatum nominant , vlllo pacto in processu diuertatur. Quum itaque sex inueniantur oculum mouentes muscoli, si is quidem , qui ipsum retrahere solet, patia-

tur, totus oculus delapsus videbitur. Si verò is, qui ipsum detrahare potest, retractus apparebit. Ita etiam si minoris anguli musculus vitatur, ad maiorem: si verò hic latus est, ad illum oculus deflectitur. At si volentium musculorum quispian resoluitur, obliqua erit totius oculi conuersio. Cæterum cum alii præterea sint muscoli mollem neruum illum circundantes, scire licet ipsis resolutis totum oculum procidere, atque à sua sede moueri. Et vident horum plurimi sine læsione, neruo molli exporrecto quidem sensim, patiente autem nihil qui ubi quomodo patitur, visum efficit obscuriorem. Vbi verò adhuc magis malum ingrauescit, constat eos, qui sic patiuntur, nihil omnino cernere posse.

Scholium.

SCHOLIUM.

VBI nos legimus splendidi spiritus legit Copus
 visifici spiritus, non sine magna corruptione
 loci nam grace babetur, ἀνοσμία πνεύμα, id est
 splendens spiritus, Adde monstratum à nobis esse. 2.
 libro controuersiarum. cap. 12. non esse alios spiri-
 tus visui, alios auditui, alios gustatui feruientes, ali-
 osque ad oculos, alios ad aures, alios ad linguā à ce-
 rebro mitti, sed eosdē animales spiritus eosq̃ splēdi-
 dos in omnia hęc instrumēta deferre vim sentiēdi.
 Itaq̃ nulli sunt spirit⁹ visifici. Ibidē vbi dicit, extra
 hęc autē quādo nihil prorsus, vel omnino parū mit-
 titur spiritus splēdidi ab eo principio, q̃ in cerebro
 est, videbitur fortasse nullū nouū malū dici, sed rur-
 sum repeti, q̃ dixerat prius. Nā cū obstructus est ner-
 uus, nō accipit spiritus à cerebro oculus. Sed attēde
 alium morbū dici, scilicet cū propter malū, aut lan-
 guorem facultatis animalis in cerebro non poten-
 tis mittere satis multos spiritus ad videndum, aut
 parum, aut nihil videtur. Hac ratione pueruli recēs
 nati non vident, & alij quibus per morbos facultas
 languet. Verum hic non est oculi morbus nisi per
 consensum, sed cerebri. Aliud est spiritus non reci-
 pi oculis, aliud non mitti à cerebro. Quum obstru-
 cti nerui sunt, mittuntur à cerebro, sed non recipiū-
 tur oculis quia non penetrant, verū cum extreme
 debilis est animalis vis non mittuntur. Rationem di-
 gnoscendi, an obstructi sint nerui an debilis vis,

A 5

non

non scripsit Gal. arbitror, quia est facilima digno-
tio ex reliquis. Nam debilitas maxima facultatis a-
lijs multis signis fiet manifesta, quæ vbi non ade-
runt, si nullo malo apparente in oculis, non vident
obstructio est in causa. Ergo nervos primæ coniu-
gationis appellat poros, dicitque ita ab alijs appellari
esse solitos quod hi soli omnium nervorū caui sint,
vt venæ, & arteriæ. Diximus paulò supra, non ita
apparere in dissectionibus. Septem esse muscu-
los oculorum docuit etiam libello de dissectione
musculorum. Vbi non minus quàm hic dubitat, an
vnicus sit musculus obuoluens neruum opticum,
an duo an plures. Certè is à plerisque habetur uni-
cus, nec videtur esse plures. Cæterum is musculus
videri possit, non tam esse musculus, quàm ligamē-
tum quoddam carneum. Non N videtur, tam habe-
re vsum musculi, quàm ligamenti. Nam non cōtine-
tur oculus ne excidat per voluntatem, sed veluti af-
fixus est. Si N. per voluntatem contineretur, esset
nobis liberum exere oculus, feriente scilicet il-
lo musculo, vt laxamus vesicam, & intro trahere il-
lo laborante, sed neutrum videmur posse facere,
ergo aut est alius musculi illius vsum, aut is non est
musculus, sed erit sy sarcosis quædā, qua oculus ner-
uo affixetur Gal. hoc loco alium vsum innuit præ-
ter oculi retractionem, scilicet firmare neruum ip-
sum, ne in pcessu diuertatur, aut torqueatur, sed re-
ctà meet. Hoc non possumus experiri an liberum
sit, est fortasse. Libello de motu musculorum docet

cet Galenus, vsum huius musculi esse, vt infixi oculi recti, & inconniuenter intueantur remquampiam etiam minutulam. Verum ad hanc rem quatuor musculi mouentes oculos præter contorquentes sunt satis cum simul operantur. Itaque haud satis scio an septimus præstet vsum musculi. Nam nihil sentio ipsum liberè facere, atque secundum voluntatem. Brachium N. quia per voluntatem agentibus musculis erigitur, potest decidere per voluntatem laxatis, feriantibusque musculis, perinde ac decidit resolutionem patienti. Tamen oculus nunquam erumpit, nisi cum ligamenta illa sunt per morbum laxata. Illud constat conuersionem oculi in girum non solum agi musculis obliquis, sed simul laborantibus quatuor rectis. Nec solum hoc sed etiã non tam agi obliquis quam rectis non simul, sed successiuis motibus, atque ordine quodam illum trahentibus. Nam obliqui quos natura oculis dedit nõ sunt satis ad integrã oculi cõuersionẽ, recti verò videntur sine obliquis posse esse satis. Nam obliquos scimus duos esse, in oculis boum ab anguli maioris regione ad angulum minorem alterum per supernam, alterum per infernam partem quales Gal. describit libro de dissectione musculorum, in homine duos, alium à regione anguli maiores ad medium oculi per superna, alterum à regione anguli minoris ad medium oculi per inferna. Neutra harum cõpositionum est satis ad omnem oculi conuersionẽ, ac multominus ea quam in hominibus inuenimus.

Nam

Nā vt pupilla voluatur ab angulo minori ad maiorem per superna facit primus, vt à maiori ad minorem per interna secundus. Sed vt à maiori ad minorem per superna, aut à minori ad maiorem per inferna, qui musculi faciēt? certē obliqui non possint nisi duos alios nam modo effinxerit dictis contrarios, faciunt ergo recti successiuus illis motibus. Ergo obliqui non videntur esse satis ad totam oculi conuersionem. At verò recti quatuor videntur esse satis, nam si primū contrahatur supernus, secundo internus (internum voco eum qui est ad angulum maiorem, cōtrarium, externum) tertio infernus, ultimo externus, fit integra conuulsio incipiens ab angulo minori ad maiorem per inferna: si contrario ordine contrahantur, contra fiet. Certē ego nullis musculis minori cum malo potuisse carere animal putauerim, quam duobus illis dicta de causa, non tamen proinde eos statim esse inutiles, sed iuuare alios ad conuersionem. Quo fit vt non tātum totus oculus possit habere obliquam conuersionem, resolutis aut conuulso neruo aliquo obliquo, sed etiam resolutis conuulsisve aliorum duobus, simul vt superno, & externo, aut inferno, & interno, aut superno, & interno, aut inferno & externo, aut fibris aliquibus amborum.

Et

ET in conuerſionibus oculorum ea quæ ad aliquem angulum fit concurſio conſeruat naturalem cernendi actionem, ea autem quæ ſuſum, aut deorſum fit, & diſtorſiones duplicata videri faciunt omnia quæ cernuntur.

S C H O L I V M.

FACTA oculi ad alterum angulorum peruerſione omnino manere integrâ viſionem falſum eſt apertè. Nam licet tibi experiri, ſi tu tibi oculum alterum digito detorqueas, rem duplicem videri, atque perinde accidere, ac ſi ex re quæ videbatur res altera prodeat, rem verò quæ prodijt nonnunquam apparere ſuperiorem priori re, aut inferiorem, nonnunquam ad dextrum, aut ſiniſtrum latus inclinantem, nonnunquam ſuperiorem ſimul, aut inferiorem, & ad alterum latus inclinantem, hæcquæ accidere pro modo quo torquetur oculus, ſi ad ſuperiora torquetur, fieri imaginem rei ſuperiorem, ſi ad inferiora inferiorem, ſi oculus dexter ab altero abducatur, id eſt, vertatur ad angulum externum. (Nam oculos ad ſeſe adduci non vitiat viſionem) dextram, ſi ſiniſter, ſiniſtram: ſi ſimul oculus ad ſuperiora expectet & abducatur, fieri ſuperiorem, & dextram, aut ſiniſtram. Perinde ergo poterit

poterit accidere morbo abducente oculum , vt
 accidere experimur nobis ipsis digito abducenti-
 bus. Nec verò est quod non possit per morbum ab-
 duci, vt potest sursum, aut deorsum trahi. Quid N.
 prohibet musculum eum , qui ad externum angulū
 rectus venit, conuulsionem pati? Verū est , (quod
 Galenum fortasse decepit). Oculum minus ac diffi-
 cilius posse ad latera torqueri , quā sursum , aut
 deorsum . Cuius causam statim aperiā. Verū id fie-
 ri posse ego ipse expertus saepe sum. Sed quando gra-
 uissimo authori contradicimus, æquum est , non id
 leuiter facere , neque aliter quā rationibus ipsis
 perpenſis. Non N. arbitror ratio ijs quæ experimen-
to sentiuntur aduersabitur. Gal. 10. libro de vsu par-
 tium inquit, nervos opticos vniri antequam c cra-
 neo erumpant, non quidem sese transuerſe penetrā-
 tes, sed ita vt separati rursus, qui dexter exort⁹ est
 tēdat in dextrum , qui sinister in sinistrum oculum.
 Hoc vinculum factum dicit , vt ex ipsis nervis cum
 pupillis oculorum triāgulus fiat , quo ita pupillæ in
 eodem plano sint. (Est N. secunda propositio, vnde-
 cimi libri apud Euclidem, omnem triangulum habe-
 re latera in eodem plano). Nam inquit, si in eodem
 plano oculi non sint , sed alter superior, fore vt res
 videantur duplices, eo quòd, viderentur ac si essent
 in duobus locis . Nam res videntur circa res alias,
 / quas attingunt radij visorij præter labentes , itaq;
 videntur hīc, aut illic, quòd circa has , aut circa il-
 las res videantur. Quo fit, vt duo homines nulla ra-
 tione

tionem possint eodem in loco rem eandem videre.

Nam vident circa diuersa, quia ex diuersis oculis in eandem rem venientes radij in diuersas res incidunt, cum rem præterlabuntur, tendunt N. recta.

Addit Gal. cum oculus intuetur rem aliquam, venire radium ab oculi centro ad rei centrum, aliosque innumeros ab eodem oculi centro ad rei peripheriam, hosque esse æque distantes à primo illo. Ergo cum oculi sunt in eodem plano ab vtriusque centro venire radios illos ad cætrum ipsum rei, ita vt ex duobus illis radijs & linea ducta ab vna pupilla ad alteram fiat triangulus. Ergo visiones. (Ita N. vocat lineas peripheriæ) incidere simul in eandem partem rei quæ videtur. Sunt N. vtręquæ à suo radio æque distantes, quare cum radij cocant, & illæ coibunt, videri itaque re vnicam necesse, tamen si ita oculis in re infixis alter eleuetur eleuari radium, eleuari ergo & visiones, quare rem alteram videri. Hæc Galenus. Mirum dictu. quod nexus nervorum optico- rum vsu tantum fecit, vt à Demone se eum accipisse affirmet, & illius suasu scripto mandasse, alioqui rei magnitudinem, & obscuritatem formidantem. Itaque non iam cum Gal. solum est nobis inita contentio, sed & cum demone. Sed rogo an satis sit ne res videatur duplex, pupillas esse in eodem plano? Dicent satis esse, nam id faciebat ille nexus. Sed potest oculus vnus esse altero altior, & vt sint in eodem plano, ergo potest esse alter altero altior, & vt res non videatur duplex, nam finge, ex illo nexu am
bos

bos neruos recta tendere, alterum verò erumpere
 per frontem mediam, alterum infra illam per me-
 dium nasum, constat alterum altero esse altiore,
 tamen sunt in eodem plano. Nam ducta ab vno ad
 alterum linea fit cum neruis triangulus rectilineus
 quod vnum dicebas esse satis, ergo possent videri
 res simplices ab oculis, etiam si Deus, vt effinxit dex-
 trum, ac sinistrum, effinxisset supernum, & infernū.
 Cur ergo ductus oculi sursum, aut deorsum, facit
 res videri duplices, atque si talem positum oculi ac-
 cepissent à natura viderentur simplices? Quia si ta-
 les essent natura facti venirēt nerui illi recti, & pos-
 sent adduci ad sese facies anteriores humorum
 crystallo similium, modo verò cum morbo aut cō-
 pressionē fit, euertitur altera pupilla, & facies cen-
 trumque crySTALLINI humoris alio spectat. Scilicet
 visio fit radijs recta prodeuntibus à cētro illius hu-
 moris per medium pupillæ, tunc ergo radius vnus
 oculi abscedit à radio alterius, cum euertitur pupil-
 la, & humor crySTALLINUS incipit alio spectare, non
 quod totus oculus sine euersione, aut contorsione se
 paretur ab altero. Etiam si alter altero altior fiat, ni-
 si euertetur. Ergo tota ratio eo est redacta, visio-
 nem fieri duplicem cum euertitur altera pupilla ita
 vt alio spectet, ac non possit ad alteram liberè ad-
 duci inter videndum. Cōstat verò id accidere etiā
 posse pupillæ versus latus. Quid nī? an quia ligati
 sunt nerui in medio itinere, non potest oculus ad
 latus inflecti? Vides quam sit inutilis hæc ratio?

Quid

Quid ergo interest oculos torqueri ad latus, aut sursum deorsumve? certè si cum flexione abducuntur, nihil. Sed oculi habent latius spatium adductus, & abductus à lateribus, quàm sursum, & deorsum, proinde possunt, plus abduci sine inflexu, ac euerfione quàm retrahi, aut deprimi, tamen abduci, ea tenus possint, vt flectantur, & visionem faciāt duplicem. Itaque ille nexus faciet ad firmitudinem, & tensionem neruorum, nam ita accidit in reliquis particulis, verùm non est is, qui facit, vt res simplices videantur sed adductio oculorum ad sese. Oportet N. quò visio fiat, oculorum pupillas ea tenus adduci, vt radij ab illarum centrīs egressi, in centro rei obiectæ eò euntes cum linea ducta à pupilla, in pupillam triangulum faciant. Quare quoties contorquebitur pupilla, aut sursum, aut deorsum, aut ad externum angulum incipiet res videri duplex. Impedietur enim ita adductus pupillarum ad sese. Verùm si ad angulum internum trahantur, aut ambae, aut altera, per morbum, res quædam videbuntur duplices, quædam non. Nam non semper opus est eadem pupillarum adductione, sed ad longinquiora minori, ad vicina maiori, nam si minus quàm oportet adducuntur, non incidunt radij ambo in idem centrum, si plus satis coeunt, radij dissecant sese per medium antequam in rem obiectam incidant, ergo opus est, certè quodam adductu, & ad res singulas proprio, Illæ igitur res videbuntur benè, ac simplices, quæ in ea distantia collocatæ sunt, quàm exigit is adductus

B

quem

quem morbus fecerit, cum ad internum angulū fle-
ctuntur. Sed oportet reliqua addere. Addebat Gal.
res quascunque videri circa res alias, verè quidem,
tamen malè colligebat, cum ab vtroq; oculo radij,
& visiones incidunt in eadem puncta necessario re
videri simplicem. Nam visiones illæ, et si cocant in
eisdem punctis rei quæ videtur, cum veniant à di-
uersis punctis, & recta tendant statim incipient se-
parari, incidentque in res diuersas, videbitur ergo
circa res diuersas à diuersis oculis res quæcunque:
quare hac ratione duplex semper videretur. Nam
quod proposui ita fit re vera. Si N. rem aliquam in-
tuearis modo dextro oculo, sinistro clauso, modo
sinistro, clauso dextro, locum videbitur tibi res ea
mutasse, scilicet mutatur aspectus aliarum rerum.
Cur ergo duobus oculis apertis non videtur in duo
bus locis? certè quia alter alterum corrigit, sinister
dextrum, dexter sinistrū, scilicet dexter perlustrat
dextrum latus, sinister sinistrum, videturque ita res
ad medium deducta, & vnica. Quum verò res illa
statuitur prope oculos ipsos inter ambo, videtur ea
esse duplex quanquam oculi bene habeant, ac secū-
dum naturam, idque duplici de causa. Et quia acies
vtriusque oculi occurrit rei illi vehemens, quare
vtraque procedit, & quia aliarum species eo loci ve-
niunt languidiores præ his, quare minus aliarum re-
rum intuitu duplex illa visio emendatur. Oportet
N. hic meminisse, quod. 2. libro. cont. cap. 28. mon-
strauimus, visionem scilicet, vtroque modo fieri &
emissione

emissione facultatis, & admissione specierum. Itaque constat ut hac de re Gal. errauerit, non tantum hoc loco, sed multo magis. 10. de usu partium enarrans somnia.

MVSCVLI verò supernam palpebram mouentes (nā inferior immobilis est) quoniam perquam parui sunt, adeò ut in maioribus quoque animalibus, vix manifestè perspicì possint, nihil mirum si nervi ipsis innati difficulter videātur. Nihilominus quemadmodum in musculis, quorum iam supra meminimus, ita, & in his quoque euenire necesse est, ut interdum musculi ipsi peculiari aliqua passione ex his quos ad musculos pertinere nouimus, interdum verò nervi ipsis innati infestentur. Igitur si musculus ipsam sursum retrahens exoluitur, laxam efficiet palpebrā, adeò ut oculus aperiri non possit. Si verò detrahentes. (Gemini N. sunt) resoluuntur, oculum claudere non poterūt. Quorum si alter duntaxat patitur ad oppositum mus-

B 2

culum

culum palpebra defleſctetur, vt fracta videatur, in fine videlicet circa mediam ipſius lineam: quippe ea pars, quę iuxta muſculum patientem eſt, retrahi, quę verò iuxta illuſum eſt, detrahi videatur hæ ſunt partium oculi peculiareſ paſſiones quę latētibus locis inſiſtunt.

SCHOLIUM.

LIBRO. 10. de uſu particularum refert Gal. de ſententia omnium qui anatoμες erant periti muſculis quibuſdam eleuari, & deprimi palpebram ſupernam, mentionem facienſ tantummodo duorū muſculorum, alteriuſ ab angulo magno ad medium tarſi venientis ad deprimendum, alteriuſ ad paruum angulum, à ſupercilio ad eandem partem tarſi ad eleuandum, verūm quanquam hæc optimoſ anatomicorum dicat aſſerere, non tamen inquit ſe poſſe in illorum ſententiam venire, eo quod taleſ muſculos nunquam viderit apertè. Addit argumentum quo indicet nullum muſculum talem eſſe ad magnū angulum, ex curatione ex egilopis. Scilicet cum curatur, ſæpe ſecatur per tranſuerſum, & vritur tota ea caro, quę eſt ad magnum angulum, illa ſo motu palpebræ

palpebræ. Quòd non posset fieri. Hæc illo in loco, hic verò in illorum sententiam venit aperte, & trium muscutorum mentionem facit. Nam deprimentem dicit esse geminum. Certè si motus ipsos consideres, & læsiones quas pati potest oculus euerfione palpebræ, geminum oportet esse deprimentem, alterum ad angulum paruum, alterum ad magnum. Nam potest palpebra ad angulum magnum esse depressa, ad paruum semiaperta, & semiaperta ad magnum, ad paruum depressa, quod nisi ad paruum esset musculus deprimens qui posset conuelli non posset accidere. Qua N. ratione? Verùm musculi hi nec gemini nec simplices re vera apparent inter dissecandum, nisi quis seipsum velit fallere, sibi persuadens, videre quidem se illos, quanquã non manifestè. Mihi probabilius, sit motus illos agite carnosæ, vt motus frontis, vt quæ super alia nunc sursum porriguntur, nunc deorsum deprimuntur opera solius huius cutis, ita superiorem palpebram. Nec verò mirum quanquam res ita habeat posse palpebram per morbum nunc hoc, nunc illo motu priuari. Nimirum aliquando ita esse depressam, vt non possit oculus aperiri, aliquando ita eleuatam, vt non possit claudi. Nam quanquam ea membrana contexta est ex fibris ambientibus oculum in circulum fere integrum, eò in inferna palpebra solum deficiente, possunt aliæ fibræ claudere oculum, aliæ aperire. Scilicet, si quanquam omnes eundem seruent positum, non tamen omnes eadem par

te neruorum furculos accipiant. Nam fibræ contrahuntur verſus illam partem qua neruum accipiunt. Si igitur fibræ quæ alijs ſunt depreſſiores, & prope tarſum oculi (ita vocatur ea cartilago, ex qua oriuntur cilia) ita neruos accipiunt, non in interna palpebra, ſed in iſſis angulis, alię hinc, alię illinc diſtinctæ, depriment palpebram, claudentque oculũ, vt crumene ſolēt corrigijs. A ſublimioribus autem, ſi neruos infra angulos in interna palpebra accipiunt, contractis fiet extremarum, & humiliũ partium palpebræ ſuperioris attractione totius ſuperne palpebræ eleuatio, ac oculi appertio. Certè hic morus eſt, ſi quis alius, maximè occultus, proinde nihil mirum ſi ratione ducamur accipientes quẽdam, quę quanquã opere non poſſint præ tenuitate indicari, veriſimile tamen ſit ita habere, modò ab ijs quæ in rebus iſſis inueniuntur non recedamus.

Alijs occaſionibus, præter eas quarum mentionem facit Galenus poteſt palpebra, aut detracta eſſe, aut euerſa. Uſtione ſcilicet, aut cicatrice quam acceperit, aut carne quæ in ipſa plus ſatis creſcat. Verũ has occaſiones tacuit, quia nõ ſunt occultæ, ac proinde nec huius loci ſunt.

AC ſunt præterea alii, qui ex alijs partibus, ei per conſenſum adueniunt.

Igitur accidentia, ſuffuſorum viſis ſimilia

milia, videntur, oculis nulla propria passio-
ne molestatis, sed aut oris ventriculi, aut ce-
rebricognitione, id accidere solet. Verum
hæc ipsam ab iis, quæ à ventre oriuntur, di-
stinguenda sunt. Primum quidem ex eo,
quod vel alter duntaxat oculus, vel vter-
que similiter visis occupetur: siquidem in
vniuersum visa ob humorum in ventricu-
lo contentorum vitium oborta, vtrique o-
culo similiter accidunt. Quæ verò per suf-
fusiones apparent, nec incipiunt simul in
vtroque, nec similiter apparent. Deinde
ex tempore quoque distinguuntur. Si enim
tribus, quatuorue, aut etiam pluribus men-
sibus, suffusionis apparuerint accidentia, cõ-
tẽplantique tibi pupillã, nihil tenebrosum
videatur, ab ore ventriculi patiens proce-
dere inuenies. Si verò non ita multum tem-
poris intercessit, querendum est imprimis,
vtrum ex quo incepit passio singulis die-
bus perpetuo huiuscemodi apparitio per-

B 4 seuerauerit,

feuerauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni reprehensione caruerit, an diebus quibusdam laborans exactè videatur conualuisse. Nam assiduitas suffusionem portendit. Intermissio verò, quòd malum à ventriculo prodierit, suspicionem excitat. Idque magis, si perfectè quis concoquens, nullum sibi visum apparere fatetur: sed multo magis, si cum apparuerunt visa, mordicus in ore ventriculi doluit: maximè verò, si post hæc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint accidentia. Hæc sunt, quæ primo statim die, cum videris hominem, interrogando discere debes, quando, vt iam diximus, exquisitè secundum naturam se habuerint oculi. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut (vt breuiter dicam) non exactè pura videtur, suffusionis esse initium censendum.

Si

Si verò quispiam suapte natura pupillas ipsas non admodum puras habuerit, considera num utriusque similis sit passio: ad hæc an non ita multum temporis à suffusionis accidentibus præterierit, ut eas turbidiores reddere potuerit. Quod si ita est, impera, ut minus cibi, quam pro consuetudine ingerat, eumque nihil mali succi habentem: postero die, ubi probè cōcoxit, qualia apparuerint visa, interroga. Si enim vel omnino nulla vel debiliora videantur, ad stomachum referendum est accidens. At si similia permanferint, non per cōsensum, sed ex propria passione, sciendum est huiusmodi accidentia oculos infestare. Idque magis ubi sumpto ex aloe medicamento, nihil variauerint. Voco autem medicamentum ex aloe, quod alii hieram picram, alii simpliciter picram appellant. Quippe si à stomacho prouenerit, accidens huiusmodi medicamento potui dato, facillime curatur, ac-

B s cedente

cedente simul bona concoctione : vt in idē conueniant, & patientis sedis notitia, & ipsius curatio. Equidem quosdam sic patientes, quamuis, vti scitis, non viderem, cum in alienis essent terris, per literas curaui. Nam cū nonnulli ex Iberia, Celtica, Asia, Thracia, atq; aliis regionibus, per epistolas à me peterent, etiam in suffusionis initio, nullo adhuc vitio in pupilla apparente, vt probatum aliquod eis medicamentum transmitterem, volui prius certio rem me redderēt, num ex multo tempore ita fuissent passi, præterea de aliis quoq; quorum paulò ante mentionem fecimus. Qui cū per epistolas responderent, sex menses, aut annū iam exactū esse, vtrumq; oculum similiter pati, cū probè concoxissent, melius sese habere : per cruditates, atq; stomacho mordicus dolente, grauius irritari, educta verò per vomitum bile, quiescere, nulla facta de pupilla quæstione, satis efficaciter me cognoscere

gnosceretur putavi, non propria passione, sed per ventriculi consensum oculum infestari. Mittens itaque picram, ipsos quidem imprimis, atque præcipuè, per eos autem alios quoque multos ipsorum conterraneos sanaui. Quum enim omnes, quotquot epistolas meas acceperunt, docti essent, patientium locorum notas ex literis meis didicerunt: quibus deinde faciliè cognitis, eos amaro medicamento curauerunt. At similia quoque suffusioni accidentia in quibusdam in phrenitidis speciebus, patiente scilicet cerebro, sæpenumero euenire solent. Nec refert vtrum species, differentias nominaueris. Nam simplices quidem duæ inueniuntur, ex quibus deinde tertia componitur. Quippe sunt phrenitici quidam, qui de iis, quæ oculis offeruntur, rectè quantum ad sensus pertinet, iudicant, mente verò à naturali iudicio aberrant. Alii rursus mente quidem falluntur minime, sensibus tamen delire mouentur. Sunt præterea, qui simul & sensus & mentis vitio

tio laborant. Itaq; cuiusq; lēſionis modum
 fic accipe: cum Romæ quidam domi cum
lanifice puero contineretur, surgens à cubi-
li, venit ad fenestram, per quam & ipse vi-
deri, & prætereuntes videre potuit. Itaque
ex vitreis vasis singula ostendens, interroga-
uit, imperarent ne vt ea proiiceret. Illi verò
videntes, plaudentesque, vt ea proiiceret ro-
gabant, tum ipse deinceps omnia arripiens
eiecit. At illi magnis acclamationibus riſe-
runt. Postea iuberent ne puerū quoque pro-
iici, cū eos interrogasset, atq; id illi iussis-
ſent, illico ipsum deiecit, quem ab alto ca-
dentem videntes, suppreſſo ſtatim riſu ac-
currerunt, & conſractum iam puerū ſuſtu-
lerunt. At contrariam paſſionem, non ſolū
in aliis, verū in meipſo, cūm adoleſcentū
lus adhuc eſſem, expertus ſum. Quum N.
per eſtatem ardenti feбри laborarem, & fe-
ſtucas atro colore, ex cubili eminere, & flo-
cos ſimiliter eſſe putabam, quos auferre tē-
 tans

tans, nihilq; sub digitis eductum inueniens, accuratius vehementiusque id efficere cognatus sum. Audiens itaq; duos ex amicis, qui tunc aderāt, dicentes: vides ne hunc iam & floccos euellere, & festucas colligere? Statim intellexi, id ipsum quod dicebāt, me fecisse. Quum verò sic animo constarem, vt rationalis in me facultas non vacillaret: rectè inquam, dicitis, proinde ne phrenitis me arripiat, auxilio estote. Illi autem cum idoneis rigationibus caput fouerēt, tota die, sequentēq; nocte, grauibus insomniis turbatus sum, vt interim clamare, & exilire viderer. Verū postero die, mitigata sunt omnia accidētia. Igitur cōstat, quod licet ab vna & eadē causa secundū speciem accidentia proueniant, non tamen ab eadem sede, quæ primario passa sit, emergunt, cū aliàs ex cerebro, aliàs ex vētriculo per cōsensum passio oriatur, vt dictum est. Quum enim in cerebro cuiuspiam biliosus succus abūdat, acceditq;

acceditq; febris ardens, is efficietur, perinde
 ac si ad ignē torreretur, oriturque tūm fu-
 ligo veluti in lucernis ab oleo : quæ fuligo
 simul per vasa, quæ ad oculum tendūt de-
 lapsa, visorum in ipsis causa censetur. Siqui-
 dem in anatomice vidistis, quod & arteriæ
 & venæ ab his vasis, ex quibus membrana
 secundiformis contexta est, simul cum ner-
 uis ad oculum descendūt. Verūm huic ser-
 moni, vt pote satis iam definito, finem im-
 ponētes, de reliquis oculi partibus deinceps
 dicamus : si prius id in vniuersum monue-
 rimus, nostri instituti non esse earum parti-
 cularum, quæ manifestè sensu percipiūtur,
 si à naturali constitutione aberrauerint, no-
 tas præscribere, sed illarum potius, quæ, cū
 passæ fuerint, sensum latent. Nam cū pu-
 pillam manifestè videtur aut fracta, aut distor-
 ta, aut præter naturā vel aucta, vel minuta,
 haud difficile est patientē particulā cogno-
 scere. At verò quæ sit passio huiusmodi fa-
 ciens

ciens scire, artis medicæ munus est. Verùm de iis in lib. de causis accidentium iam scriptum est. Proinde non opus esse videtur, vt in hoc lib. vel patientes sedes in oculis, quas sensus consequi potest, vel passionēs ipsas declarare aggrediar. Quippe passionum nomina vno paruo volumine, cui titulus est, quomodo noscantur oculorum passionēs, perscripta sunt. Causas (vt diximus) in libro de accidentium causis inuenies. Tempus igitur est, vt ad linguam nostra conuertatur oratio.

SCHOLIVM.

CONSENSV etiam cum venis, & arterijs posse oculos suffusione laborare, non solum consensu ventriculi & cerebri, non arbitror esse obscurum, cum veniant multæ venæ & arteriæ in oculos, & possint illæ nec cerebro nec vètriculo patientibus per se deferre flatus crassos. Nec solum possunt oculi laborare suffusione per cōsensum cerebri in phrenitide, sed etiam in vertigine, & alijs passionibus capitis non est omnino impossibile, suffusionem fieri in ambobus oculis, & eam esse propriam

prium affectum, sed est perrarum, ambo simul ita affici, vt rarum sit, ambas manus simul corripere inflammatione, tamen quod fieri possit. Itaque potes colligere, si alter tantum oculus laborat, non fit consensu ventriculi: non tamen si ambo laborant statim est consensus, sed fit ita plarumque. Vbi Gal. inquit, in quibusdam phrenitidis speciebus accidere ægrotantibus suffusionis accidentia, ne intellige quod nonnulli intelligunt, semper laborare oculos cum cerebro, cum id delirat circa aspectabilia prauè imaginando, sed intellige id accidere frequenter, posse tamen solam vim imaginadi, per sese, sine læsione instrumenti alicuius singularis sensus errare. Nam imaginari se videre quæ non videt, non est actio oculi deprauata, sed actio imaginationis. Verum hæc demonstrata à me sunt libro quinto controuersia, capi. 17. quod velim te ad intelligentiam huius perlegere. Ego enim quæ se mel sunt satis explicata repetere, præterquam quod grauiter ferrem, inutile esse duco. libro de diff. symp. Ga. mentionē fecit læsæ memoriæ, non tamē læsæ imaginationis aut rationis. Nimirum erat illi institutum inuenire omnes symptomatum differentias, Hic nullam mentionem facit læsæ memoriæ, quia visiones suffusorum ad læsionem imaginationis solius, aut communem imaginationis & rationis aliquid facere possunt, ad læsionem memoriæ nihil.

Relectiuncula.

Ad morbos linguæ facta transgressione, docet linguā posse accipere noxam motus, aut sensus, atque huius, aut secundum gustatum, aut secundum tactum, ac motum lædi vitio nerui septimæ coniugationis, sensum vitio nerui tertie, sensum etiam posse lædi in gustandi facultate illa, facultate tangendi, eo quod hæc sit imperfectior. Obiter cōfert sensus omnes perfectione. Motū inquit, lædi posse altera linguæ parte, aut ambabus, eumq; qui altera parte ledatur, in periculo paralysis versari, qui vtrāq; in periculo apoplexiæ. Redditq; rationē qua frequēter inter partes faciei sola lingua solet pati resolutionē, obiter disserit de: essentia, causis, et symptomatis soporis, epylepsiæ, apoplexiæ, & cathoci, tandem refert morbos tēperamenti & compositionis, qui possunt linguæ accidere. Quamquam illorum plerosq; mitti iubet, vt pote manifestos, atque ad hanc tractationem minime attinentes.



TQV E videmus interdum ipsius motum, interdum gustandi sensum lædi, atq; nonnunquam cum ipso tactum quoq;. Nec verò aliis gustus, atque aliis tactus nervis vtitur, vt in motu videre est. Nerui enim à tertia coniuga-

C tione

tionē orti, non solum tangēdi, verū etiam gustandi, vim obtinēt. Verum crebrius laudatur gustandi, quam tangēdi facultas, quāvis iisdem nervis vtraque vtatur, vt magis exacta indigens cognitione. Nam tangendi sensorium, crassissimum, vt cernendi tenuissimum est. Auditus verò sensorium, vt in tenuitate à visu, ita sensorium gustus in crassitudine, à tactu secundum locum obtinet. Olfaciendi verò sensorium in illorū quatuor medio constituitur.

S C H O L I V M.

LINGVA habet nouem musculos, instrumenta suorum motuum, ab vtroque latere quatuor & nonum illorum mediū. Quidam oritur à radicibus dentium molarium qui sunt postremi, alius ab osse stilo simili, & sub musculis omnibus faciei, & temporum venit obliquè ad linguam. Duo alij oriuntur ab osse. v. formam referente his respondent ab altero latere totidem, nonus oritur à medio mandibulæ infernæ à basi ima. Verū cū hi nouē muscoli ad medium ferè linguæ finiantur, non videntur esse satis ad motus extremæ linguæ, qui sunt quā
multi

multi, ac varij. Proinde ego dixerim extremam linguam vim per sese habere musculi atq; adeo multiplicis musculi, scilicet, finiuntur nouem musculi ad medium linguæ illis coeuntibus, confusisque in vnicum corpus laxum, ac molle, quale conspiciamus linguæ corpus, fibræ quædam producuntur ab illis omnibus vsque ad extremum linguæ, vbi terminantur omnes, ita vt supernæ infernis alligentur, atq; id corpus varios motus possit imitari varietate fibrarum quarundam, quæ in illo corpore obscure sunt, ac proinde is motus est obscurus, si quis alius. Quod instrumentum tactus sit crassissimum, videndi tenuissimum, atque alia vt Gale. hic docet, ex temperamentis illorum sensuum pendet, de quibus abunde disputatum à me est, secundo libro controuerfiarum, capite vigesimo tertio. Vbi ostendi visum pertinere ad ignem cælestem, auditum ad aërem, odoratum ad halitum, gustatum ad aquam, tactum ad terram. Merito ergo vt se habent hæc corpora in tenuitate ad sese, ita se habent sensuum instrumenta. Ratio quæ gustatu cre-

brius læditur quam tactus, est eadem,

qua indicatum supra est mo-

tum particulæ alicuius

tolli ante sen-

suum.

C 2

Mouendi

MOVENDI autem vis linguæ aduenit, à septima neruorum à cerebro ortorum coniugatione, non longe à spinalis medullæ initio. Quumq; hoc in loco vtraque cerebri pars, tam dextra, quam sinistra patitur, ne apoplexia hominem rapiat, periculum est, vbi verò altera tantum, in paralyfim finiri solet. Ea interdum duntaxat linguæ medietatem, à motu prohibet: interdum partes sub capite constitutas, & quidem modo has, modo illas infestat. Nonnunquam alterum latus per vniuersum corpus vsque ad extremas pedum partes afficit. Igitur ex faciei partibus sola lingua sæpenumero videtur iam dicta noxa molestari, cum nulla sit, neque in tactu ipsius, nec in gustu læsio. Cuius rei causa haud obscura est, vobis præcipuè qui vidistis neruorum à cerebro processus, ad faciem quidē à parte eius anteriore, ad partes verò totius animalis sub facie omnes, ab altera

altera parte, nempe posteriore fieri, à qua etiam eorum neruorum, qui ad linguæ musculos veniunt, coniugatio procedit, quibus ipsa motum ab electione perficit. Itaq; non ab re, cùm anterior duntaxat cerebri pars patitur, sola linguæ motio vitio carebit. Reliquæ verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra, aut sinistra, & sensum, & motum, ab electione amittunt.

SCHOLIV M.

LABORAT lingua frequentissimè paralyfi, Latque adeò sola, sine reliquis partibus faciei sape, ea causa, quàm Gale. reddit, quod scilicet, nerui ad linguam veniētes à postrema cerebri parte oriuntur in exortu ipsius spinalis medullæ, adde quod minime omnium cum reliquis neruorum partibus permiscantur. Nullum enim mittit furculum ad aliquem priorum neruorum, quāquam accessione quandā recipit à tertia, & sexta cōiugationibus.

QUOD si aliquando tota anterior cerebri pars patitur, supremum
C 3 ipsius

ipſius ventrem ei conſentire neceſſe eſt : atque mentis quoque aſtiones vitiari. Proinde qui ita laborat, nec ſenſus , nec motionis munere fungitur , ſpirandi tamen facultas haud quaquam læditur , vocatúrque hæc paſſio caros. Si verò adeo vehementer ſpirationem opprimat, vt quis vel magno conatu, vix ſpirare poſſit, eorum exemplo, qui per grauem ſomnum ſtertere ſolent, apoplexia nominatur.

SCHOLIV M.

τὴν υψιλοτάτην κίλιαν, id eſt ſupremum ventriculum appellat medium. Nam tūm temporis putat fieri carum cūm patiuntur ventriculi anteriores cum medio. Verūm non eſt quod medium, ſupremum appellet, cūm infra duo priores ſit locatus. An paſſione priorum ventriculorum cerebri carus fiat cum paſſione medij, an vltimi nullus poſſit iudicare euidenter, non enim profeſſò, vt Ga. innuit anteriores locati ſunt in anterioris capitis parte, & poſt illos medius in medio & ſupremo capite, ſed vt antea monui, duo priores ſunt eminentiores & à lateribus, tertius profundior, & in medio illo-
rum

rum. Illud vnum videtur verissimile, per carum lædi ventriculos cerebri, vt per epilepsiam, non substantiam etiam cerebri vt per apoplexiam. Nam si substantia etiam cerebri, vt in illa obstructa esset, non posset fieri libera respiratio in caro, magis quā apoplexia, nimirum esset obstructa neruorum radix, & ipsum processus principiū. Epilepsiam quoq; dicit Gal. fieri obstructione ventriculorum, verūm dicit ab ea differre carum, quod epylepsia sit affectio omnium ventriculorum cerebri, carus anteriorum tantummodo. Verūm ego cui persuasum multō ante id nō satis posse constare, cū ppter anatomē tū etiam q̄ quæ sensus actio in quo ventriculo cerebri agatur, sciri non posse demonstraui, aliter dixerim, epylepsiā nempe tenere vētriculos & substantiā, sed substantiā multō minus quā apoplexiā, multo plus quā carum. Atq; adeo carū aut nihil aut quā minimū obstruere substantiā, præterea humores aut vapores, qui cari sunt causa, refrigerando id facere. Inducunt n. stuporē primi sensus puta profundū somnum, eos verō qui epylepsiā, non ita, sed aliter irritando, itaq; insurgere cerebrū aduersos eos & se concidere. Quāquā carū à principio nō comitetur necessario lætio respirationis, cōstat tamē ingrauescente malo posse succedere difficilē respirationē, verū erit iam tū apoplexia. Cōiugio etiam alterius mali nihil prohibet lædi respirationē etsi carus sit, vt si anginā cū caro esseingas, nec solū hac ratione, sed vitio quodā naturali fieri potest, vt per earū

quis stertat. Nam & per naturalē somnum stertunt quidam, quod angustas habeant spiritus vias.

ATQVI solutæ apoplexiæ creberri-
mè succedere solet, vocata paraly-
sis. Sopore verò finito, bona valetudo ma-
gna ex parte subsequi cōsuevit. Fit autē so-
por, Hip. authore, musculis temporū patie-
tibus, præterea in acutis quoq; morbis, vt i-
dem Hip. scripsit. Inter soporē verò, & a-
poplexiā, morbus comitialis mediusest, cō-
uulsionē afferēs vniuerso corpori, sed in pa-
ralysim non finitur. Horū trium morborū,
frigidus, ac crassus, aut omnino viscidus hu-
mor, causa est. Verum & in sopore, & mor-
bo comitali, ventres magis cerebri, corpus
minus : in apoplexia verò corpus magis pa-
ti solet. Atq; in sopore anterior pars magis
in apoplexia, & morbo comitali vtrāque
laborat. In catalepsi verò & catochō poste-
riora cerebri magis molestantur

Scholium.

CARVS nunquam est, cum febre, nisi cum illius est accidens, vt in quibusdam ardentibus febribus solitum esse fieri docet Hippo. 3. epid. parte. 3. sed de hac re. 5. libro cont. cap. 15. scripsimus.

Miror Gal. dicere epilepsiam, nunquam finiri in paralysim, nam vidimus nonnullos, audiuiusq; quāplurimos, infantes potissimum epilepsiam euasisse per paraplexiam, siue paralysim. Maximè cum Gale. ipse dicat. 4. de ratione vict. in acut. com. 27. paraplexiam fieri, aut ex apoplexia, aut epilepsia, neque id solum, sed etiam apoplexiam, plerumq; abire in paraplexiā p mediā epilepsiā quo loco rationē optimā reddit qua id fiat. Nimirū per epilepsiā succus cōcussione mēbrorum partim discutitur, partim distrahitur per corpus, ergo habebit duplicē solutionis modū, aut discusso succo, aut detruiso ad mēbrū aliquod, quare si alterum latus sit imbecillum in illud incumbet, facietque paralysim. Itaque hæc duo Gale. loca manifestè pugnant, quæ proinde ego in quodam commentariolo, quod de locis manifestè pugnantibus apud Gal. scripsi censui reponenda.

Musculus temporum est in masticatorijs, ortum habet ab ossibus temporum, lapideo, & frontis, descendit sub osse iuguli, inseritur in processum supernum & externum maxillæ infernæ, læso hoc trahi ad consensum facile cerebri ventriculos puto facere magnam arteriam, quæ per tempora venit, & nervos

qui eo loci à cerebro erumpunt, praterquam quòd eo loci os est debilissimum & futuræ multæ, quibus mouetur os vt articulus. Hoc docet Hippo. Libro de vlceribus capitis dicens, hac de causa vlcus in temporibus solere esse maximè periculosum.

QVVM autem osse quopiam terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat, sed neque conuulsione, nec difficili facta spiratione, quarum hæc apoplexiæ, illa morbo comitiali peculiaris est, haud secus, quàm catalepsi, torporique seruata secundum naturam spiratio. Verum vt per soporem palpebræ clauduntur, ita in catalepsi manent apertæ. Quemadmodum autè inter perforandum, cum quis incautè præmens meningophylace, meningem plus iusto compresserit, carus fit. Ita vbi os caluariæ vehementer attritum, ipsius ventriculos comprimat maximèque medium, sopor superuenire potest. Quinetiam ad vehementes dolores hæc palsio sequitur, con
cidente

cidente videlicet robore spiritus animalis. Voco autem sic id, quod est in cerebri ventriculis primum animæ instrumentum, quo & sensum, & motum, in vniuersas corporis partes mittit.

S C H O L I V M.

NON video qua ratione possit terebra perforato osse medius venterculus atteri, non antea ac plus etiam attitis primis, ego sanè ventriculorū vitio accidere soporem probabile duco, huius tamen, aut illius vitio fieri, nō possum dicere. Sed causam, qua cum cerebrum osse perforato comprimitur, sopor hominem occupat, longe aliam esse suspicor. Nimirum vt dictum est, alibi de sententia Gal. cerebrum habet propriam quandam respirationē, cuius causa natura satis magnum spatium dilatationi, & constrictioni cerebro reliquit inter tenuem, & duram meningem, cū ergo compressione: hac ventilatione priuatur cerebrum, simile quiddam patitur suffocationi, & intercipitur decursus spirituum, & cessant sensus. Nam sensus interni aguntur motu quodam spirituum, cessantibus sensibus cessat continuo toto corpore motus. Nam animantia mouentur appetitu, qui non est sine imaginatione. Itaque merito compresso cerebro accidit sopor, etsi ventriculos non attingat contusio. Nam & ipsemet Gal.

Gal. dicit statim soporem accidere, compressa meninge, plus iusto meningophilace instrumento. Est meningo philax instrumentum quo vtuntur chirurgi ad custodiam meningum cum aliquid circa cranium moliuntur.

HA S capitis passiones tùm quòd iam proposito sermoni familiaritate coniunguntur, tùm etiam quòd antea nò satis declaratae fuerunt, opere pretium duximus in praesentia definire. Sed ad linguae passiones redeundum nobis est. Quorum aliae quidem communes sunt per cerebri, neruorumque consensum. Aliae ipsius duntaxat propriae censentur. Igitur quòd ad communicationem, quàm cum cerebro habet, pertinet, vt per septimam neruorum coniugationem motus ipsius vitiatur, ita sensus impediri potest per tertiam, quem neruum dissectores mollem appellant, descendentem, dispersumque (vt scitis) in tunicã, quæ linguam comprehendit: quemadmodum is, qui à septimo coniugatione ortum habet,

bet, musculis ipsum mouentibus distribuitur. Propriæ autem solius linguæ passiones, ex iis, quæ iam supra de oculorum propriis passionibus diximus, haud difficulter inuenientur. Quippe sicut musculorum ipsius, ut pote simularium, intemperantiæ motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membranæ intemperies, & tangendi, & gustandi simul sensum vitiat. Instrumentalium verò passionum speciem referunt inflammatione, scyrrhi, tumores molles, erysipelata, suppurationes. De his verò, ut pote quæ tum visu, tum tactu discerni possunt, nihil aliud in hisce commentariis dicemus. Quippe eas duntaxat patientes partes hoc in libro persequi proposuimus, quæ nec visu nec tactu, sed per signa quædam ex indicatione, atque (ut summatim dicam) rationali via inueniri possunt.

Scholium.

SCHOLIV M.

LIBELLO etiam de dissectione neruorum docet Gal. neruum tertiæ coniugationis solitum esse appellari mollem, & molliorē esse re vera neruis coniugationis secundæ, certē præternaturam aliorum omnium neruorum, qui tanto solent duriores esse quanto è posteriori parte cerebri oriuntur. Verū hoc non sine causa est machinata natura in his neruis cum tertia coniugatio sit ad linguæ sensum, & secunda ad oculorum motum, oporteat verò neruo, motus neruis sensus duriores esse.

CAP. III.

Relectiuncula.

Docet hoc cap. Gal. eadem methodo posse nos vti ad morbos occultos qui auribus contingunt, qua in morbis instrumentorum, aliorum sensuum vti hætenus docuit, scilicet, si solus auditus læditur nullo apparente circa porum malo, læsio est proprii nerui. si verò simul cum auditu læduntur faciei partes, malum est cerebri.



AD E M igitur ratione in sensu auditus, quęcunque passionēs in aurium oculis obiecta concauitate oriūtur, rationali inuestigatione nō opus est.

est. Quæ autem non patiente eo poro qui videtur in auribus læsio autem secundum audiendi actionem simili methodo inuestigamus. Siquidem sola patitur proprium neruum læsum esse coniicimus.

S C H O L I V M.

SI quid de proprio auditus instrumento hoc loco audire cupis lege cap. 15. 2. libri nostrarum cōt.

C A P. IIII.

Relectiuncula.

Hoc capite differit Gal. de faciei, extra sensuum instrumenta, morbis: atque imprimis de oris tortura, per quam cum resolutione fit, in sanam partem trahitur pars agra. Obiter docet multa ad eius partis anatomen spectantia.



BI verò reliquæ faciei particulæ simul cum ipsa læduntur, in cerebro passionem præternaturam esse existimamus, ipso velut similari, vel ut instrumentali parte patiente. Sed facies reliquis in locis omnibus non solum motum, verum

verum etiam sensum , aut perdit omnino, aut vitiatum habet: interdum partibus, quæ læsas habent actiones propria passione laborantibus , interdum verò nervis, qui ad eas à cerebro deferuntur , denique ipsomet interdum patiente cerebro. Quorum discrimen per copulata ipsis accidentia facile deprehenditur. Quippe si forte fortuna una quæpiam particula, aut in sentiendi, aut movendi, aut utraque facultate lædatur, ea sola causam passionis continet. Idque aut in suis ipsius partibus, vel instrumentaliter, vel per intemperiem patientibus, aut in nervis, qui ad ipsam ex tertia coniugatione feruntur. At ubi plurimæ simul patiuntur particulae, considerare oportet, utrum ex una nervorum origine, aut pluribus, sensum, motumue, cum in naturali sunt habitu, fortia-
tur. Subiiciamus N. ex arte secandi corpora, temporum, maxillarumque musculis, item labris, & narium primis, sensum & motum:

tum: linguæ verò omnibúsq; oris partibus, sensum duntaxat: à tertia neruorum coniugatione procedere: à secunda verò, vt oculorum musculis motum, ita à prima oculis ipsis cernendi sensum suppeditari.

Igitur vbi particulæ, quibus à tertia coniugatione nerui adueniunt, & quidem omnes, sed in alterutra duntaxat parte læsæ videntur (nunquam autem huius præceptionis, vel nihil dicentibus nobis obliuiscaris, neruum ipsum primariò laborare putandum est. Si verò vtramque simul partem lædi contigerit, non nerui propria, sed in cerebro loci cuiuspiam, à quo nerui procedunt, prima passio est. Sanè patiente in vtraque parte, tam dextra, quàm sinistra, cerebro in eò videlicet spatio, vnde tertia neruorum coniugatio prodit, omnes vicinæ partes simul pati cõsueuerunt. Et proinde secundæ, & primæ coniugationis nerui læduntur: vnde sequitur, vt oculorum quoque partes lædan-

D tur

tur. Quòd si vnus duntaxat vel musculus: quoquo modo, siue primaria passione, siue per consensum, laborauerit, pars ipsa in aduersum trahitur muscolum. Nam resolutio musculo, qui dextram labri partem mouet, ipsa ad sinistram deflectitur. At si is, qui sinistram mouet, resoluatur, ipsa trahitur ad dextram. Haud secus & totam mandibulam, & narium pinnas, & genas vtrasque, quas à musculosa latitudine moueri didicistis, in aduersam partem deflecti contingit. In hanc verò non ex tertia coniugatione nerui, sed ex vertebris colli procedunt in totam ferè, dempta parua quadam parte in quam, à quinta coniugatione inferuntur nerui. Vbi ea latitudo supremum habet locum.

SCHOLIVM.

OPTIMUM fanè modum inueniendi partem laborantem Galenus docet ex partibus quæ si mul, cum alijs patiuntur: aut non patiuntur. Nimirum

rūm cūm particula quāpiam laborat sola, non est quòd malum referatur in radicem vnde in illam nervus venit, cūm verò cūm ea simul laborant aliæ, videndum est, an illis omnibus ex eadem parte, ac per oculum nervum vis veniat, an ex diuersis. Si N. ex eadē, illa in parte quæ omnibus malè affectis est communis radix, malum esse putandum est, si ex diuersis, in illis omnibus: in ipsis quidem nervis cūm iam sunt producti, si vnico in latere læsio fit: in ipso cerebro, si in ambobus. Itaque eum ad locorum laborantium notitiam adeò conferat anatomes peritia, & ad morborum curationem nihil adeò conferat, quàm notitia laborantium locorum, non est quòd quisquam neget anatomes peritiam apprimè esse necessariam ad artem medicam. Verūm illi argumento quod à partibus quæ simul laborāt, aut non laborant, accipi diximus, aliud addi debere putauerim, ex signis fluxionis quæ in partem laborantem decumbit, quorum maximum est dolor. Rarò N. fit vt tortura oris quispiam corripatur, quin doleat prius, aut inter vertebrae colli, aut prope aures, qui dolor mihi indicat fluxionem in nervulos illis locis decumbentem. Nolim verò signum hoc dimitti, quia fieri potest, vt particula aliqua sola laboret, tamen mali principium in primò nerui exortu sit, quòd scilicet non totus nervus, sed quædam in eo fibra, quæ in eam partem sunt processuræ, resolutæ sint. Ita diximus capite sexto, primi libri, cōtigisse illi cui accepto in principio dorī, ictu duo

CAP. V.

Relectiuncula.

Incipit enumerare spinalis medullæ passiones, ac primum omnium docet necessarium esse tenere memoria numerum nervorum qui ab illa prodeunt, ac scire in quàm quisque partem veniat, & secundum quàm vertebrā prodeat. Deinde anginæ luxatione vertebrarum colli factæ mentionem facit, ac locum quendam ex libri. 2. epidemicon constitutione. 2. profert. quo Hippo. tempestatem quãdam describit, qua illa anginæ species grassata est, ac enarrans Gal. Hippocratis verba, signa omnia illius mali percurrit, & singulorum, quæ acciderunt, causas docet, ac obiter omnium specierum anginæ nomina, quibus medici post Hippo. utebantur, & signa profert.



ED iam tempus est vt spinalis medullæ passiones persequamur. Igitur spinalis medullæ passiones, quantum ad præsentem inquisitionem pertinet compendiosam habent doctrinam: minimè verò compendiosam cognitionem in ipsis operibus habent. Etenim nisi quis nervorum ab ipsa procedentium coniugationes

iugationes ita memoria teneat, vt ad quam corporis partem singulæ perueuiant, cognoscat, discernere non poterit, secundum quam vertebram ipsa patiatur: veluti è contrario, si illarum meminerit, facilis erit patientis sedis notitia. Quinetiam si reliquarum quoque partium omnium notitiam queris, vt neruorum, qui à spinali medulla oriuntur, memineris necesse est.

S C H O L I V M.

SPINA tota constat. 24. vertebris, quibus accedit os sacrum sex constans ossiculis, quæ sunt pro sex vertebris, quibus additis sũt tringinta, quæcunque vertebra habet interius permedium quoddam foramen, cui aliud in inferna respondet, itaque ex illis omnibus coarticulatis fit oblonga quædam fistula è cerebro orta perquam cerebri substantia deducta spinalis medulla fit, atq; medulla vt recedens à cerebro semper extenuatur, ita angustius etiam fit semper internum vertebræ sequentis foramen, foramine antecedentis, vt verò foramen id in sequentibus vertebris perpetuo fit angustius, ita corpus ipsius vertebræ fit maius, præter primam, & secundam quæ maiores sunt multo proximis verte-

D 4 bris,

bris, quanquam sunt excelsiores. Nec tamen hoc solum habent duæ hæ vertebræ præ cæteris, sed figuram propriam & modum articuli. Ita N. oportuit cū motuum capitis futura essent instrumenta. Prima vertebra caret spina (spina in qua vis vertebra vocatur processus quidā ossis retro spectans) quanquam reliquis omnibus sit, habet duos sinus à lateribus excipientes duo tubera ossis occipitis, atq; hac ratione coarticulatur capiti. Secunda vertebra habet figuram reliquis similem præterquam quòd in parte superna, & interna quo loco aliæ habent finem quendam excipientem processus supernarum, ea habet processum longum, & per foramen primæ subeuntem, cuius causa ab Hippocra. appellata est hæc vertebra dens, aut denti similis.

Hoc secundo articulo motum annuendi, & renuendi fieri, & primo illo caput in girum agi contendit Galenus, multis verbis, duodecimo, de vsu partium, ego tamen magis acquiesco in sententia eorum, qui asserunt motum annuendi fieri, primo articulo, & flexum, ac reflexum capitis in secundo, non alia de causa, quàm quòd ipsa structura videtur indicare. Possis enim tu ipse ita experiri. Caput in prima vertebra colloca vt per naturā est, deinde primā vertebrā altera manu tene vt immota sit atq; altera tenta caput circumferre, ac videas ipsas articuli partes esse impedimēto. Tēta. 2. ita colloca tū caput deprimere ac eleuare in eodē articulo, ac videas articulo illæso caput cedere facili mē.

Iam verò nihil facilius quam primam vertebra in secunda circumferre, trahere caput in occipitiū non videtur facile, in mentum non videtur posse fieri, quum processus dens vocatus medullam spinæ lædat comprimens, sed hæc obiter sint dicta. Spinalis medulla, vt diximus, quo plus à principio recedit, eo fit tenuior, ac protectio tantū videtur crassitudinis amittere, quātum in nervos qui ex ea procedunt impenditur. Nam ex singulis vertebra oriuntur bini nervi, vtrinque vnus, itaque triginta nervorum paria oriuntur ex spinæ, erumpētia per quædam foramina, quæ non tam sunt in ipsis vertebra quam fiunt in coalitu vertebrae cum vertebra, singulis habentibus sinus & excauationes. In collo æquales partes præstant foraminibus supernæ & infernæ, in dorso aliquantò plus supernæ, quam inferne, in lumbis tota fere foramina sunt in supernis. Qui nervus in quam partem tendat multum ad hanc tractationem scire refert, si tamen omnia aut omnino multa mihi de hac re dicenda forent, opus esset libro integro, quæ necessaria sunt & videntur esse satis, sexto cap. lib. primi dixi.

VEL VTI vbi primæ vertebrae patiuntur, licet raò, euenire, tamen interdum angina potest: idque in pueris magis, quam adultis, de qua Hippo. lib. D 5 secundo

secundo de morbis populariter vagantibus in hunc modum scripsit : erāt anginae passionēs huiuscemodi, cervicis vertebræ ad interna conuersæ sunt, aliis quidem plus, aliis verò minus, atque in partibus exterioribus, manifesta videbatur in ceruice concavitas: dolorem laborans, cū eo loco tangeretur, sentiebat. Accidit autem cuidam sub dente appellato, non eodem modo acutum est autem & quibusdam valde cōspicuum maiore peripheria, si simul cū vocato dente pharynx non phlegimone affecta, sed cōpressa aut, angustia affecta sit. Ea, quæ sub bucis erāt, tumebant quidem, sed inflammatione vexabantur. Glandulas nullus dolor cruciabat, sed naturali potius habitu permanebant. Lingua haud facilè movebatur, atq; aucta ipsis videbatur, atq; prominentior. Venæ sub lingua manifestæ: deglutire nisi magno cū labore nequibāt. At si vi quadā deuorare conarentur, per nares effluebat.

fluebat id, quod ingesserant. Ex naribus loquebantur. Spiritus ipsi non admodum sublimis. Nonnullis capitis, tēporum, atq; ceruicis venæ attollebantur: atque horum quibusdam redditis malignioribus, tempora paululū calebant, quamuis alioqui nō febricitarent. Plurimi non suffocabantur, nisi cum vel sputum, vel aliud quippiam deglutire tentarent. Nec intus subsidebant oculi. Igitur quibus tumor non in alterutram partem deflexus, sed rectus erat, nequaquā paralytici euadebāt. Horum si quempiam periisse mihi cōstaret, id referre grauarer minime: nā quotquot memoria nunc cōsequi possum, omnes superstitēs permanserunt. Atque alii quā celerrimē sanitati sunt restituti: alii non pauci, quadragesimū diem præterierunt. Insuper nonnullos febris omnino non arripuit. Plurimis etiam vsque in longum tempus, pars quædam tumoris protacta est, cuius rei signum, & a deglu-
tione

tione, & à voce, sumi poterat. Atq; eliqua
 te quoque columellæ, quanquam nihil ma
 li habere videbantur, malæ tamen signifi
 cationis nuntium præstabant. At verò qui
 bus in alteram partem vergebat, in ea par
 te, vnde vertebræ inclinabant, paralytici
 euadebant, atque hæc ipsa versus alteram
 trahebantur. Porro huiusmodi accidentia
 tum in facie tum in ore & intersepto secun
 dum gurgulionē perspicua erant. Quine
 tiā inferiores buccæ præ ratione mutabātur.
 Cæterū qui paralytici ab angina fiebant, iis
 non totum corpus, vt in aliis fieri solet, re
 soluebatur, sed vsque ad manus duntaxat
 malum procedebat, ab ea parte, quæ angina
 vrgebatur. Atque ii concocta quædam,
 eaque exigua, & non sine molestia expue
 bant. Præterea quibus tumor in rectitudi
 ne consistebat, ii expuere poterant. At ii,
 quos febris quoque infestabat, longe ma
 iori cum difficultate spirabant, ac inter lo
 quendum

quendum saliuam effundebant. Venæ ipsis attollebantur, atque pedes erant omnibus, maximè tamen iis, quã frigidissimi. Horũ si aliqui non illico mortui sunt, ii tamen erigere sese haud quaquam potuerunt. Verũ omnes quotquot equidem nouerim, mortem obierunt.

SCHOLIUM.

ANGINAE huius quæ vertebris ad interna vergentibus fit, mentionem fecit idem Gale. quarto apho. in cõmentatione illius sententiæ qua Hippo. inquit, si à febre habito collum peruertitur & vix potest deuorare sine vlllo tumore letale. Nã de ijs prorsus ægrotantibus differit illic Hipp. Atq; 2. epidemicon vt Ga. ipse in commentario testatur, & verba ipsa palam faciunt. Hæc angina non sine causâ accidit magis pueris quã adultis, quia fit vertebrarum ad interna tractus, docentibus Hippo. & Galeno tertio de articulis, tuberculis euellentibus cum ligamentis vertebrae, constat verò laxioribus & mollioribus ligamentis ossa puerorum contineri. Vergentibus ad interna primis vertebris, prima inquam & secunda fieri anginam, id est compressionem laringis (nam hoc loco omnem illius compressionem

fionem anginam vocat Hippo. et si sine inflammatio-
 ne fit) & extra excavationem, intro scilicet verte-
 bris extractis, nihil mirum. nec quidem mirum il-
 lic à tangentibus dolorem excitari, pulsus scilicet
 magis vertebrae, & compressis eo loco nervis. Verū
 quod addit cuidam accidisse, vitio vertebrae quæ
 est sub vocata dente, quæ est secunda, tertiæ scili-
 cet, non adeo est conspicuū. neque id aliter intelli-
 gi potest, quam productis verbis græcis, reperiūtur
 enim mille versionum modi apud Hippo. ita repe-
 rio scriptum ἡμ δὲ καὶ κατωτέρω τινὶ τῶ ὀσθόντος
 καλεόμενῳ ὀσθῶ, ὃ οὐκ ὁμοίως ὄξυ ἐστίν. ὃ δὲ δὲ οἷσι καὶ
 πάνυ περιφέρει, μείζονι περιφέρει, εἰ μὴ ξυῦ τῷ ἐ-
 δόντι καλεομένῳ φάρυγγι οὐ φλεγμένῳ σακειμένῳ δὲ.
 Hanc lectionē sequutus Ianus Cornarius ita trāstu-
 lit, erat autem & cuidam infra os dentem appella-
 tum, quod non similiter acutum est: quibusdā ve-
 rò etiam valde rotundum maiore circumferentia.
 Si non cum dente appellato, fauces non inflamma-
 tæ, verum iacentes, constat his verbis falsum pror-
 sum sensum exprimi. Nam tam longē abest, ut ver-
 tebra quæ est post dentem, secunda inquam, sit mi-
 nus acuta, & aliquando valde rotunda & maiori pe-
 ripheria quam priores, ut nihil magis repugnet sue
 magnitudini, & figuræ. Iam verò quod addit, si non
 cum dente appellato fauces non inflammatae, verū
 iacentes, neque ego video neq; Gal. vidit, nec alius
 quisquam, si priora verba ita legerentur, quid pos-
 sint significare. Gal. aut habuit alium codicem, aut
 ratione

ratioe ductus quedā immutauit, ita n. legit hoc loco
 ἢ ῥ δὲ καὶ κατωτέρω τινὲ τοῦ ὀδόντος καλεομένου ὁ
 ὄχι ὁμοίως ὅξυ ὄξυ δὲ οἷσι καὶ πάντι περιφανῆς, με-
 ζονι περιφερῆς, ἢ μὴ σὺ τῷ ὀδόντι καλεομένῳ, φάρ-
 γυ γὰρ φλεγμαίνουσα ἐγκειμένη δέ. Itaq; Gal. περιφε-
 ρῆς, id est rotundum scribit περιφανῆς, id est mani-
 fecta, & in enarratione huius loci hoc ipso ca. illud
 ὅξυ, id est acutum reijcit non ad os, vt Cornarius,
 sed ad πᾶντιμα, intelligens Hippocratem dicere
 malum non esse adeo acutum, haud quaquam nega-
 re os esse acutum. Hæc respiciens Copus ita translu-
 lit, accidit etiam angina cuidam sub ea vertebra,
 quam dentem nominant, verū non adeo acuta: qui-
 busdam verò ob rotunditatis magnitudinem, om-
 nino conspicua. Fauces autem si non cum vertebra
 quæ dens dicitur, inflammatione minime labora-
 bant, sed iacebant. Hic quod acutum ad anginā re-
 tulit, non ad os; bene fecit, sed nō debuit meminisse
 rotunditatis nec magnitudinis, nam si legendum
 est περιφανῆς non est in codice περιφερῆς, cur ergo
 ille omnia coniungit, obscurum reddens sensum,
 nam hic etiam significat maiorem rotunditatē esse
 tertiæ vertebræ quā prioribus. Iam verò quod ad-
 didit, fauces autem si non cum vertebra, quæ dens
 dicitur inflammatione minime laborabant sed iace-
 bant, nec cum prioribus quadrat, nec per se est ido-
 neus contextus, vt quiuus qui vel solam grammati-
 cam degustauerit, facilè intellget. Leonharthus Fuc-
 sius facilem reddidit sensum, sed nō video quē co-
 dicem

dicem sit sequutus, legit enim *περιφερές*, vt est apud Hippoc. & refert illud rotundum ad cauitatem, siquidem rotundum legendum est, melius multo facit quam Cornarius qui refert ad os, tamen non reperio ita apud Gal. sed *περιφανής*. quanquā ex his quæ Ga. addit toto hoc capi. non intelligas quam lectionem probet magis, manifesta angina, an rotunda cauitas. Sed satis est ita inueniri in græco codice Galeni. Verum quod addit Fucsius. Fauces cum dente vocata phlegmone haud quaquam laborabant, molestia tamen afficiebantur, sensum sibi ipsi parauit facilem, tamen non obseruauit autoris verba. Nam *εἰ μὴ*, significat nisi, ille verò excepit particulam excipiendi. Petrus Iacobus Stebe Valentinus, qui secundum epidemicon librum commētarijs, & propria versione est prosequutus, ita scripsit, erat autem & inferius cuidam, osse, cui denti nomen est: nec huic perinde fuit acuta. Quin & quibusdā valde conspicua maiore circumferentia, siquidem cum dente vocato fauces non essent inflammatae, verum iacentes. Verū hic videtur intelligere, Hippocratem loqui de angina quæ contigerit ex denti simili vertebra, tamē ille loquitur de tertia quæ est infra secundam, præterea ita interpretatur per fauces iacentes intelligere Hippocratem, non inflammatas, tamen nomen hoc *ἐγκείμενον*, significat quod iacet, si quando per analogiam de alia re dicitur, profectò dicitur de re molestia affecta aut afflicta, non de re quæ nullo malo laborat. His de causis ego nullam
harum

harum lectionum sequutus sum, sed aliter locū verti, vt opinor, verba autoris meliūs obseruans, & verum sensum exprimens. Ego enim intelligo Hippocratē asserere illa tépestāte quam describit multos laborasse angina vitio vertebrarum colli infra secundam, malum tamen non fuisse adeo acerbū, quā quibus in primis duabus vertebris erat: cēterū his quoq; malum fuisse manifestum, & cum magna excauationis externæ peripheria, nisi quibus simul cum illis vertebris denti similis euertebatur, aut fauces erant inflammata. Nam illis sine magna excauationis peripheria, erat malum manifestum, scilicet causa inflammationis faucium. (Nam *φάρυγγα* esse apud Hippo. fauces Ga. docet 4. aphor. com. 34.) quibus verò sine inflammatione erant fauces afflictæ, cōpressionē ab osse facta, magnæ peripheriæ fiebat excuatio, vides vt cadrēt modo verba. Erat cuidā (suple *πᾶν μὲν τῶν κυναγχίκων*, id est malum anginolorum) infra dentem vocatum, secundam scilicet vertebram, quod (intellige, malum) non similiter (ac in primis vertebris) acutum est. Est autē quibusdam (ita laborantium) valde conspicuū malum, aut conspicua angina (nam legunt quidam *περιφανὴς*, quidam *περιφανὲς*, & nihil refert) maiori peripheria (excauationis externæ) nisi simul cum vocato dente (euerſo simul cum inferna vertebra) fauces non sunt inflammatione affectæ, (nam ita sine excuationis magna peripheria sit malum graue) sed compressæ aut angustia affectæ. Nam hæc omnia

E significa

significat dictio ἐγκυμένη. Nec verò est quod mire-
 re, tã multis esse opus ad enarrationẽ breuissimẽ di-
 ctiunculæ, est enim Hippo. non Galeni. Vbi ego le-
 gi, redditis malignioribus, legunt alij recrudescen-
 tibus, alij malignis, dictio græca est παλιγκοτάτοι-
 σιν, significat verò πάλικος, vt græca linguæ pe-
 ritissimi quique testantur, qui irascitur, verum per
 methaphoram ab Hippo. dicuntur morbi, qui cum
 videntur debere sedari, maligni fiunt παλικότα-
 τες. Testis est Galenus in commenta. libri secundi
 de articulis, ita enarrans quædam Hippoc. verba.
 τὰ κακοῦν παθήματα παλικότα καλεῖ, καὶ τὸ πα-
 λιγκοταίειν τὸ οἶον παλικακοῦν εἶναι. Certè me-
 thaphora eadem vtuntur Latini & Hispani, nam a-
 pud illos homo ita percitus dicitur seuire, mor-
 bus quoque dicitur seuire, apud hos etiam homo
 & morbus dicitur, furioso, y enconado. Nomine
 intersepti secundum gargareonem nihil aliud in-
 telligo, quam gargareonem ipsum, siue colu-
 melam. Hoc ipsum puto dixisse Hippocratem κά-
 τα γαργαρίωνα διαφράγματι significantem gar-
 gareonem ipsum esse quoddam septum inter par-
 tes palati & faucium. Vbi dicitur atque eliqua-
 tæ columelæ, in græco codice apud Hippocratem
 inuenimus κοῖνες τε τικώμενοι μινύθσιν τινὰ πα-
 ρεικόν, πονιρόν ὁδὲν δοκέοντες κακόν ἔχειν, quam
 lectionem sequutus Staue Valentinus, ita translu-
 lit, columelæ tabescentes, minutionem quandam
 ostendebant: quanquam nullum grauius malum ha-
 bere

bere videbantur. verum non dicit in commentariis cur sint redditæ columelæ tabidæ & minutione perpeſſæ. Non enim ſatis eſt dixiſſe columelas ad ſympathiam trahi, niſi dicas, qua cauſa hoc affectu magis quam illo laborarint. Nam ſi reſolutæ ſunt, laborabāt, ita quoq; ſympathia. Nec debuiffet uſq; adeo verbis codicis operum Hippocratis, qui circūfertur, hære, cū ſit à Galeno emendatus, aut cū Galeni ſcripta prodant fuiſſe illum codicem à tempore Gale. corruptum. Nam Gal. pro *πονιρὸν* legit *πονιρὴν*, itaque redditur ille ſenſus quem ego expreſſi, columelæ reſolutæ malā ſignificatione præſtabant, quanquam nullum malum videbantur habere. Certè ex verbis his quæ ex Hippocra. profert hoc loco Galenus, facile eſt intellectu quantum corruptionis attulerit vetuſtas græcis autoribus, utq; maioris laboris ſit autoris genuina verba inuenire, quam inuenta enarrare. Conſtat non minus quantum careat adiumento ad bonorum autorum lectionem medicus qui idiomate græco eſt deſtitutus, non enim in dictis verbis ſolum eſt varietas, ſed & ubi ſcriptum eſt, inter loquendum ſaliuam effundebāt inuenio apud Hippocratem dictionem hanc *ἀλλοχόοι*, id eſt delire loquentes, quam lectionem ſequutus eſt Ianus Cornarius, tamen Galenus aut emēdauit, aut in ſuo codice legebat *σιν αλλοχόοι*, id eſt ſaliuam effundentes.

TO T A M hác sermonis seriem in 2.
 libr.eius commentarii, quẽ in secun-
 dum librum de morbis populariter
 vagantibus perscripsimus ad verbum fere
 enarrabimus. Atque idcirco eam totam hic
 inferuimus, eo quod Hippo. multis ostẽdit
 accidisse, anginam nobis rarò visam nullo
 existente in summo gutture propria passio-
 ne. Quinetiam quod circa primas oritur
 vertebra, à quarum altera pars quædã de-
 ntiformis vocata procedit. Vnde nõnulli ip-
 sam totam vocauere dentem. At nunc sub
 hac quoque vertebra (inquit) factam quidẽ
 anginam, sed non æquẽ acutam, vt ea, quæ
 circa secundam fieri solet. Siquidẽ constat,
 quod spinæ medullæ partes, quo fuerint
 altiores, eo sunt præstátiores. Si verò mul-
 to inferiori duabus primis vertebriis ea ipsa
 affectio fiat, tantò etiam minus infert lesio-
 nis. Nam ex arte secandi corpora didicimus
 septi transuersi neruos sub quarta ac quinta
 vertebra

vertebra emergere. Præterea ex commentariis de spirationis causis, edocti sumus, liberã spirationem à solo fieri septo transverso accedente ad hanc intercostaliũ quoque musculorum actione, vbi videlicet vehementiori opus est inspiratione. Quod si vehemētissima inspiratione indiguerimus, sublimos etiam musculos cōcurrere oportet. Verũ non solum ob magnã aut maximam spirationem, horum musculorum actionem requirimus, sed ob alias quoque causas, de quibus latius in libris de dyspnœa iam dictũ est. In præsentia verò satis fuerit, à præscripto Hip. sermone tantũ accipere, quantum ad patiētium locorum notitiam necessarium est : si prius eius verbi, quod in libro de articulis à nobis explicatum est, meminerimus, vbi inquit: vertebrarum autem, quæ in spina sunt, quæcunq; per morbos in gibbũ trahuntur. Vult nimirũ nõ solum ad interna vertebrarum luxationem

quam λόρδωσιμ vocant, sed eam quoque qua retro vertebræ labuntur, comitari tensiones, quæ ad partes fiunt internas, trahentibus, qui ibi præter naturam consistunt, tumoribus nervosa corpora. Igitur ubi unica dumtaxat vertebra, aut etiam duæ aut tres sese deinceps consequentes distrahuntur, ea parte spinam cavari contingit. Ubi verò inter distractas vertebrae vel una, vel plures illæ se permanserint, sic patientibus gibbus accidere solet. At si in alterutram partem, vel dextram, vel sinistram distrahatur, ibidem inobliquum torquebitur spina, atque in eo, quæ præmissimus, sermone, utriusque mentionem fecit Hippo. Repanditatis quidem, (λόρδωσιμ Græci vocant) cum dixit, quibus secundum rectitudinem tumor erat. obstipitatis verò (vocant σχωλοίσιμ) dicēs: quibus verò in alteram partem vergebat. Porro exactè admodum atque vtiliter nobis (si legerimus) hæc conscripsit: π λόρδωσιμ quidem neminem fieri paraplecticum, quod est parte aliqua resolutum, per scoliosin

hiofin autem fieri dicens ad manus vsqꝫ. Significās ipsum ad infernas partes, vt costas, lumbos, crura non posse descendere. Imprimis itaqꝫ hoc nobis sciendū est, alia quidem sequi accidentia, laborante spinali medulla propria passione, siue id ex sola intemperie fiat, siue simul humore quopiā affluente, vt in erysipelate, inflāmate, atqꝫ vlcere putri: alia verò, vbi vel vna, vel plures vertebræ afflictæ luxantur. Quippe vbi propria passione spinalis medulla laborat, siue id in dextra, siue sinistra parte eueniat, citra tamē vertebrarū luxationē: siquidē in altera parte dūtaxat patiatur, omniū inferiorū corporis partiū, quæ ē directo nocumēti cōstituuntur, tam sensus, quā motus læditur. Si verò vtrāqꝫ pars patitur, omnes particulæ tã in dextra quā sinistra parte, ei, quæ læditur, subiectæ, similiter resoluūtur. At luxata vel ad gibbum, vel ad concauum vertebra, fieri potest, vt nulla omnino partium infe-

riorum , vel in sentiendi , vel mouendi facultate vitium percipiat. At qui fieri etiam potest, vt lædatur , eo videlicet modo, qui ab Hippocrate in libr. de articulorum passionibus definitus iam est. Quum enim angulosa (vt ipse nominat) fit spinalis medullæ luxatio, id est cum non paulatim, sed affatim, perinde ac si frangeretur , pars aliqua curatur, subiectas partes omnes lædi necesse est. Paulatim verò facta luxatione, atque in orbem magis, nihil notatu dignum patiuntur partes , quæ commotæ vertebræ supponuntur. Sed in oblicum luxatio , lædit omnino eas partes, ad quas nerui ex luxatis vertebris procedentes, perueniunt: idque magis in ceruice, in thorace minus, sed multo minus in lumbis accidere solet. Siquidem in ceruice, vertebræ inter se connexæ æqualiter utrequæ conferunt foramini , vnde nervus procedit, in thorace autem superior magis, inferior minus.

nus. Sed in lumbis, totus nervus ex superiori exit vertebra, vbi si obliqua eueniat vertebrarum luxatio, eadem secum trahens & spinalem medullam & nervum, illæsum seruat ipsius secundum naturam ortum. In ceruice verò, ex loco medio inter duas vertebra procedentes nervi per obliquas luxatiões, in ea quidẽ exortus parte, ad quã spina ipsa deflectitur, opprimuntur, in altera verò tenduntur. Porro tensiones quidem, vbi ingens quoque inflammatio accesserit, conuulsio comittatur, ad compressiones verò earum partium, ad quas oppressus nervus peruenit, resolutio sequitur. Igitur non ab re in ea angina, cuius in præmisso sermone historia narrata est, ad manus vsq; superuenit resolutio, vt pote procedentibus nervis ex fine ceruicis ad manus. Quippe sub ceruice thorax est, à cuius vertebris emergentes nervi non ad manus, sed ad spatia intercostalia transmittuntur, paucis, qui ex

E s primis

primis procedunt, exceptis igitur per eas, quas nuper diximus, vertebrarum luxationes, reliquæ faciei partes omnes, neq; in sensu, neque in motu noxam subeunt. Porro buccæ duntaxat sine mandibula læduntur, ut quæ à musculo lato mouentur. Constat itaque quòd musculi, quibus mouendi, vis aduenit per nervos qui à cervicis vertebra orti, in ipsis disperguntur, noxam non evadunt, si & spinalem medullam, & provenientes ab ipsa nervos, passio quæpiam infestauerit.

S C H O L I V M.

VBI ego legi, si verò multo inferiori primis duabus vertebra ea ipsa affectio fiat, tanto etiam minus infert læsionis. Legit Copus quem sequutus est Fuchsius. Quo inferior primis duabus vertebra fuerit affectio, eo minorem infert noxam. Itaque hi volunt Galenum, illud vniuersim docere, quo humilior est luxata vertebra, eo minorem læsionem fieri. Qui quantum intelligo priora verba respexere. Nam mox dixerat, constat spinæ medullæ partes

partes quo fuerint altiores eo esse præstantiores, ex quibus videtur statim fieri, vt quo vertebra fuerit humilior, eo læsio sit minor. Sed videntur mihi hi homines cogere autorem incaute in sententiam omnino falsam, & in inaptum sermonem. Ita enim scribunt. Proinde quo inferior primis duabus vertebri fuerit affectio, eo minorem inferet noxam. Nam ex arte secandi corpora didicimus, septi transuerſi nervos sub quarta ac quinta vertebra emergere. Quo modo quadrent verba hæc vltima primis? An quo noxa sit eo minor, quo vertebra est inferior, causa est nervos septi transuerſi oriri sub. 4. & 5? Immo hinc fit illius cōtrarium. Nam si nerui diaphragmatis ortum habent sub quarta & quinta vertebra, maius malum erit viciari quartam, aut quintam, quàm tertiam, quandoquidem, hæc non tollet respirationem, illæ tollent. Tamen constat quartam aut quintam humiliorem esse tertiam. Ego quidem ita mihi persuadeo, cum Galenus docuisset inferiores, minores noxas efficere quàm superiores, voluisse excipere quartam & quintam: significareque has maiores noxas facere, dicta de causa quàm tertiam. Nam hoc verissimum esse credo si quid aliud. Quibus ergo verbis illas excepit? His ἔα μὲν οὐκ πολὺ κατωτέρω γένηται τῶν πρώτων δύο σπονδύλων ἢ αὐτὴ διάθεσις, ἔτι καὶ μαλλωρ ἢ πλεον ἀκολούθησεν ἢ βλαβη. μεματέταρτον καὶ πέμπτον σπονδύλον ἐκφύει. Id est, si verò multo inferiori duabus primis vertebri fiat ea ipsa affectio, tanto etiam minus inferet læsionis.

laesionis. Didicimus enim, nos ex anatome nervos septi transuersi infra quartam & quintam vertebram nasci. Itaque illud asseruit Galenus. non de quibusvis vertebris, sed de multo inferioribus duabus primis. Ac respondens tacitæ obiectioni, cur scilicet, non id, & in paulò inferioribus ita accideret, adiecit, nam ex anatome didicimus nervos, septi sub quarta & quinta nasci. Nomine sublimium musculorum intelligi debent qui in supernam partem thoracis veniunt, partim è clauicula, partim è colli vertebris, partim ex spatula. In principio tertij commenta. in libell. de articu. inquit Galenus, tres esse luxationum spinæ modos, ad interna, hūcque vocari ab Hippocra. λόρδωσις. (latini vocant repanditatem), aut ad externa, vocarique κύφωσις, aut κύνετ[?]ωσις (latinis est gibberus) aut ad alterum latus vocarique σκωλόωσις (est latinis obstipitas) docet non minus eo loco gibberum fieri à tuberculis crudis, non quidem, vt nonnulli ante Galenum putabant tuberculis illis incumbentibus in ossa ipsa, atque ita pellentibus illa à suis locis, sed contractis ligamentis ossium, atque ita ossibus ipsis euulsis.

VERV'M qui & quales sint huiusmodi muscoli, ex nervorū, qui à spinali medulla oriūtur, dissectione didicistis, veluti alia quoque cognitu necessaria
accidentia

accidentia, quæ sequuntur, vbi spinæ ipsius
vertebræ, vel in gibbum, vel concauum, vel
etiam obliquum luxantur, ex secunda parti-
cula commentariorum, quos in librum de
articulis edidimus, omnia cum propriis de-
monstrationibus accuratè conscripta habe-
tis, quorum summas in præsentia comme-
morasse operæ præciū fuerit. Equidem nō-
nulla iam percurri. Superest itaq; vt ea quæ
nondum tacta sunt, tractemus vt nihil ora-
tioni nostræ deesse videatur. Porro scire de-
betis, vertebra à suo positu luxari, aut ob-
casum, aut ictum, aut tumorem præter na-
turam, nervosa corpora, vertebrae ipsis, at-
que spinæ medullæ insita, extendentem.
Horum duo sunt genera. Aliud N. est par-
tium quæ sunt secundum naturam, aliud ea-
rum quæ præter naturam, quæ Hipp. vno
nomine comprehendens cruda tubercula
nominavit. Igitur manifestum est, quod in
prima constitutione, quem libr. 2. de vulga-
ribus

462 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
ribus morbis descripsit, ceruicis vertebris
adiacentes muscoli patiebantur: potuit etiā
tuberosus aliquis tumor accedere, ob quem
concocta nonnullos scire dicit, facta vide
licet tuberum concoctione. Cur igitur eos
anginosos appellauit? An quia difficulter
spirabant, nullo existente, vel in thorace,
vel pulmone vitio? Quippe hac in re dif-
fert anginæ concursus, à peripneumoniæ &
lateralis morbi cōcursu: atque in eo quod
angustiae sensus in summo gutture est.

SCHOLIVM.

NOXAE quæ ex vertebrarum luxatione fiunt,
vt licet videre apud Hippo. libell. de articu-
lis, partim sunt communes omnibus vertebrarum
luxationibus, quocunque in loco illæ fiant, partim
sunt propriæ pro ratione loci in quo sunt. Commu-
ne est omnibus, cū, antequam totum corpus ad iu-
stam molem creuerit, contingunt, partium circa læ-
sionem, incrementū prohibere. Itaq; qui in lūbis acci-
piūt lēsiōē: coxas habēt impostērū graciles, qui in
dorsō, habent angustum thoracem, quo fit vt his
angustus & prominens thorax fiat. Qui in collo ac-
ceperint læsionem, perinde in collo afficientur.

Hinc

Hinc nascuntur propriæ singulis partibus noxæ, causa vicinarum partium. Vt qui in collo habet luxationem, patiuntur anginae speciem illam, & scripta hoc loco accidentia. Qui in thorace, habet difficilem spirationem, & vocem stridulam, & caput repandum versus dorsum, in prima & secunda vertebriis, & habent tubercula cruda circa pulmonem. Qui in lumborum regione habent luxationem, hi pati solent malum renum, & vesicæ, & in ijs regionibus multas suppurationes. Et fiunt impotes generandi, & imberbes, & impubes. Hæc omnia contingunt magis ijs qui luxationem acceperunt tenelli adhuc, quam quibus grandioribus iam factis. Vbi nos legimus horum duo sunt genera. Aliud enim est partium quæ sunt secundum naturam, aliud earum quæ præter naturam, quæ Hippo. vno nomine comprehendens, cruda tubercula nominavit, Fuchsius legit horum duo sunt genera. Aliæ N. sunt partium quæ secundam naturam se habent, alij verò tumores quidam præter naturam, quos Hipp. vno vocabulo comprehendens, cruda tubercula nominavit. Itaque Fuchsius illud præter naturam ad tumores retulit, non ad partes. Qui primum omnium autoris verba minime observavit. Deinde a methodam diuisionem illi imposuit. Nam vt primum ostendam, Gal. ita inquit, *Ἀπὸ δὲ δυνάμεως γίνονται ταῦτα. τὰ μὲν ἕτερα τῶν κατὰ φύσιν μορίων. τὰ δὲ ἕτερα τῶν παρὰ φύσιν ὀγκοειτνῆς, οὓς ἐπικράτης ἐνὶ περιλαβῶν ὀνόματι, κέκληκεν ἄπειτα φύματα.* constat verò illa
verba

verba, τῶν πάρα φύσιν, nihil aliud referre, quàm
 μορίων, nam quid aliud quòd referre possint, an-
 tecefferat? sed esto vt vult, quid significabunt illa
 verba? Duplex genus illorum tumorum primum, tu-
 morum qui sunt in partibus naturalibus, vt si inflā-
 metur musculus, alterum, tumorum qui sunt præter
 naturam, vt tubercula cruda. An inflammatio mus-
 culi est tumor naturalis? non certè. Est ergo tumor
 præter naturam. Quæ est ergo ista tua diuisio, cum
 altero membro ambo contineantur? Nimirum om-
 nes illi tumores sunt præter naturam. Dices omnes
 sunt tumores præter naturam, sed non sunt omnes
 tubercula cruda. Cur ergo primum genus appella-
 uerit partium naturalium? An non tubercula cruda
 sunt tumores præter naturam partium naturalium?
 Nam tubercula illa sunt in ligamenti ossium, aut
 proximis illis partibus, quæ non minus sunt secun-
 dum naturam quàm musculi. Itaque illa verba ni-
 hil possunt continere Galeno dignum. Quid ergo si-
 gnificant? tumor potest fieri substantia quapiam na-
 turali plus satis aucta, vt fit in oculo pterigium (i.
 huius operis libr. hæc docuit Gal.) aut redundante
 illic substantia quapiam quæ sit præter naturam, vt
 excremento aliquo. Ergo potest fieri vt vertebra
 luxetur in cartilagine quapiam, aut ligamento, aut
 neruo genito fungo, qui subcrescens ligamenta
 euellat, aut genito tuberculo crudo, quod fit excre-
 mento crasso illic congesto.

Præterea

PRÆTEREA in prognostici libro videtur angine nomine appellare omnes p[er]siones huic loco accidētes, quas spirandi diffīcultas comitatur. Inquit enim angina piculosissima est, celerit[er]q[ue] enecat, si neque in faucibus, neque in ceruice quidquam apparet, si dolor vehemens est, si vix spiritus erecta ceruice trahitur. Etenim eodem die iugulat, licet interdum vsq[ue] ad alterum, aut tertium, aut etiam quartū protrahatur: quæ in reliquis non minore quidē dolore afficit, in faucibus verò tumorem, ruboremque excitat, superiori non minus periculosa est: sed lōgius spatium habebit, præcipue si vehemens fuerit rubor. Sed iū præcipue malum prolongatur, cum non solum fauces, sed ceruicem quoq[ue] rubor occupat. Maximè verò potest ab ea secunda valetudo contingere, si rubor simul & ceruicem & pectus compræhendat, neq[ue] ad interna reuertatur erisipelas. Igitur ex iis ver-

F bis,

bis, haud dubia coniectura est, omnes passion-
 es, quæ huic loco accidunt si spirationē
 quoquo modo reddant deteriore, ab ipso
 cynanchas, id est, anginas nominari: nondū
 solitis medicis cynanchen per K, cynanchen
 verò per S. nominare. Tantum abest, ut vel
 paracynanchen, vel parasynanchen dice-
 rent. Quippe tūm primūm homines res
 ipsas neglexerunt, cūm nimio studio nomi-
 na querere inciperent. Itaque quatuor inue-
 tis nominibus, quatuor passionēs significa-
 ri dicebant. Ac notas ipsarum scribentes, ge-
 nus illud, quod supra tractauimus, cūm ser-
 monem ex libro vulgariū morborū 2.
 explicaremus, omnino dereliquerunt. Atq̃
 hæc sunt quatuor earum genera. Primūm,
 vbi fauces inflammantur. Fauces voco, in-
 ternum oris locum, vbi simul conueniunt,
 & gulæ, & summi gutturis partes extremæ.
 Alterum, cūm neq̃ fauces, nec reliquæ oris
 partes, neq̃ etiam externarum partiū vlla
 inflamma-

inflammata videtur, laborans tamen suffocationis periculum in summo gutture sentit. Tertium vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum vbi summi gutturis partes, tum externæ, tum interiores similiter patiuntur, ac superest adhuc alia cervicis passio, quam ipsi silentio præterierunt, vbi ad anteriores partes vertebræ luxantur, idque vel solis interdum musculis, qui cū ipsis communicant, tumore præternaturam laborantibus, vel nato ibi tuberculo, interdum etiam gula pariter vitia ta. Nonnunquam musculis quoque, qui gulam summo gutturi iungunt. Quinetiam propriis aliquando summi gutturis musculis, qui ipsum apperiant, oblæsis Per omnes id genus passiones, spirandi quidem difficultas oboritur: sed citra suffocationis periculum laborantes difficulter deglutiunt, atque dolore afficiuntur: idque præcipue cū potus eis per nares resilit. Accidit etiam in-

F 2

terdum

468 DE LOC. PAT. G. CVM CHO.
terdum vt excedente inflammatione, & lin-
gua, & fauces in tumorem attollatur, quẽ-
admodum & Hipp. ipse tradidit. Verum
huiusmodi cognitionũ affectuum enarra-
tio, proposito nostro nihil cõferre videtur,
nã & lingua patiẽte actiones deperduntur.

SCHOLIV M.

LARYNX habet docente Gale. libr. 7. de vfu
part. cap. 11. decem & octo masculos, vel vt alij
putant viginti, 12. proprios, reliquos cõmunes, pro-
prij sunt, qui soli sunt laryngis, cõmunes, qui sunt
illi cum alijs membris communes. Horum duo sunt
communes laryngi & osi yoidi, duo laryngi & osi
pectoris, duo laryngi & gulæ. Sed hæc cap. 6. lib. 1. di-
ximus fusius.

CAP. VI.

Relectiuncula.

*Hoc capite regulam quandam tradit, qua cum actio
lesæ est vnica, & loca malè affecta possunt esse plura co-
gnoscamus, cuius partis morbo ea lædatur. Regula verò
est ex varietate symptomatũ aliorũ quæ actioni læsæ ad-
iuncta sunt, Nam quanquam fieri possit, vt diuersarum
partium morbi idem symptoma afferant, tamen habebunt
multa alia diuersa singuli sua. Ergo reputās medicus actio
lesæ,*

læsa, quæ occurrit, quot partium vitia sequi possit, ac cuiusq; partis læsio in quæ alia symptomata soleant accedere, ex ijs quæ adsunt, aut non adsunt, facile potest colligere, quæ sit malè affecta pars. Proposita hac regula. Deducit nos ad exercitationem, in primis in respiratione sublimi, deinde in multis alijs. Respiratio sublimis potest, ardente calore, angustia viarum, debilitate septi transversi fieri. Quum prima causa sit illa respiratio, accedit febris ardens, & illius symptomata: cum secunda, accedit sensus angustie in larynge, aut bronchijs pulmonis, aut signa destillationis magnæ è capite: cum tertia nihil aliud quàm veluti pondus quoddam in regione septi transversi. Si quis ergo sublimem habet respirationem cum febre ardente, ex febre putandum est malum fieri, si cum sensu angustie ex angustia, si sine his ex debilitate. Deinde profert multa exempla debilitatis spinæ medullæ, ac rursus monet, quòd supra docuit, considerari debere an pars aliqua sola laboret, an multæ simul, ac opus esse peritijs anatomes, cuius ignorantia inquit fieri, vt multi medici peccet in curatione.



T vbi vnica duntaxat actio læsa est, & sedes patientes plures, tùm nostri instituti est, vt reliquorum accidentium varietate eas discernendo inueniamus. Quippe nullo spiritalium instrumentorum quoquo modo, nec primario, nec per consensum patiente, fieri minimè

potest, vt spiratio lædatur. Quum itaque multa sint spirandi instrumenta, ac numerosa quoque partium multitudo, quibus ipsa consentire consueuerūt, non ab re multa discretionē indiget is, qui & primario patientes & cōsentiētes sedes inuenire conatur. Igitur ex sola spirādi specie, illico nōnihil & de patiente sede & de ipsa passione coniicere licet. Quippe si videatur laborās, inter spirādum, totum mouere thoracem, vt in parte quidem anteriori ad iugulum, in vtroque latere ad summum humerum, in parte posteriore ad scapulas vsq̃, motus ipsius accendat, tres ex huiusmodi spiratione passionēs significantur vna est flammica in pulmone, atque corde caliditas. Altera in aliquo spiritalium instrumentorum angustia. Tertia est facultatis mūsculos thoracis mouentis debilitas. Quumque huiusmodi spirationē conspexeris, imprimis arteriæ pulsationē perpēdere oportet. Hæc N. quā multus sit

fit calor indicat. Atq; de iis in libro de præ-
sagiis à pulsu iā scriptū est. Deinde expira-
tionē ipsam cōsidera an multa, an frequēs,
an exufflando fiat. Postremo thoracē in pe-
ctore tange, quē si ardentē inueneris iā om-
nes copiosi caloris notaste habere nō dubi-
ta. Quibus ex abūdātia accedit, faciei, ocu-
lorumq; rubor, capitis ardor, sitis vehemēs,
lingua arida, & salcibrola, dicēte infirmo ar-
dere sese. Vbi verò incendii signis modū ler-
uātibus, thorax vehemēter dilatatur, angu-
stiam in ipiritibus instrumētis esse portē-
dit. Itaq; cōsideres oportet, an summū gut-
tur laboret, an pulmo, an thorax ipse hu-
moribus impleatur, an tubercula in ipsis na-
ta sint, quo in genere etiā abscessus numerā-
tur. Atqui lūmi gutturis passiōes, tū prima-
rias tū eas, quibus p cōlensum infestatur, iā
pcurrimus. Pulmonis autē thoracisq; vitia,
paulò pōst accuratius persequemur. Nā in
præsētia spinæ medullæ dūtaxat passio-

nes tractare proposuimus, tū alias, tū in illas quæ ei per imbecillitatē vocatā accidere solēt. Porro solet imbecillitas accidere, interdū cerebri vitio, vt pote à quo & sentiēdi, & mouēdi facultatē recipit. Interdū ipsa dūtaxat spinali medulla primaria passione laborāte: idq; ob peculiarē intēperiē, vel toti ipsi, vel diuersis ipsius partibus adueniētē, quā vulgariū medicorū mētes nequaquā cōprehēdere valēt, cū tamē creberrimē videāt laborātes quosdā adeò exolutos, vt vix digitos possint mouere quāuis omnibus thoracis partibus spiritus trahatur. Nullo ardēte calore ad magnā spīrationē ipsos cogēte. Id verò ob huiusmodi causas eis accidit. Nā dū quiescit animās, liberā spīrationē solū septūm trāsuersum, modo valeāt vires, efficere solet. Vbi verò ob infirmitatem spīrādi munus perficere non valet, tū intercostaliū musculorū cōcurrit auxiliū. Quòd si pręterea maiori animal inspīratione egeat, tū sup-
perni

perni musculi omnes, quorū maximi scapulas secū manifestè mouēt, ad spirandi actionē requirūtur. Quum itaq; hominē spirādi opus omnibus thoracis partibus perficere videris, non fuerit tamē frequēs inspiratio, quantum thorax dilatetur perpende. Insuper & narium pinnas considera. Nam & has ipsū contrahere comperies. Dilatatur autem thorax quidem, verū non similiter vt in ardētibus febribus, cū adhuc valent vires. Nam in iis magna ex parte totus thorax dilatari consuevit. Neq; etiam vt in illis, quibus id euenit ob aliquam spiritalium instrumentorum angustiam, vt in angina, atque dispncea, quam fluxio affatim descendens induxit. Nec quibus ab vtraque causa prouenit, vt peripneumonia. Quippe hoc morbo affecti, & maxima & frequentissima spiratione vtuntur. Cæterum quæ admodum ob virium infirmitatem, ita ob vnius quoque particulæ particularem infirmitatem

F 5 becillitatem

becillitatem, omnes thoracis partes dilatari coguntur. Igitur exercitiorum magister Secundus nomine, qui satis quid pateretur intelligebat, sentire se manifestè in septo transverso dixit imbecillitatem. Atque idcirco cogebatur intercostales musculos sine intermissione mouere, atque nonnunquam superiores quoque, interdum autem zonam circumdans præcordiorum partibus, sola transversus septi motione, sufficienter inspirabat, quo tempore quiescebat. Verùm an septi transversus musculus, an ad nervos, qui ad ipsum perueniunt, an ad aggregatum ex utrisque pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidè explicatu perdifficile videtur. Idè inspirationis genus etiam in alio quodam notavi, quem cum aliquando equus in præcordiorum regione calcitraffet adeò atrociter, ut oborta in septo transverso inflammatione, mortis periculum immineret: is licet euaserit à periculo tutus, ab imbecillitate ta-

men

men liberari nequiuuit. In alio etiã qui à vehementi peripneumonia cõualescebat, brachii tam externæ, quam internæ partes, à cubito ad summos vsque digitos, sensus difficultate laborauerunt, atq; motus non nihil læsus est. Hinc nerui, qui in primo, atq; secundo intercostali loco inueniuntur, noxã subierũt. Quorum primus non contemnendæ magnitudinis, per intimas partes abditus defertur, sed ei qui ipsum præcedit, admistus, atque multifariam diuisus, vt in arte secandi corpora videre est, cuius etiam partes aliquæ per interiorem cubiti regionem, vsque ad digitorum extrema perueniunt. Alter verò neruus tenuis quidem, nullique admistus, per axillam sub cute ad brachiũ defertur, dispersus per cutis tam exteriores quam internas partes. Huic homini celeriter sanitas reddita est adhibito medicamento ei loco vnde nerui prodeũt, iuxta primũ, ac secundum intercostale spatium. Iam sanati

nati sunt quoque nonnulli, quibus vtrumque crur paululum resolutum erat, adaptato lumbis medicamento, in eo spinalis medullæ loco, vnde cruribus nervi adveniunt, nullum resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsorum, sed medullæ propria erat passio. Vidimus aliū, cui magna oborta suppuratione in altera nate, iuxta cruris initium, nervi eiusdem cruris per incisionē nudati sunt: sed ea parte sanata, toti membro mouendi difficultas accidit. Itaque cōficiens durum quippiā à priori inflammatione in nervo derelictum, quod huiusmodi passionem induxerit, patienti loco idoneum medicamen adhibendo, hominem perfectè sanavi, quod autem de partibus faciei dictum est, id de reliquis quoque omnibus est intelligendum. Quippe vnica duntaxat pereunte actione, solum musculus, qui ipsam efficere solet, aut nervum ipsius, laborare putandum est. At vbi plures actio-

nes vitiatæ sunt non eodem in loco, accidit interdum, omnes musculos à communi aliqua causa lædi. Fieri etiam potest vt nervus aliquis, qui musculis illis cõmunis est, patiatur. Præterea piscator quidam, cùm in fluuio pisces venaretur, adeo circa sedem & vesicâ infrigidatus est, vt ipso invito effluerent, & alui excrementa & vrina. Atque hic quoque per calida remedia patientibus musculis adhibita, celeriter sanus euasit. Item aliis eisdem molestatus accidentibus sine tamen manifesta causa, læsis circa os sacrum nervis, multò tẽpore per multa præsidia, vix sanatus est. Igitur quod protinus ab initio dicebam, illius nunc quoque mentionem faciendo ad alia me diuertam. Etenim si ex arte, quæ corpora secare docet, ad quam particulam descendant singuli nervi, à spinali medulla prodeuntes, cognoueris, patientes sedes quam facillimè inuenies. Ex artis itaque operibus horum omnium examen

men re ipsa depræhēdistis. Namque sæpe numero vidistis ex huiusmodi notitia, manifestè iuuari laborantes. Quippe non solum crura, & manus temerè, ac frustra vulgares medici, tota die, noctūque, calidis medicamentis illinūt, prætereuntes locum, vbi vel spinalis medulla, vel neruus aliquis ex ipsa emergens, læditur, verumetiam caput cuiusdam non ita pridem, impositis medicamentis vehementer calidis, vlcerarunt, putantes sensum ipsius grauiter læsum, hoc pacto posse reuocari. Atque hunc ipsum sanauimus, inuenta sede patiente, tum ex reliquis accidentibus, tum ex eidentibus causis. Nam super singulis interrogauimus. Quorum vna huiusmodi erat: cū sub multa pluuia, ac vento impetuoso ambulasset, pallium circa ceruicē madefactum aiebat, adeo vt vehemens se frigus in ea parte pati sentiret. Itaque si scieris ex primis spinæ medullæ vertebris,

quatuor

quatuor neruos ad caput ascendere, à quibus pellis ipsum ambiens sensum accipit, facile sedem patientem inuenies. Hac igitur sanata, capitis quoque pellis pariter sanata est: vt potè quæ nulla primaria passione laborabat. Medici verò neq; huiusmodi neruos, neq; eos qui per singulas cutis partes dispersi sunt, cognoscentes, quamuis præsentaneum sit eis remedium, quod minimæ particulæ iuxta nerui initium, adhiberi deberet, ipsi partes illæfas multò negotio molestant. Ego verò sæpenumero vos monui, alios quidem in ipsa spinali medulla, veluti radicem habere, alios verò, vt ex magnis ramis, atq; ipsis quoque è spinali medulla exortis, procedentes, qui rursus diuisi distribuntur. Atq; alii p valde multas cutis partes, alii per pauciores. Quo magis miror dissectores ipsos, illos non cognoscere, atque in neruorum resolutione querere, quam obcaulam resolutarum partium non semper

&

& motus, & sensus pereat: sed aliquādo sensum duntaxat, aliquando & sensum, & motum simul deperdant. Arbitrantur namque nervorum, qui per musculos dispersi sunt, reliquias, ad cutem tendere, cumque diuisus per musculum nervus laborat, siquidē vehemēs fuerit vitium, & sensum, & motū simul lædi, si leuius fuerit in alū, seruari quidem sensum, vt potè qui non tantum roboris desideret, motum verò eo quod robustis egeat viribus, perire. Interdum enim vnus musculus, vel totum crus, vel manum mouet, ac proinde viribus indiget, qui si ita patiatur, vt munus suum perficere nequeat, membrum ipsum immobile relinquit, sentiendi verò facultas partium passiones discernens, illæsa, tunc permanet, vt quæ nō ita validis egeat viribus, nam pati non minus, immò plus etiam contingit imbecilibus. Cognitio autem passionis fit sufficienter, & per debilitatem facultatis: effi-

cit

cit tamen imbecillitas, ut facilius passio à sensu dignoscatur. Igitur ratio ipsorum in huiusmodi quidem nervorum resolutione probabilis esse potest: ubi verò perdita sentiendi facultate, motus non perit, nonnulli quidem adeò vanas adduxere rationes, ut satiùs fuisset eos conticescere: nonnulli verò cognita huius questionis difficultate, nō grauati sunt dicere huiuscemodi paraly- sis speciem, qua seruato motu sensus perderetur, neminem vnquā vidisse. Sanè qui arroganter sibi sectæ alicuius principatum vsurpant, artis verò opera nunquā in exercitationis vsum duxerunt, iis nihil tam difficile videtur, quod non intrepide profiteā- tur. Verum magna ex parte mētiuntur, atq; ut scribunt nonnulla, perinde ac si ipsa frequenter conspexerint, quorū tamen ne somnia quidem vnquam viderunt, ita plurima nunquam videri aiunt, quantis creberrimè conspexerint.

VB I ego transtuli, cognitio autem passio-
nis fit sufficienter & per debilitatem faculta-
tis. Legit Copus. Efficit tamen imbecillitas, vt fa-
cilius affectus à sensu dignoscatur, qui transtulit pa-
rum fideliter, & in falsam sententiam orationem
detorsit. Nam Ga. ita scripsit *ἡτε διάγνωσις τοῦ πά-
θος ἀντάρκως γινέται, καὶ διαβρώς δ' ὑναμείως*, quæ
oratio constat quam respondeat meæ versioni.
Præterea quo pacto non sit falsum dicere, imbecil-
litate efficere, vt affectus facilius cognoscatur?
nam ea passio quàm infert id quod sentitur, potest
esse maior, causa debilitatis. Nam omnes passionēs
quæ violentia fiunt, fiunt per debilitatem maiores,
tamen ipsum sentire siue cognoscere instrumen-
ti passionem, aut non est pati, aut certe non est
pati cum violentia, sed passio quædam perfici-
ens sensum ipsum, ea igitur non est quod melius
agatur propter debilitatem, sed propter sensus
acrimoniā. Sed quia potest esse satis magna sen-
sus acrimonia, cum ea debilitate, qua non possint
membra moueri, & alteratio violenta à re ipsa quæ
sentitur fit maior, inquit Galen. nam pati non qui-
dem minus, imò plus etiam contingit imbecilibus
cognitio autem passionis fit sufficienter & per de-
bilitatem facultatis. De modo quo sensus & mo-
tus pereunt aut non pereunt, non est quod modo
dicam quidquam, nam dixi supra, & incontro-
uersijs

uerſijs diſputaui de ea re diffuſe.

CAP. VII.

Relectiuncula.

Docet Gal. ſignis cognoſcere, cum ſanguis per os reijcitur, an è thorace an è pulmone aut aſpera arteria, an è ventriculo, aut gula, an è faucibus aut gurgulione, an è capite, an ex ore extremo ſit. Nam ab omnibus his locis poteſt venire. Id dignoſcitur modo quo reijcitur, tuſſiendo, aut vomendo, nauſeandò ve, aut excreando, aut expuendo tantum. Præterea ex cauſis quæ antecedunt, & ex accidentibus quæ comittantur malum. Dicit etiam ſanguinẽ è pulmone prodire poſſe, exeſis, ruptis, aut laxatis venis, cum verò nullius talis morbi notæ adſunt, et ſeroſus cruor prodiit hirudinem aliquam affixam eſſe gulæ aut palato ſuſpicandum eſt.



A T Q V E conuenit quidem inter medicos, ſanguinem è gula, ventriculoque vomitione, ex ſpiritalibus partibus tuſſi, ex faucibus & qui gurgulione ſcreatur, ex ore ſimplici expuitione expelli. Nos verò ſanguinem, qui à capite & gurgulionis partibus internis, vt ad fau-

ces affatim descendebat , tussiendo educi sæpenumero conspeximus , quippe subito summo gutturi irruens , tussim mouere potest. Quare diligenter aduertere animum oportet , ne aliquando huiusmodi sanguinem ex spiritalibus instrumentis ascendisse putemus. Quemadmodum iam noui quosdam medicos falso suspicatos , qui ex suo errore inducti putauerunt multos optimos medicos non recte pronunciaré , periculosissimam esse huiusmodi sanguinis eruptionem , ut potè pulmone vehementer laborante. Neque enim parui alicuius vasis in ipso ruptionem fieri verisimile est. Cæterùm contingit plerumque etiam , ut vel erosa , vel exesa , vel ut cumque nominare volueris vena , sanguis affatim tussiendo eiicietur. Quum enim retroactis temporibus , quis ex non ita multis interuallis , quotidie sanguinem tussiendo expuere consuevit , superueniâtque ei

ei postea multi sanguinis inter tussendum eruptio, & quidem neque ab alto cadenti, neque in certamine, nec palæstra grauius vulnerato, neque etiam sub vlllo graui pondere oppresso thorace: reliquum fuit, vt coniiciamus, ob auctam erosionem, plurimum sanguinem inter tussendum fuisse reiectum. Atq; non pauci sic laborantes, pulmonis quasdam particulas simul cum sanguine eiecerunt. Quo circa diligenter considerare oportet an spumosum quidpiam simul educatur. Id enim efficacissimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta sit excretio. Haud secus si bronchii pars quædam, aut arteriæ, aut venæ tunica, aut etiam pulmonis ipsius carúcula eiicitur. Quippe nihil horum accidit iis, qui ex thorace sanguinem tussiendo producant: haud secus atque nullus dolor infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit: vt poté qui duos nervos perquam tenues, à

sexta neruorum à cerebro ortorum coniugatione recipit, extrinsecus per membranam ipsum continentem dispersos, qui intrinsecus haud quaquam per visceris profunditatem extenduntur. Verùm thoraci (vt scitis) multi ab internis, multi etiam ab externis partibus adueniunt nerui, quibus facilè dolores percipi possunt. Præterea thorax musculis, ossibusque abundat, pulmo verò laxus est, atque ab afflictione tutus. Proinde thoracis dolores intensiores sunt, pulmonis remissiores.

Quum igitur dolente thoracis parte quapiam, sanguinem quis spuendo reiecerit, neque multum, neque rubrum, sed nigricantem grumosumque, huic thorax primaria passione infestatur. At sanguis patiente thorace per pulmonem educitur, haud secus, atque in suppuratis passionibus pus quod inter thoracem & pulmonem sensus iudicio contineri percipitur:

tur : ad eundem modum etiam in pleuriticis sputum coloratum emitti solet, quemadmodum in quinto huius commentationis libro utcumque dicemus . Consequens est, ut de ulceribus quæ sanguinis reiectioni superuenire consueverunt, deinceps dicere aggrediamur. Ea in pulmone creberrimè fieri possunt, ac curationem, (ut quibusdam videtur) nequaquam admittunt, aut ut alii putant) difficulter admodum sanantur. At in thorace disrupta vasa, à quibus sanguis expuitur, magna ex parte conglutinantur. Nam etsi multò tempore maneat, vlcus tamen nunquam fiunt non perfectè sanabilia. Quæ verò in pulmone longo iam tempore permanferunt, quamuis aliquando curentur, reliquintur tamen in ipso res quædam callosa, fistulosaque quæ tractu temporis, à leui occasione excoriari solet. Atque cum iis, quæ inde expuuntur, miscen-

tur vlceris tectoria, ephelcides à medicis vocatæ, ac cruoris exigua quædam guttula, qua in re cùm vlceribus in aliis sedibus genitis communicant. Verùm ex gula ventriculóque, vomitu: ex renibus & vesica, cum vrina: ex intestinis verò, deiectione excernuntur. Sed ex spiritalibus instrumentis nihil sine tussi expui potest. Quod si pluribus deinceps diebus aliquis cruoré & screauerit, & emunxerit, idque citra capitis vel dolorem, vel grauitatem siue præsentem, siue præteritam, neque is ex ictu procedat: huius & totum per nares meatum, atq; eam oris partem, qua ad nares foramen tendit, accuratè considerare oportet. Nam fieri potest huiusmodi accidens, hirudine huic loco adhærente, quæ quidem in dies augeri solet. Quamnis enim primis diebus, vt potè exigua, sensum effugiat, tertio tamen quartóue die, haud obscurè videri potest. Eadem ratione ex ventri-

cu-

culo quoque, cruor epota sanguisuga euomitur: sed est huiusmodi cruor tenuis, ac serosus, siue is ex ventriculo, siue naribus, siue ex ore feratur. Igitur cum talem videris, ac hominis confiderato habitu, super præteritis eum interrogaueris, ex omnibus, rei ipsius veritatem facile coniicies. Equidem cum viderẽ hominem integra valetudine, huiusmodi cruorem euomentem, interrogavi qua victus ratione antea fuisset usus: ille verò inter alia, quę narrauit hoc quoque addidit: quòd cū nocte quadam sitiret, misso puero, qui aquã afferret, ex immundo fonte bibisset. Quibus auditis, sciscitatus sum, apparuissent ne aliquando sanguisugæ in ipso fonte: qui cū id quoque fateretur, epoto subinde idoneo pharmaco, hirudinem vomitione reiecit. Porro cū alius quispiã huiusmodi cruorem emungeret, & expueret, ipso narrante audiui, eũ in rure æstatis tempore, in stagno

G s quodam,

quodam, cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo, qualem adoleſcētes in aqua ludere ſolent, exercitatum : tūm ego ſciens in eo ſtagno ſanguifugas eſſe duxi laborantem ad ſplendorem, cōuerſo que directè ad ſolis radios narium foramine, in eo meatu vbi naſus ad oris regionem perforatur hirudinis in meatu latentis caudam conſpexi. Has igitur hiftorias, vt pote perquam conducibiles, vobis narrare operæ precium duxi.

S C H O L I V M.

QUAM periculofa fit exulceratio pulmonis docet Gal. ipſe. 5. lib. meth. cap. 8. docens eam multis de cauſis eſſe periculofam, nulla tamen cauſa vſque adeò quàm quod non poteſt pulmo aliter, quàm tuſſi expurgari. Tuſſis verò lancinat illum, ergo fit vt ſua curatione augeſcat malum. Quamquam ſunt etiam aliæ cauſæ, nimirum pulmo eſt in motu perpetuo, ſed quæ vlcerata ſunt indigēt quiete, vt conglutinētur. Accedit quod non poſſunt medicamenta venire ad pulmonem ipſum niſi fractis admodū viribus, quia à vëtriculo ad illū ſunt multi anfractus. Accedit quod hoc loco docet Ga. quòd ſcilicet

scilicet ruptura in pulmone non potest non esse magna. Nam non est verisimile in illo fieri parui vasis rupturam. Ita N. inquit Gal. & *δε γὰρ μικροῦ τινὸς ἀγγείου ἤξιον ἔκτος γίνεσθαι*. Quæ verba aperte ostendunt quanto cum errore quidam vertant. Neque N. ferè alicuius vasis rupturam in ipso fieri verisimile est. Nam nec hæc verba respondent illis, nec verum continent. Nam non posse aut fere non posse rupturam in pulmone fieri, falsum aperte est, atque contrariū prorsus docuit ipse Gale. sed ille longe aliud docet, scilicet rupturam quæ in pulmone fit non posse esse parui vasis sed magni, proindeque fieri vt si exulceratio pulmonis est ruptura, magna sit ac difficilis. Iam verò si est exesio aut corrosio multis etiam nominibus erit magna. Inter cætera quia pulmo natura suæ substantiæ est paratissimum membrum ad putredinem contrahendam. Est N. calidum & humidum, & excrementis plenum. Sed cur non possit in pulmone rumpi vas paruum? Certè quia in illo non sunt venæ exiguæ sed magnæ, præterquam si quæ sunt capilares per substantiam ipsam distributæ, hæc verò non possint frangi nisi dirrupto pulmonis corpore, quod cum sit tam laxum & versus quaque sequax non sit facile ruptile. Nam comprimi ac distendi, & vtcunque aliter flecti possit, non ruptum. Itaque his omnibus de causis pulmonis vlcus est curatu difficile, quarum multæ quanquam communes sint pulmoni cum thorace, nam thorax etiam mouetur perpetuo & tussi expurgatur, & medicamina sero
accipit

accipit tamen duo illa non tam conueniunt thoraci. Nam neque in tanto motu est assidue quanto pulmo, neque adeò lancinatur quàm ille. Reliquis causis longe etiam superatur thorax. Nam nec tam magna vaſa ſolèt in illo quàm pulmone rumpi, nec in illo eſt ſubſtantia tam apta putredini quàm in hoc. Ergo merito vlcera thoracis melius curantur quàm pulmonis: uſque adeò vt vlcera thoracis quanquā non ſint admodum recentia, ſed aliquanto plus māſerint, perfectè curari poſſint, vlcera verò pulmonis, diuturna, nunquam perfectè curentur. Ita N. trāſfero verba illa, καὶ εἰ παραμείνεν μέχρι πλείονος ἡλικωσις, ἀλλ' οὐτί γε τελείως ἀνίατος γίνεται, non vt legitur in vulgari verſione. Nunquam N. vel diuturna curatione omnino reſiſtunt. Nam hæc verba malè hærent ſequentibus vt legenti cuique videre licet, ſed τέλειως ἀνίατος, idem eſt, ac ſi dicas, non perfectè curabilis. Si quis hoc loco plura ſigna partis ex qua ſanguis venit qui ore reiicitur audire cupit, legat cap. 59. lib. 8. apud Aëtium & cap. 31. lib. 3. medicamenta commoda ad epotas ſanguifugas inuenies apud Gal. lib. 2. de antidotis cap. 41.

CAP. VIII.

Relectiuncula.

Refert modos leſionum quæ contigere poſſunt ſecundum vocem aut ſermonem, vtque hæc ſeſe ordine quodam ſequantur,

sequantur, ita ut priora materia posteriorum sint, expiratione, efflatus sine strepitu, cum strepitu, vox, sermo. Docetq;, quæ sint singulorum instrumenta propria, utque nonnunquam lædantur per se, nonnunquam ex accidenti.



QUOD in proposito sermone, læsionem putare oporteat, etiam si non penitus tota partis actio secundum naturam deperditur, sæpenumero iam diximus. Neq; ab re fuerit id in præsentia monuisse. Præterea (quamuis non ignoretis) monitos vos velim, non eandem esse rem, vocem, & sermonem: siquidẽ vox vocalium instrumentorum munus est. Loquela verò eorum, quæ sermoni deputata sunt inter quæ lingua principatum obtinet. Cui non parum conferunt & nares, & labra, & dentes. Sic etiam vocis instrumenta sunt, summum guttur, & muscoli ipsum mouentes, atque nerui, qui à cerebro ipsis vim deferunt. Igitur si vel claudentes vel apperientes summum guttur muscoli, immobiles

mobiles reddantur, qui sic laborat obmutescet. Vbi verò vel difficulter mouentur, vel palpitant, aut tremunt, pro passionis ipsius modo, vox ipsa lædetur. Similiter, si vel conuellendo, vel quatiendo mouentur, aut ubi imbecillæ sunt ipsis vires, siue ob suam ipsorum, siue ob neruorum ipsos mouentium passionem, obscuram & paruum efficiunt vocem. Quòd si alius quispiam ex mouentibus summum guttur musculis, quoquo modo laborat, lædetur quidē vox, sed paruum erit vitium, atque sic laborans, nec obmutescet omnino, neque ita exiguam habebit vocem. Vt autem ex musculis summum guttur mouentibus, præcipui habentur ii, quos recurrentes vocant, qui & ipsi sextæ coniugationis pars sunt, neruorum, qui à cerebro oriuntur: quemadmodum & alii, qui quidem per ipsum dispersi differunt ab illis, eo quòd à neruis sextæ coniugationis non in ceruice, sed cum ad thoracis

cis regionem peruenerint, separantur. Nullus itaque tam ineptus dissector est, qui sextam coniugationem totam secet inuitus, quamuis recurrentes nerui ob imperitiam nonnunquam diuellantur. Accidit verò interdum in magnis asperæ arteriæ vulneribus vt vna cùm ipsa arteria, vel alter, vel vterque incidatur. Porro per chirurgiam quoque in frigidati tantisper vocem impediunt, donec calefacti naturalem temperiē recuperauerint. Quinetiam vitari vocem haud obscure contingit cùm vel acutior, vel maior redditur, ob id quod fauces à suis musculis nequeant intendi. Item grauissimè læditur vox, vbi membrana, quæ faucibus, & summo gutturi communis est, multa humiditate rigatur. Quòd etiam destillationes eadem ratione vocem raucam efficere possunt nemo non intelligit, vehemens quoque exclamatio, similiter vocem lædit, vt pote quæ similem inflammationi circa
iam

iam dictam membranã, atque summi gutturis musculos parit passionẽ. Cæterũ cũ summi gutturis interni musculi inflammantur eam passionem, anginam esse constat, quę simul & vocem & spirationem lędit. Ac idem quoque in vniuersum facere solęnt omnes præter naturam tumores, siue in spiritalibus viis exoriantur, siue extrinsecus ipsas comprimãt. Sic N.gula quoque, vbi inflammationem patitur, vt cõprimat asperę arteriæ tunicam, qua cartilaginum ipsius partes extremę sigmoides vocatę coniunguntur, & spirationi, & voci noxam afferre consuevit. Haud absimile quoque vitium inducit, vertebrarum cervicis in anteriorem partem luxatio, sed de his iam antea dictum est. Igitur omnes huiusmodi passionēs voci adueniũt, propriis ipsius instrumentis familiari aliquo vitio siue primogenia passione, siue per consensum laborantibus. Nam ad propositũ modo sermonem nihil interest,

interest. Sunt præterea aliæ passiones, cum peculiari sua materia priuatur. Atque in cõmentariis de voce dictũ iam est, quod propria huiusactionis materia generatim quidem loquendo, est exspiratio: secundum speciem verò, atque propriam differentiam, exufflatio. Quæ quidem est, cum affatim spiritus foras effertur, intercostalibus musculis ad hanc actionem concurrentibus. Unde fit, ut per vehementia thoracis vulnera, atque omnino ipsius in altera parte resolutionem, imprimis quidem semispirans ex accidenti aut & semiuocale fit animans.

In apoplexia verò, sopore, morbo comitiali, vigilantia sopore, communi ratione earũ actionum, quæ ab impetu, & voluntatis imperio procedunt vocem lædi contingit, siue spinalis medullæ partes primæ, siue simul, cum iis cerebrũ quoque patiatur. His itaque quinque inter se consequentia quadam coniunctis actionibus, expiratione, exuffla-

H tione,

tione citra strepitum, strepenti exufflatione
 voce, loquela si earum prima lædatur reli-
 quas omnes lædi est necesse: vltima verò læ-
 sa, reliquæ haud quaquam læduntur. At cū
 secunda, tres reliquæ læduntur: cū in tertia,
 duæ vltimæ, cū quarta verò, sola postre-
 ma læditur. Etenim si nihil omnino spiret
 animal, vel ex vtriusque thoracis partibus,
 vel ex altera parte duntaxat: & quidem si
 ex vtriusque, celerrimè suffocabitur: si ex al-
 tera tantum, semispirans, atque semiuocale
 reddetur, perdētque simul reliquarū dein-
 cept duarum actionum partem dimidiam.
 Quarum alteram exufflationem citra stre-
 pitum, alteram verò strepentem nominare
 consueuimus. Quòd si expiratione seruata
 corrumpatur exufflatio, reliquæ tres actio-
 nes, strepens exufflatio, vox, & loquela, si-
 mul corrumpentur. Sicut voce pereunte, lo-
 quelam quoque perire necesse est. Quum
 itaque dictarum actionum opifices muscu-
 los

los cognoueritis, superest cōsiderare, qui ex
ipsis propria passione laborent, & quorū
actio lædatur per accidens. Quòd si quid-
piam eorum, quæ ex corporum dissectione
vidistis, obliuioni tradideritis, admonebunt
vos ii, quos de respirationis causis atque de
voce perscripsimus, commentarii. Atque
de his ipsis in. 2. lib. de viuorum dissectione
etiā dictum est. Sanè expirationem faciūt
vniuersi thoracem contrahentes muscoli:
vocem verò ipsam summi gutturis muscu-
li efficiunt: sed lingua articulatiuē vocē di-
stinguēs, loquēdi vsum præstat, atq; nonni-
hil ad hanc rē conferre videntur dentes, la-
bra, narium foramina, palatum, gurgulio,
præterea mediocre linguæ ipsius vinculū.
Itaque balbis, blæsisq; atq; aliis, qui impedi-
ta sunt loquela, locutionis instrumentorum
aliquod, aut cū natura ipsum formaret,
aut postea, lædi certum est. Veluti cū vel
polypus, vel aliud, quippiam narium fora-

mina obtulit, aut ex primis dentibus aliquis deperditus est, aut vbi labia fuerint mutilata. Verum quopacto quidem tenuem obtineant vocem, ac præterea quomodo aliæ vocis, tum differentia, tum passionis fieri possint, vt rauca, clangosa, tenuis, aspera, aut magnæ in commentariis de voce sufficienter diximus.

S C H O L I V M.

NERVI sextæ coniugationis emergentes è caluaria per ea foramina, per quæ carotides vocatæ arteriæ cum venis penetrant, descendunt vsque ad hypochondria, interim per viam in multa membra bonas portiunculas demittentes, inter cætera, cum eis ad medium thoracem peruentum est, demittunt duos ramulos satis manifestæ magnitudinis, qui recurrentes sursum subeunt in musculos laryngis. Quo fit vt multo maiores sint hi nerui cum descendunt, quàm cum recurrunt. Nam descendentes surculos aliquos in descensu demiserunt, ac non toti recurrunt, sed bona pars vltra progreditur ad inferna, hac de causa inquit Gal. nullus tam ineptus dissector est, vt sextam coniugationem inuitus fecet, quamuis recurrentes sæpe per incuriam fecentur.

Verum

Verum non incipiunt ambo nervi eodem loco recurrere, sed dexter è loco sublimiori, sinister ex humiliori. Nam annectitur sinister arteriæ illi quæ est aortæ pars, & reflectitur ad inferna, descenditque per spinam, dexter illi arteriæ quæ de magna ascendenti, iam decisa ad brachium tendit. Nervos hos inquit Gal. lib. 7. de usu partium annexos esse dictis arterijs vt illinc impetum capientes melius possent musculos ad inferna trahere. Non aliter, quàm funeres aliqua per trochleam trahitur. Cæterum debuisset Galenus meminisse loco illo, nullum nervum motum habere, sed musculos solos esse motus instrumenta, eos verò per nervos accipere facultatem.

Non ergo nervus innititur, aut contentioni capiti ante quàm in musculos subeat, sed musculi solum contrahuntur, ijsque contractis contingunt omnes motus liberi. Ille annexus fortassis solum est pro ligamento, atque ad nervorum recurrentium directionem, ac ne plicas, aut compressiones facile paterentur. Si quid aliud maioris artificij latet in illo annexu, haud scio satis: profectò naturam contemnit qui non fatetur, nullum mortalium posse omnem artem qua in formandis hominibus usa est intelligere, nedum enarrare. Illud satis constat, nequaquàm naturam nexus illos effecisse vt nervi arterijs innitentes, musculos deorsum traherent. Nam præterquam quòd natura nervorum repugnat, qui nullum perse motum habent, neque illa ars erat satis idonea. Nam si illi nervi firmati in arterijs contraherentur

tur profectò comprimerentur cum arterijs, ac viâ in recurrentes nervos facultati obstruerent. Nam mediocres etiam nervorum compressiones videmus in illis stuporem efficere, ac maiusculas etiam resolutiones. Musculos faucium intelligo eos esse qui sunt communes laryngi & gulæ qui ad vocem & sermonem iuvant, quanquam instrumenta propria non sint. Docet idem Galenus. libro septimo, de vñu partium, voces raucas fieri cum larynx est nimis humida, cum nimis sicca clangosas. Ergo multa vociferatio clangosas voces solet efficere, cum quia post multum clamorem difficile clauditur larynx, tum etiam quia desiccatur, fit ergo vox vt ex aridis fistulis solet, ergo facit (inquit) vociferatio similem passionem inflammationi nimirum vt inflammatio ardore desiccatur, ita exclamatio quanquam videtur melius quadrare si hic *φλεγμονή*, significet quod *φλώγος*, ardorem inquam, non tumorem præter naturam. Nam tumor angustiam facit magis quam clangorem. Non satis attentè dictum est à Gale. expirationem faciunt vniuersi muscoli thoracem contrahentes, exufflationem, quæ vehemens exspiratio est, intercostales maximè. Nam videtur innuere plurium musculorum actione esse opus ad expirationem facilem, quâ ad exufflationem. Accedit quod ad expirationem solam, sola septi transversæ motio sufficit, nisi cum is est debilis admodum. Cæterum dicit optime, musculos intercostales, omnes scilicet, efficere exufflationem,

tionem, quanquam lib. de causis respirationis aliter docuit, scilicet intercostales internos expiratione, externos inspirationem. Tamen non est dubium, verius esse quod hoc loco affirmat. Nam omnes intercostales muscoli adducunt costas ad sese. Balbi & blaſii græce *τράυλοι* & *ψέλοι*, dicti, iisdem sunt, vt Gal. ipse finit 6. apho. com. 32. qui. ρ. non possunt exprimere, potissimum post. τ. intellige vno nomine eos, qui non possunt litteras prolatu difficiles, qualis imprimis est. ρ. exprimere. Hoc imbecillitate nervulorum mouentium linguam præ nimio humore contingit, vt in puris, & mollibus hominibus. Impediti aut cunctabundi fiunt quibus non est expeditum mouere versufquaque facile linguam, aut quia ea adiacentibus membris est plus satis alligata, aut minor quam opus est, ipsa tota, aut musculus aliquis eorum qui ipsam ingrediuntur. Commentaria de voce quæ genuina Galeni sint, non habemus, tamē constat vocem raucam ac clangosam dictis causis fieri, tenuem, aut magnam, aut asperam, tenuitatē, amplitudinem, aut asperitatem, arteriæ asperæ sequi. Constat etiam corruptissimum esse hoc loco codicem græcum. Habet N. vbi in ipso extremo calce capitis legimus magnæ, *μελαχνης*, id est, nigræ. Est N. legendum *μεγάλης*, id est magnæ. Nā nigra, nullatenus est vocis differentia. Nec verò probo quòd nonnulli interpretantur, vertentes, obscuræ. Nam vox non est obscura, sed per metaphoram talis dicitur, at verò nec quod obscurum est propriè dicitur

nigrum sed per metaphoram. Nam obscurum est contrarium splendido vt nigrum albo. Ergo appellare vocem nigram, vt obscuram intelligeret, esset vti metaphoram, ex alia metaphoram ducta, quòd in nominibus quibus Archigenes utebatur acerrimè reprehendit. Nisi ergo quòd in alijs vituperat est oblitus deuitare, non vocat vocem nigram, sed verisimilius est corruptum esse codicem. Nam aërem nigrum dicere, id est obscurum, licet, cùm verè ac propriè est obscurus. At vocem non licet, nam non est obscura propriè, sed per metaphoram.

CAP. IX.

Relectiuncula.

Repetit breui plurima eorum quæ in libris de difficili respiratione scripta sunt, dicens nonnunquam moueri omnia respirationis instrumenta, nonnunquam quædam illorum. Atque respirationis eius quæ omnibus instrumentis fit, tres esse causas, debilitatem virtutis, aut calorem magnum, aut obstructionem in instrumentis. Docet etiam has causas signis distinguere, cùm singulas per se, tum compositas, enarrat quæ sententiam. 27. 1. prognostici & de apnæa differit.

Atque



T Q V E de dispnoea iam antea
vbi spinalis medullæ* passiones
percurrimus, multa dicta sunt.

Quibus nunc in memoriam reuocatis, quæ
ad præsentem cõtemplationem supersunt,
subiungam. Itaque in vniuersum expedite
vos meminisse velim musculorum thora-
cem mouentium, neruorũque, qui ad
iplos perueniunt, quos in corporum disse-
ctione vidistis. Igitur introeuntes ad homi-
nem difficulter spirantem, imprimis con-
siderate an omnes thoracis muscoli moue-
antur, an soli intercostales sine superiori-
bus, atque an simul cum intercostalibus
septum transversum quoque moueatur.

Quum itaque conspexeritis omnes moue-
ri, vnã ex tribus, quas dicemus, causis, hu-
iusmodi motionem efficere putandum est,
ac deinde quæ sit illa, quæ nunc infestat, per-
pendere oportet. Quod si non omnes mo-
uentur, aliter definire. Subiiciamus igitur a-

H s liquem

liquem omnes simul mouere musculos, vt
 pectus vnâ cum scapulis manifestè suble-
 uetur. In hoc opere ex tribus vnū aliquod
 cōiicere necesse est. Aut viriū imbecillitatē,
 aut viarum spirititus angustiam, aut vehemē-
 tem in corde, & pulmone calorem. Quā-
 vis interdum duæ, aut nonnunquam (licet
 rarò) tres quoq; ex iam dictis causis concur-
 rere possint. Atqui tribus quidē simul con-
 uenientibus proximam mortem timere o-
 portet: vbi verò duæ fuerint, difficile est æ-
 grum seruare. Sed vnâ duntaxat infestante
 peculiari opus est finitione, vt sciatur, vtrū
 ad sanitatem perueniet æger, an sub malo
 succumbet. Igitur vbi vires duntaxat fue-
 rint infirmæ, ad tria mouentium musculo-
 rum genera venire eòsque omnes ad mo-
 tionem excitare solent, quia vnum genus sa-
 tis vehementer mouere pectus non valet.
 Quippe si septum transversum solum ve-
 luti cū secundum naturam se habet, suf-
 ficienter

ficiēter mouere posset, nec intercostalibus nec superioribus musculis indigeret : quoniam verò imbecillum est, omnes sensim mouet, sed neq; frequentem, vt nec rarā omnino facit actionem. His igitur adhibenda est mens, nam cætera haud difficulter per ea discernuntur. Sanè plurimùm aucto in spiritalibus instrumētis calore, omnibus quidem thoracis musculis agit animā, sed velox, frequens & vehemens est eorū actio, quaudò videlicet citrà virium imbecillitatem, calor intestat. At virium imbecillitatē vbi flammeus calor non accesserit, nec velox, nec frequens omnino comitatur motus, proinde non ita multum omnes thoracis partes dilatare potest. Quippe hoc dyspnœæ genus, cum ea, quæ ob nimiam incensionem facta est, vnum commune habet, quod omnes thoracis muscoli per ipsam agere coguntur. Quinetiā vbi ob plurimùm calorem spiratio difficilis est, præter

ter magnitudinem, frequentiam, & celeritatem hoc quoque accedit, quod calidus feruensque spiritus exufflando producit: ubi per virium imbecillitatem, nulla ab ore facta exufflatione, ex solis naribus emitti solet. Quod si per inspirationem cuiusdam narium pinnae manifestae contrahi videantur, id verò efficax prostrati roboris inditium est. Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax magna ex parte, & celeriter & frequenter dilatatur: sed qui sic laborant exufflare omnino non consueverunt. Sive rò simul conueniunt in spiritalibus instrumentis, & calor & angustia, ut in peripneumonia, tum nec maxima, nec frequentissima nec etiam celerrima spiratio sufficere potest, sed surgere tentant sic laborantes. Etenim sentiunt hoc pacto totum thoracem facilius dilatari. Quippe qui decubentibus in sese concidit, eò quod pectoris partes ad spinam declinant, qua erecta, thorax etiam simul fertur, non amplius

plius seipsum grauās, ac similiter quoq̃ respirare solēt ii quibus asperæ pulmonis arteriæ plurima defluxione opplētur, aut vbi ex proximis locis in ipsas aliquid deriuatū est: vnica verò dūtaxat re differūt, quòd neque exufflāt, nec calidū spiritū emittunt. Sic etiā iis, quibus inter thoracē, pulmonémq̃ magna puris quātitas collecta est, quos suppuratos vocāt, totus thorax attollitur: sed neq̃ calidus est ipsorū spiritus, neq̃ etiā exufflādo emitti solet, nisi adurens fortasse febris accesserit. Verūm ii celerrimè suffocantur, tūm ob passionē ipsam, tūm quod vires omnibus suppuratis ex necessitate imbecilliores reddūtur. Sed non necessario in fluxionibus, quæ ad pulmonē irruūt, aut peripneumonia, aut asthma robur prostermitur. Nā cōtra per anhelātes passionēs, crassīs & viscosis humoribus pulmonī impactis, vires robustæ, cōstantesq̃ permanere possunt. Atq̃ si tuberculū, coctū difficile, aliquando
in

in ipso natū fuerit, thorax maximè quidē dilatabitur, sed nō ita multū inspirabit aërem. At licet continēter spirare cogatur, nō tamē exufflare solet: id N. aucti caloris p̄p̄riū est. In eandem dispnoæ specię, sed alia ratione labuntur, ii quoq; , quos angina molestat, ob angustia cautorū, nō quæ inspirationē suscipiunt, sed eorū quæ transmittit. Quibus verò & abscessus & inflāmatio atq; humorū plenitudo, in thoracis, aut pulmonis cavernis cōsistit, nulla obstructione accidente in gutturis atq; asperæ arteriæ concauitatibus, illis videlicet quæ inspiratū aërē suscipere solēt, si tūm angustia cōstringat, ex necessitate sequetur magna thoracis dilatatio, sed nō ita multus trahetur spiritus. Proinde laborantē & celeriter & frequenter spirare necesse est, Præ omnibus N. vos meminisse velim, magnę respiratiōis geminas esse differentias. Fit N. interdū, ob dilatatiōis à thorace p̄cedentis magnitudinē, interdū verò

ob inspirati aëris multā essentiā. Scitis nimirū q̄ sepe numero vos admonere soleo, earum rerū quæ à prioribus omisse sunt. Nā quas ipsi p̄sequuti sunt earū, propter scriptorū multitudinē, facilis atq; in prōptu est memoria. Quæ verò ab Hip. (quāvis accuratè de dyspnœa scripserit) nō sunt definita, ea posteriorū nemo explicauit definitiue. Idcirco necessariū esse putavi, creberrimè illorū vos admonere. Igitur quicumq; sine inflāmatione, vel omnino sine aliquo præter naturam tumore, aut angustia spiritaliū instrumētōrū per febres ardētes, difficulter spirant, iis inspirati aëris quātitas magnitudini dilatationis thoracis p̄portione respōdet. Quibus verò vel tumor, vel angustia sine flāmeo calore in spiritalibus est, in his thoracis quidem dilatatio maxima est. Id verò quod inspiratur, non solum dilatationem proportionē non assequitur, verū etiam minus, quā secūdum naturā inspirari solet, attrahitur,

Scholium.

VIDETVR Gal innuere posse respirationem
 agi solis intercostalibus musculis, atque adeo
 non moto septo tranverso. Nam inquit, considera-
 te an omnes thoracis muscoli moueantur, an soli
 intercostales sine superioribus, atque an simul cum
 intercostalibus septum transuersum. Quod tamen
 falsum est. Nam quoties muscoli intercostales moue-
 tur, mouetur etiam septum, quanquam non contra.
 Nam septum est quod semper facit ad respirationem,
 muscoli intercostales, cum opus est efflatu. Accidit
 quod intercostales omnes cōstringūt, vt prius indi-
 catū est, quare illis solū agētibus non posset thorax
 dilatari. Certe nulla ratione fieri puto, vt solis in-
 tercostalibus respiratio agatur, nec vt intercosta-
 libus & sublimibus vocatis, quin simul moueatur
 septum transuersum, nisi forte id sit omnino reso-
 lutum, quæ passio citissimè afferet mortem. Quare
 ego ita intelligo Galeni verba, considerate an om-
 nes thoracis muscoli moueantur, an soli interco-
 stales sine superioribus. i. an inter musculos qui
 præter septum sunt soli intercostales moueantur, &
 an septum moueatur, simul cum intercostalibus (in-
 tellige) an solum. Considerare debes in singulis ha-
 rum causarum debilitatis virtutis, angustiae viarū,
 & aucti caloris, excessus non omnino immodicos
 & excessus maximos. Nam aliter hærebis in ijs quæ
 à Galeno dicuntur. Aliàs enim dyspnœæ species
 efficiunt.

efficiunt cum illis: aliàs cum his excessibus, singulæ causæ, cuiusmodi illud est. Debilem virtutem mouere omnes musculos, sed neque densam, neq; raram omnino respirationem facere. Nimirum cum nihil aliud in causis respirationis permutatum est, quanquam virtus est facta languidior, si mediocris est languor mouet omnes musculos, sed non facit crebriorem respirationem naturali. Quia quanquam facit minorem, tamen quod deest magnitudinis suppletur multitudine instrumentorum. Verum si plus crescat debilitas, vt non posset mouere illa omnia instrumenta, quantum illi vsui possit esse satis, crebram efficiet haud dubiè. Contrà, quod aucto colore accidere dicit, vt scilicet moueantur omnia instrumenta, non est cuiusuis ardoris, sed magni. Nam auctus calor primum facit magnam, celerem & crebram respirationem, deinde sublimè etiam, & exufflationem. Illud etiam quod spiritaliũ instrumentorum angustia accidere dicit celeriter & crebro respirare, illi tantum angustia accidit, quæ est maxima. Nam imprimis facto in thorace tuberculo, calore & facultate non mutatis, fiet respiratio, tantò maior quantò via est naturali magis obstrueta, quia ita trahetur quantum exigit vsus qui est moderatus, nam non trahetur satis multum aëris pro magnitudine dilatationis, sed tantò minus quantò instrumenta sunt magis impedita, atq; ita aëris copia quæ non respondebit dilatationi, respondebit vsui, deinde verò facta maxima ob-

514 DE LOC. PAT. G. CVM SHCO.
structione, cum nō possit thorax tantū dilatari, v
vsi nihil desit celeris & crebra respiratio fiat. Re
fert ergo multum, non tantum causas illas confide
rare, sed mediocres & maximos excessus in singulis

AT sine distinctione, vnam passionem
ostendit magna thoracis dilatatio, si
raritatem simul acceperit. Verum animad
uertere oportet, ne aliquādo in hac decipia
mini, putantes eā spirationem, quæ ob viriū
imbecillitatem omnibus agentibus muscu
lis efficitur, eandē esse cum magna. Quam
equidē, quo clarior esset interpretatio, su
blimen vocare volui. Hicq; mihi facile fuit
intelligere, Hip. eū sublimē vocare spiritū
qui altioribus thoracis partibus inspiratur.
Quemadmodū cum inquit, magnus spiri
tus & ex longis interuallis, deliriū declarat.
Constat eum, magnū pro multo dixisse. I
verò bifariā fieri potest, vel sine superiorū
musculorū actione, vel ipsa quoq; cōcurrē
te. Nā plerūq; intercostales muscoli, vnā cō
septo transuerso, ad multā thoracis eleuatio

nen

nem, qua multus spiritus alliciatur, superiorum musculorū auxilio nō indigēt. Quod verò huiusmodi eleuationis species, deliriū portendat, in cōmentariis de dyspnœa iam ostendimus, vbi etiā cuiuslibet difficultatis spirandi passio declarata est. Nunc verò, vt cōpendio quodā hic explicamus eas passiones quas in aliis ante à cōmentariis iam percurrimus: ita & de dyspnœæ differētiis, partim quidē dictū est, partim verò in sequētibz dicemus. Nā veluti magnarū respiratorum alia quidē crebra est, atq; huic sunt differētiæ cōplures, quarū, aliæ alias passiones indicant: alia verò rara vnicā indicans passionē: sic etiā de parua dicendum est, quod rara quidē spiritaliū instrumentorū frigiditatem, frequēs verò non solū spiritaliū, sed eorū quoq; quæ cum ipsis mouentur, vt hepatis, lienis, vētriculi, gulę, dolorē portēdit. Quum igitur plures sint passioēs, quas per vehemētes motus dolor comitatus, ex aliis

notis, & cōsiderādū, & definiēdū est, siue inflāmatio quēdā, siue erysipelas, siue vlc⁹, siue abscessus dolorē efficiat. Quinetiā didicistis, q̄ inaequales intēperantię, dolores excitare sæpenumero solēt. Similiter spiritus crudi, flatuosi q̄ copia qui arētatus aliquando partes ipsum ambientes distendit, aliquādo verò violenter egreditur. Pręterea calidi, & aëris, aut frigidi, & lenti humoris abundantia, si aliquando retentus humor ambientia corpora distendat, aut inde violenter exeat, dolores efficere potest. Quod si graui⁹ passa fuerint instrumēta, in quibus huiusmodi humores continentur, dolent, vel nō moventur. Verū in lib. de dyspnœa, causam explicauimus, cur paruę spirationis, frequens quidem spiritus, motorum per expirationem instrumentorum dolorem significat: rarus verò, vehementem perfrigationem, & quidem spiritalium duntaxat, præcipuē

præcipuè pulmonis & cordis.

SCHOLIUM.

MÆSTI aut cogitabundi sæpe respiratione magna & rara vtuntur, idq; sine delirio, atq; quod bene valentibus propter mæstitiam aut animi cogitationem solet, potest agrotantibus iisdem occasionibus accidere, verum in morbis & causa ipsorum morborum, atque sine manifesta causa, nō potest accidere nisi delirantibus. Parua & crebra respiratio (inquit) significat dolorem, ego addi velim parua & crebra, ac nō languida. Nam aliter aucto calore & debilitata multum facultate fieri possit respiratio parua & crebra.

EST etiam alia dyspnœæ species, cū veluti breui quadam quiete intercipitur opus thoracis, idque nonnunquam expirando, nonnunquam verò inspirando, siue hoc accadat ob muscutorum thoracis conuulsionem, siue ob caloris copiam, cogentis laborantem cōtinenter vel expirare, vel inspirare.

I 3 Scholium.

HÆC respiratio est quam Hippo. 6. part. aph. spiritum offendentē appellat, est assimilis pul-
sui dicroto, videtur fieri posse aucto vehementer
calore, verū rarissimè fit nisi incipiēte cōuulsione.

EST insuper alia respirationis passio,
quā apnoeā (quasi non expirationē dixe-
ris) nomināt, nulla, vt aspiciētibus vide-
tur, facta spiratione. Verum vt rei ipsius na-
tura declarat eam non fieri incredibile est.
Nam impossibile videtur, vt animal omni
spiratiōe exactè priuatū, in vita seruari pos-
sit, quamuis ea animalia quæ in cauernis la-
tere consuerunt, thoracem mouere videan-
tur minime. Proinde duorū alterū cōiicere
oportet, aut adeò exiguā fieri spirationē, vt
sensum effugiat, aut huiusmodi animalia
tunc spiratione omnino nō indigere, sed eā
transpirationē, quæ per vniuersum corpus
fit sufficere: quippe hanc cor ipsum per ar-
terias efficit. Respirationē verò per thoracē
cerebrum

cerebrum efficere cōstat. Verūm qualis est passio, quæ apnœā efficere potest, cōmunis certè omnibus aliis partibus esse videtur, veluti in apoplexia, sopore, morbo comitiali, catalepsi. Nam in his omnibus nulla p̄pria passio spiritalia instrumenta præ ceteris infestat, non magis quā vocis, aut locutionis, aut prægessionis instrumenta: sed patiente principio, omnia, quib⁹ vires suæ, per quas regūtur ab ipso suppeditari cōsueuerunt, ei consentire necesse est. Verū de apnœa iam & particulatim & per se diximus, quam ob rem tempus est vt nunc ad alia transeamus.

S C H O L I V M.

MULTIS in locis Gal. videtur censere nullatenus viuere posse hominē sine omni respiratione, sed tunc etiam cū omnino videtur ea carere, habere exiguā aliquam, quæ non sentiatur. Id N. libello de vsu respirationis & penultimo cap. li. vltimi huius operis innuit, nō min⁹ quā hoc loco. Ego verò quanquam respirationem vt alias omnes actiones citius fugere sensum quam omnino perire non dubito, tamen cur non possit etiam aliquando

perire omnino respiratio antequam vita, non intelligo. Nam respirationis sunt tres causæ continentes, usus, instrumenta, & facultas, quæcunq; illarum tollatur deerit actio omnino. Illa facultas apponitur per voluntatem (est enim animalis) ergo me volente cessabit meus thorax, non tamen momēto moriar, sed aliquantulo tempore suffocationis periculum subeam, interim viuens sine respiratione, perinde accidet si cui animanti ad tertiam colli vertebra præcissa sit spinæ medulla. Iam verò deficiente usu, deerit etiam respiratio, ille verò potest deficere viuente animali. Nam respiratio non est necessaria propter vitam simpliciter (multa enim viuunt sine respiratione) sed propter attemperationem caloris. Quare ea animantia quæ quia frigida sunt, attemperatione caloris non indigent, non sunt donata à natura respirationis instrumentis, nimirum flamma omnis cōseruatur mediocriter frigidi aëris modica vētilatione, marcescunt ergo flammæ vētilatione priuata, vt sub cucurbitula, & à flamma maiori discipantur. Ita noster calor indiget aëre mediocriter frigido, nam in calido non minùs suffocamur, (quod in aëre balnei accidere solet, quā omni aëre priuati. Ergo non dubiū est aërē qui inspiratur mediocriter refrigerādo tēperare calorem cordis. Ergo accedēte interius causā plus refrigerante cor, quā aër soleat, nō indigebit animal aëre. Quare cessante usu cessabit actio, illud certè accidit mulieribus quæ yteri præfocationem patiuntur,

tur, illæ enim causam habent dicente eodem Gale. quæ totum corpus refrigerare valet. Nō itaque dubiū est posse hominem aliquantulo tempore, solo pulsu cordis, & arteriarum viuere. Nam omnino sine respiratione & pulsu non possit viuere, aut id sit ferè temporis momentum. Nam quamuis singas interius fuligines, aut flatus auras ve perfrigerantes accedere, quominus opus sit attemperatione quàm præstet respiratio, aut pulsus, tamen erit opus motu spirituum, quo cessante extinguitur innatum calidum repente.

CAP. X.

Relectiuncula.

Disserit de pulmonis morbis, ac primum omnium expurgat se, quod repetat multa eorum quæ supra dicta sunt. Deinde refert signa ad cognoscendum, an in pulmone sint tubercula cruda, an crassi succi, an tenues & multi, an pus. Scribitque perypneumonix accidentia, atque accidentia quibus distinguatur inflammatio ab erysipelate pulmonis, atque ij à tumoribus mediij generis. Porro docet intemperiebus sine humore laborare nonnunquam pulmonem, atque quæ mala intemperiebus succedant, vtque diagnoscantur, ex quibus præterea causis rumpantur vasa, aut laxentur, aut corrodantur in pulmone, vt sanguis excreetur. Narrat tandem historias quorundam qui putredine pulmonum tabidi mortui sunt, atque alterius qui grandinis similia quædam tuſsi reijciebat, demum aliam Anti-

patri medici qui in pulsu omne genus inæqualitatis habebat, tamē non respirabat difficulter. Quia crassi succi erāt non in asperis pulmonis arterijs sed in leuibus. Tamen hic quoque exactis sex mensibus mortuus est.



IGITUR cūm exercitationis via, qua ad patientium locorū notitiam peruenitur, duplex sit: altera quidem ab apparentibus accidentibus, altera verò à corporis partibus, si quis per vtrasque voluerit exercitari, eadem bis dicet, quamuis alio & alio modo: vt de pulmonis cōfestim passionibus dictū est, vbi de dolorū ratione, de sanguinis reiectione, ac de dyspnœa diximus, atque in præsentia quoque dicemus. Etenim vehementi dolore nunquam cruciatur, verum & grauitatis sensum, & aliquando extēsiōnem quandā, vel ad pectus vel ad spinam percipere potest. Ibi N. membranæ ipsum ambientes suspenduntur. Sæpenumero etiam angustia molestantur laborantes, atque ob hoc
crebro

crebro celeriterque spirant, thoracem multum dilatantes sed non ita multum aërem attrahunt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tuberculum quoddam, aut lentorum, crassorumve, aut multorum humorū plenitudinem, in eo existere, aut pus, aut alium quendam humorum, vel lentum, vel crassum, vel multum, in ipsum effusum fuisse declarant. Verum ea per præterita accidentia discernere licebit. Namque si quis per bonam valetudinem, cum solitas actiones facere potest, sic difficulter spirare incœperit, augeaturque accidens, nec inter respirandum stertere videatur, crudi tuberculi ortum suspicari oportet. Si verò stertendo strepitum fecerit, lentorum, crassorumque humorum pertinaciter impactorum multitudinem, pulmonis bronchia molestare indicium est. Quod si illico ab angustiae sensu, quis difficulter spirauerit, fluxionem vel à cerebro, vel à vicinis sedibus, in pulmonem

monem irruentem portendit. Sed cum fluētibus in pulmonem, vel viscosis, vel crassis, vel multis humoribus hominem difficulter spirare dico, in bronchiis eos contineri, intelligas velim. Diuisa N. in totum viscus aspera arteria haud secus, atque leui, bronchiorum substantia in totum pulmonem procedit. Vocantur autem à dissectoribus bronchia, asperę arteriæ cartilagines, sigma litteræ figuram referentes. At vbi pleuritis præcessit, mox remissa febris vehementia, intra latera grauitas in imò thoracis derelicta sentitur, ac vbi quis affatim à decubitu transmittatur, idque maximè si ab vno latere in aliud se conuertens, defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri, haud dubia coniectura est. Quinetiam in iis fluctuatio sæpenumero haud obscure creditur. Accidit ad iam propositas notas hoc quoq; indicium. Si vehementi prægressa pleuritide, nihil penè laborans expuerit.

Si verò citra febrium serofus, aut pituitofus humor in thoracis spatium subito defluens, spirandi difficultatem excitauerit, laboras, tenue sputum, idque ab initio quidem exiguum, sed cum vehementi tussi: vbi verò concoctum est, plus, atque crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Quippe bifariâ accidere potest, vt vehementer tussiendo, pauca quis expuat. Alii N. ob lentum, crassum ve humorem, alii ob tenuem, id facere videntur: siquidem tenuis humor, cum subleuatus est, inter tussendum à spiritu diuisus refluit. Lentus verò, aut omnino crassus difficulter effertur, vt pote qui non tam facile à corporibus, quibus impactus est, abstergi, neque etiam à quauis occurrentis spiritus violentia impelli potest. Nisi N. spiritus qui tussiendo effertur, & multus, & vehemens fuerit, nihil secum educet. Igitur sputum, quòd neque liquidum, aut aquosum admodum fuerit, nec crassum etiâ, aut lentum,

tum, id faciliè efferri solet, maximè vbi valida fuerint vires. Etenim sine vehementi thoracis contractione vehementer tussire nemo potest. At sine valida tussi, crassos, lètosque humores efferri impossibile est. Igitur quando cum spirandi difficultate cui & angustia, & grauitas coniuncta est, acuta quoque febris inciderit, ea passio inflammatio pulmonis est. At si intolerabile fuerit incendium, angustiaè verò, grauitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Extremis autem ita definitis, quid sit erysipelas inflammatum, aut inflammatio erysipelatodes, haud difficulter deprehendetur.

S C H O L I V M.

DVPLICI via potest aliquis disputationem de locis patientibus instituere, aut percurrendo symptomata, atque ex illis inuestigando particulas, aut ordine percurrendo particulas atque in singulis sigilatim considerando quibus malis corripì soleant. Vtrumque ordinem maioris exercitationis gratia

gratia sequitur est Galenus. Nam primo & secundo libris methodum tradidit quæ ab accidentibus auspiciabatur, tertio libro incepit partes percurrere, à capite capiens initium atque hoc ipso 4. lib. cognitione sermonis ad symptomata quadam, (vt cū superius de sanguinis sputo differuit) deuolutus est.

Ergo non potest non multa bis dicere. Quod posset fateor si simplici methodo velit insistere Galenus deuitare, sed mihi crede in hoc opere nulla repetitio non est utilis. Ex his quæ hoc loco dicit de succis qui facile aut difficulter reiiciuntur tussi, intelliges merito medicos humores quos ad excreationes præparant modo tenuare modo crassos reddere medicamentis, quanquam eos quos ex reliquo corpore euacuari volunt, perpetuo curent tenuiores reddere.

SVNT aliæ pulmonis passiones, vbi citra humorum affluentiam, intemperies ipsum infestat, siue æqualis ea fuerit siue inæqualis. Igitur inæqualis tussim excitat: æqualis verò, si moderata est, spirationis rhythmum variat. At si vehemens, idque vincente calore, frigidi aëris, atque potionis, cupiditatem inducit, ac tractu temporis finitur

nitur in febrim per frigidam autem intemperiem, contraria euenire solent: quippe interim dum est mediocris, calidi aëris, ac calidæ potionis desiderium excitat: si verò modum excedit, replet viscus ipsum fluxionibus. Cæterum de ea tussis specie, qua sanguis ex ipso reiicitur, vel exeso, vel rupto vase aliquo, vel ore alicuius venæ patefacto, antea, vbi de sanguinis sputo mentionem fecimus, iam dictum est, atque nunc quoque pauca quædam dicemus.

S C H O L I V M.

NON accipitur hoc loco nomen intemperiei æqualis rigidæ vt libello de inæquali intemperie. Nam ita ea tantum intemperies quæ est facta, & in habitu, cuiusmodi hectic⁹ calor, potest esse æqualis. Hic verò non est facta, aut non facta intemperiei mentio, sed aliquanto latius patiente nomine quæ manifestæ inæqualitatis est. inæqualis intemperies dicitur, quæ non manifestæ dicitur æqualis. Solere hæc nomina ita vsurpari à Galeno meminime alio etiam loco dixisse. Rhythmus respirationis, vt ego intelligo, est non vt in pulsu pro portio temporis

poris dilatationis ad tempus constrictionis (quam hic quoque rhythmus possit considerari): sed ut apud musicos proportio motus ad quietem. Quum ergo frigus pulmonis faciat raram, & calor crebram respirationem, ac crebritas & raritas, sit in longitudine, aut breuitate quietum, non possit, non utraque illarum intemperierum rhythmum permutare. Sed cur cum Galenus consideret utriusque intemperiei calidæ inquam & frigidæ duos excessus, alium mediocrem, alium magnum: mediocrē frigoris, dicit afferre calidæ potionis & inspirationis cupiditatem, caloris verò non mediocrem, sed magnam contrariam cupiditatem, frigidæ in quam potionis & inspirationis afferre? An quia ut docet Hippocra. sexto. particu. apho. frigida sunt inimica thoraci? Atque proinde quia frigida per se sunt thoraci inimica, tardius expetuntur alijs paribus, quàm calida, quæ sunt amica? Tussis ut docet Gal. lib. 2. de causis sympt. fit aut cū aliquid incidit in viā spirit⁹, aut irritatio aliqua, aut asperitas, sit in respirationis instrumentis. Hanc vocant greci *κίτρον*. Hanc facit intemperies inæqualis, æqualis verò non facit hanc passionē asperitati similē, proinde quāquā efficiat alia mala, nō facit tussim.

P O R R O' ruptiones in ipsoprehendes, tūm ex multi sanguinis læsione, tūm etiam quòd post magnam ali-

K quam

quam causam quæ antecedit quiddam fieri
 sui manifestum, ac magnum succedat. Vo-
 co autem præcedentes causas, ut cum ex al-
 to, vel in ludo, vel certamine ceciderit, aut
 cum alter super alterum cadit, aut ubi ex in-
 animatis corporibus aliquod graue, ut vel
 lapis, vel lignum, thoracem læsit. Nonnul-
 lis ira cum exclamatione præcessit. Quin-
 etiam citharædis, tragædiisque certantibus,
 acuta, vehementique voce vasa interdum
 dirumpuntur, maximè ubi non præmissa
 pulmonis per præcedentes exclamations
 lenitione, violenter clamare conantur. Ut
 enim luctatoribus, si certamen aggredian-
 tur, musculis prius nec calefactis, nec per
 frictiones, aut moderatas motiones expla-
 natis, partes quædam rumpuntur, atque co-
 uelluntur: ita etiam pulmoni accidere solet.
 Hunc, quia frictionibus ad vehementes mo-
 tiones preparare non licet per exclamatio-
 nes, quæ frictionibus proportionem respon-
 dent,

dent, id efficere studemus. Insuper nulla manifesta extrinsecus adueniente causa, in pulmone quoque vas aliquod ob sanguinis abundantiam dirumpi potest: velut etiam alia quædam corporis pars, cum videlicet extensioni resistit, aut ob frigus à vicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem. Ita Hippocra. venas (inquit) frangit frigidum. Atqui ipsum per se ruptiones non facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddens, ut rumpantur paratiores efficit. Rruptionis verò causa est, aut vehemens motus, aut humorum abundantia qui vel per se, vel una cum crudo & frigido, & flatuoso spiritu venas extendunt. Verùm rruptionis ab huiusmodi haud obscurum inditium præbet, subita plurimicruoris vacuatio. Quum verò venarum ora apeririuntur, non frigida, sed è contrario, calida passionis præcedunt: veluti vbi multis, eisdemq;

calidis balneis, homo utitur : atque terram inhabitat calidam, fueritque anni tempus eiusmodi, similiter alimenta quoque, & potiones. At quæ eroso vase aliquo affatim accidunt sanguinis euacuationes, eas præcedere solent exigua sputa, atque acres in pulmonem à capite fluxiones. Nonnunquam verò & pulmonis aliqua pars, aut crustula simul efferri videtur, ut neminem latere possit, ad pulmonem hanc passionem pertinere, orto verò in aspera arteria ulcere, præter hoc quod sputum purulentum apparet : dolorem quoque in loco patiente laborans sentire consuevit. Ipsum verò per ea, quæ sereantur quia exigua sunt, ab ulcere, quod in pulmone natum est, discerni potest : quippe ab ulceribus pulmonis, plurimum puris reicitur. Atque ut ex pulmone educta particula, ulceris ipsius ulcerationem significat : ita ex summo gutture videmus interdum corpusculum aliquod à ligula

per ulcerationem excreari. Id verò non solum hoc inditio depræhenditur, verum etiam ex eo quòd in ulcerato loco, doloris sensu laborans infestatur: veluti de aspera arteria dictum iam est. Etenim pulmonis ulcera dolor non comitatur: ea verò quæ in iis sedibus oriuntur, dolorem quidem inducunt, sed non vehementem: ut si alicui suapte natura hebes fuerit sensus, ipsum sanè non percipiat. Igitur per sæpe vidimus eas quas iam supra proposuimus, passiones, & quæ pulmoni, & spatio thoracis, & asperæ arteriæ & summo gutturi accidere possunt. Nam & horum, sermonis communitate inducti, mentionem fecimus.

S C H O L I V M.

C O N S V L T V M est, Ut docet ipsemet Galenus libro secundo, de tuenda valetudine, labores quoscunque à levioribus inchoare. Sic enim melius feruntur, ita ergo & in exclamationibus usu

venit. Hippocra. sexto epide. part. tertio frigidum inquit, valde frangit venas & (paucis interpositis) causa duritie. Libr. etiam secundo epide. constituit. tertio inquit, frigidum exulcerat. Rursum hic animaduertendum est, quod capite primo, libri primi. Est enim eodem modo quo illico corruptus codex, scriptumque $\epsilon\pi\iota\gamma\lambda\omega\tau\acute{\iota}\delta\alpha$ pro $\gamma\lambda\omega\tau\acute{\iota}\delta\alpha$. Ligula enim $\gamma\lambda\omega\tau\acute{\iota}\varsigma$, est non, $\epsilon\pi\iota\gamma\lambda\omega\tau\acute{\iota}\varsigma$. Verum hæc illo loco diximus.

Q VAE verò deinceps dicentur nō ita crebro nobis apparuerunt.

Quidam humorem repente expuit, liquidæ bili in colore perquam similem, medium videlicet inter flauum, ac pallidum, ac nulla acredine infectum: atque ita quotidie magnam eius quantitatem expuit: deinde leui suborta febricula, tabescere incœpit, adeo ut purulenta screaret. Postea tractu temporis, quatuor videlicet mensium, exiguum cum pure cruorem reiecit, atque sic aucta febre, magis consumebatur: ac iterum atque iterum plus expuebat, adeo

vt

vt magnam sputi quantitatem redderet: quocirca magis incremente febre, ac resolutis viribus, eorum qui tabe marcescunt, exemplo mortem obiit. Deinde alium vidi eodem ferè modo sex mensibus, ac alium quoque diutius laborantem. Igitur qui primus nobis occurrit, initio quidem nihil mali habere, sed tandem pessime affici visus est. Alterum verò cum conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo, præsentì medicamento succurrere tentauimus. Ac multo etiam magis tertio.

At quamuis multo negotio eos liberare conaremur, nihilominus neque horum vllus, neque alius post eos seruari potuit.

Quum enim morti iam proximi essent, pulmonis ipsius putres quasdam partes expuebant. Proinde facile cognoui, haud absimili eos passione laborare, qualem in externis partibus videre solemus, cum à putrefaciente quopiam humore inficiun-

tur : verum . Has & abscindere , & vire possumus : pulmoni verò horum auxiliorum neutrum adhibere licet . Quapropter omnes perire necesse est . At verò postremum cum viderem , ad visceris fortem exiccationem , sollicito me animo conuerti , & quidem odoribus atque potionibus ad id efficacibus . Proinde medicamentum , quòd hedychroum vocant , interdum naribus ipsius iugiter adhibere iussi . Ad somnum verò sese conuertenti præscripsi , vt narium foramina ex aliquo præciosorum vnguentorum illinerentur , qualia videlicet Romæ præparari solent , vocant verò ea , & foliata , & spicata , Atque dedi in potu medicamenta , mithridaticam vocatam compositionem , ambrosiam , athanasiam , theriacam . Itaque perpetuo anno sic educatus tandem similiter , vt reliqui tabidi , vitam finiuit , quam fortasse , ob iam dictam educationem

nem, longiori tempore protraxerat. Præ-
terea aliam huiusmodi passionem in pul-
mone notavi. Quidam diuturna tussi ve-
xatus, & pauca, eâq; viscida expuens, frustū
quoddam, paruo grandinis grano haud ab-
simile, excreavit, ac deferens illud mihi ostē-
dit, atque rursus non ita multò post, aliud
quoque attulit. Vnde cōieci, lentum illum,
ac viscidum humorem, quem antea expue-
re solebat, ad huiusmodi compagem per-
uenisse. Quamobrem medicamētum ei in-
potu dedi, quod anhelosis auxiliatur. Atq;
ita factum est, vt minorem expueret gran-
dinem, atque longiori, quam antea interual-
lo, nec pluribus deinceps annis adeò mitiga-
ri potuit passio, quin tandem moreretur.
Cæterum grandines ipsæ magna ex parte
eui magnitudinem æquabant, quamuis in-
terdum maiores, interdum minores esse vi-
derentur. Atque alios quoque similiter qui-
dem sperare, sed nihilominus in multos an-

nos vitam extendere vidimus. Quorum alii aliam ob causam, alii verò ob spiritaliū instrumentorum passionem mortui sunt, quamuis nihil cruoris excrearent. Ea verò, quæ Antipatro medico acciderunt nemo est qui nesciat: vt potè qui medicam artem publicè apud Romanos professus est. Agebat hic ætatem sexaginta quidem annis minorem, sed quinquaginta iam annos excesserat. Is correptus aliquando febre quadam diaria, idque ab euidenti causa, declinante iam febre vt quid sibi facto opus esset, intelligeret, pulsū ipse suū tangere aggressus est. Quum igitur omne inequalitatis genus in arteriarum motione inueniret, imprimis quidē territus est: deinde verò cū sese non febrile planè sentiret, illico balneum subiit, quippe laboribus, ac vigiliis corpus fatigauerat. Atque tenui quoque victu, donec diē tertium præterisset, vsus est, quo cū nulla appareret febris, ad solita negotia pertractanda

Standa rediit, atq; arteriam in extrema brachii sui parte tangens: admiratus est perseverantem in pulsibus inæqualitatem. Occurrens itaque mihi, extendit manū ridens, iussitque pulsum tangere. At ego subridēs, quid, inquam, portendit hoc, quod proponis ænigma? ille iterum ridens, obnixè oravit, ut tangerem. Igitur inter tangendum, omnigenam in pulsu inveni inæqualitatem, non solum in multarum pulsationum cumulo, quam collectivam vocant, verum etiam in vna arteriæ dilatatione. Proinde miratus quomodo viueret, cū talem haberet pulsum, interrogavi, non difficilis esset ei respiratio: illo verò nullam se sentire respondēte, observavi equidem, an aliquādo mutaretur: quippe sex mensium spatio assiduè arteriam tangebam. Quinque ab initio interrogaret, quænam corporis passio mihi videretur posse huiusmodi pulsum efficere, atque per quem modum, idque

que citra febrim, ad eam quæstionem respondi. In cõmentariis de pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqualitatem. Nã ob magnarum in pulmone arteriarum angustiam, id euenire putaui. Angustiam verò hanc dixi, ob visceris inflammationem, nunc tibi obortam esse impossibile esse, quippe febre fuisses affectus. Relinquitur igitur vel obstructionem ex liquidis, & crassis, & viscosis humoribus, vel crudi cuiusdam tuberculi ortum, in huiusmodi te passionem induxisse. Tùm ille respondens, oportuisset (inquit) me anhelosa orthopnoea laborare. Probabiliter dixi ipsum loqui, sed nondum verè: quippe cùm ab huiusmodi causa orthopnoea fiat humore crasso, & lèto, non in leuibus arteriis, sed aspera arteria collecto. Proinde omnem ei victus rationem atque medicamenta quoq; , haud aliter, quam anhelosis, adhibere iussimus: deinde sex (vt dixi) mensibus elapsis, leuem quandam

quandam spirandi difficultatem passus est, accedente simul cordis palpitatione. Imprimis quidem semel, deinde bis atque ter, postea quater, ac sæpius quoque aucta simul spirandi difficultate, ad quindecimum usque diem: post quem difficillima de repente oborta spiratione, resolutus statim obiit, aliorum quorundam exemplo, qui cordis passionibus laborant, de quibus posthac sermo nem faciemus.

SCHOLIVM.

EX alijs membris potest incipere tabes aut consumptio corporis. Nam ex affectione vetriculi aut hepatis possit fieri febris hectica atque ad extremum marcor, fitque sæpe ex horum membrorum inflammationibus. Verum fit citissime ex ulcere putri ac sordido pulmonis, quia est in via inspirationis & nimis vicinus cordi, hoc facit ut putrescentis membri calore, lædatur statim cor, ac comparet calorem factum, & hecticam febrem, illud, ut nec inspirationis refrigerio male affectum cor frui possit. Nam cum aer pulmonem pratereat, attingit eo tempore

tempore cor calefactus & infectus. Reliqua omnia
per se sunt aperta satis.

FINIS QVARTI LIBRI.

Liber quintus de LOCIS PATIENTIBVS.

Proœmium.



IN libro qui hunc antecessit, à pul-
monis passionibus exorsus sermo-
nis communitate thoracis & cor-
dis mentionem feci, differens perfectam de
his disputationem in quintum hunc cômẽ-
tarium. Quoniam verò quarti commenta-
rii doctrina finita est in iis quæ Antipatro
medico euenerunt, eius passione primâ af-
fectionem habente in pulmone transeunte
verò in cor, melius esse videtur de omnibus
ipsius passionibus differere.

Cap.

Relectiuncula.

Differit hoc capite de cordis morbis, atque primum omnium monstrat omne mortis genus accidere per malum cordis, quandoquidem in illo est principium vitæ. Docet quoque cor non posse sustinere vlcera, nec inflammationes, ac differit de syncope cardiaca, & de ea quæ accidit per consensum ventriculi, & de cordis palpitatione, ac narrat historias quasdam de hac affectione.



GITVR quemadmodum de cæteris corporis partibus, ita de corde quoque definiendum est, quænam ipsi propriè vel primaria passione, vel vtcunque nominare volueris, superueniant accidentia, quænam verò ipso cæteris partibus consentiente. Id autem ex iis intelligi potest, quæ prius in aliis libris demonstrauiamus, vbi iam declaratum est, innati caloris cor velut fontem esse, neq; animal mori omnino posse, nisi cor patiatur. Quùm itaq; tres sint principes partes, quibus gubernatur animal, (quippe præter cor
dis

dis principatum ostēsum est sensum & motum, vniuersis corporis partibus à cerebro suppeditari, iecur verò nutricis facultatis esse principium) semper mors ad immo-
 cas sequitur cordis intemperantias. Simul enim cum ipso omnes vitiantur partes.
 Quum autem, vt ostendimus, ipsæ peculia-
 ri sua temperie, actiones suas perficiant hac
 pereunte, actiones quoque ipsarum perire
 necesse est, ac proinde cerebri quoque, & ie-
 coris. Horum verò temperie deperdita, nō
 oportet cordis simul actionem perire. Nā
 etsi nec sentiendi actiones, neq; eas quæ ab
 arbitrio procedūt animal retineat, quin nec
 nutriatur, veluti in latentibus euenit anima-
 libus nihilominus viuere ipsū posse, quoad
 cor manserit illæsum, haudquaquam ne-
 gandum est. Et videtur quidem sæpe mul-
 tis deinceps diebus aliquis non intelligens,
 nec sentiens nec motum habens, tamen ad-
 huc viuere. Quemadmodum vbi quis ob
 virium

virium hepatis imbecillitatem non nutritur, diutiùs etiam sufficere potest. Si verò quis cor respiratione priuet statim vitietur. Igitur qui ad spirandi functionē, nihil cōferre thoracem putant, ii causam reddere nequeunt, cur per vehementem apoplexiam, superno duntaxat principio vitiato, laborātes subitò moriantur. At vobis eam inuenire haud difficile est. Vt potè quibus efficaciter persuasum est musculos, qui motio-
nis principiū, à nervis in ipsos à spinali medulla, quæ in ceruice est, delatis, suscipiunt, thoracem attollere, priuatis tunc musculis mouendi facultate, quæ ex cerebro ipsis influere solebat. Etenim nisi ad spirandi functionem ambo principia simul iuncta concurrere oporteret, potuisset aliquis viuere, priuatus interdum superno principio. Igitur ex quibus causis inuenimus, cur patiente cerebro, in vehemēti apoplexia, cor quoque lædatur, ex iisdem ipsis, sed secundum
L alium

alium modum causam quis inueniet, quā-
 mobrem in apoplexia minore, catalepsi, so-
 pore, morbo comitiali, lethargo animal-
 ita laborans non pereat. Namque si diligen-
 ter consideraueris, inuenies per huiusmodi
 passionem, quomodo spirēt laborātes: quip-
 pe videbis & violentam & difficilem spi-
 rationem, perinde ac si vinculo quodā con-
 strictus thorax attolli prohiberetur. Atque
 huius rei sufficientem fecimus mentionem,
 in libris de musculorum motione. Namq;
 similis est hæc quæstio ei, qua de somno
 quidam hæsitant. Quippe cū per som-
 num omnes musculorum actiones exoluā-
 tur, sola actio, quæ ad thoracis musculos
 pertinet, seruatur. Nunc verò ea duntaxat
 dixisse satis fuerit, quæ proposito nostro cō-
 ducere videbantur. Porro qua ratione ho-
 mines per somnum spirant, reliquis mus-
 culis omnibus quiescentibus, eadem quoq;
 ratione per minorem apoplexiam, atque a-
 lias

lias ei vicinas passiones, spirare possunt. Vbi verò vel apoplexia, vel alia quæpiam passio adeò vehementer increuerit, vt musculorũ thoracis actio omnino deperdatur, perire simul respirationem necesse est. Vnde cordis quoque temperamentum soluitur. Quo fit tandem, vt etiam animalis ipsius necessario sequatur interitus. Atque hac ratione per vehementes superni principii lesiones animalia perire videmus.

SCHOLIUM.

OMNE mortis genus ad intemperiem magnã cordis venit: nec aliter potest animal interire quàm nultum intemperato corde. Nam quanquã facultas animalis est à cerebro & naturalis insita singulis membris, tamen suppeditat cor alijs omnibus membris instrumentum quoddam necessarium, calorem scilicet naturalem. Hoc ergo aut per intemperiem cordis extincto, aut præcisione cordis detracto necesse est mēbra omnia viribus suis carere, ac intemperari corrumpiꝫ, ac mori. Verũ hoc perseverante animal non interit, vtcunque membra alia afficiantur. Infert quidem mortem membri cuiusq;

iufque, principis aut præcifio, aut intemperies maxime cerebri, trahitur enim ftatim cor ad compaffionem priuatum ventilatione, aut alimento, aut aliter itaq; præcifo capite emoritur reliquū corpus, quia cor priuatur refpiratione, & per infignes venas & arterias effunditur fanguis & fpiritus. Verūm fi fingas præcifo capite (quāquam eft hypothefis impoffibilis) nihil horum fieri, corpus non eft quod moriatur, quanquā carebit fenfu & motu, quia deerit virtutis illius præcipuum inftrumentum. Nam quod ad reliquum corpus attinet, perinde eft caput præcidi, aut perfectè obftrui, fed finge perfectè obftructum effe caput, refpiratū verò, vi demonis cuiufpiam, aut vtcunq; aliter Deus volet agi, cur inte-reat animal, dum non præ fame intē perabitur cor: certe vt habet membrum aliquod per fe, ita corpus totum. Brachium religatione quinque neruorum in fine ceruicis & principio dorf, priuari poffit omni vi mouendi & fentiendi, tamen non ftatim morietur, nam dum in eo feruabitur temperies viuet, membrum verò fthiomeno affectū caret fenfu & motu, & mortuum eft, quia hoc non habet iam naturales facultates infitas, has enim amifit cū temperamento, & influentes non poteft amplius accipere: illud verò quanquā vi fentiendi & mouendi religatis neruis priuatū eft, tamen folutis vinculis poteft eas recuperare. Viuit ergo, nā quod mortuū eft non poteft reuiuifcere. Ceterū fi confortio eò quod habet cum corde, etiā priuetur brachiū, ligatis etiā arte-

rijs & venis, morietur, amissa tēperie ac simul viribus omnibus, & vita. Sed neq; id, tēporis momēto, sed cū soluta manifeste iam sit tēperies quæ calido innato cōseruatur, quæ nō possit momento tēporis solui. Imò verò possis cū his omnibus vehementer religatis veluti mortuū corpus effeceris, illis festināter solutis in vitā restituere. Id ita habere apertē intelliges, quod & præciso corde vidit Ga. in sacrificijs animalia vociferari, & ingredi. Quæ constat non interiisse (non enim agerentur motu animali) tamen præciso corde. Neq; ergo brachium repentē præcisum, momento moritur, sed vt tēperies, & calor naturalis in eo corrumpitur. Vnde vt hoc quoq; obiter dicam) euident mihi videor capere argumētum, esse in nobis præter rationalem animā aliam altricem quæ corpus ipsum informat, facitq; viuū & idoneū accipere vim animalē, quæ animæ rationalis est (nisi est etiā alia anima sentiens.) Nam in præciso brachio minimo illo tēpore quo nondū naturalis calor extinctus est, sola alrix superest. Nā rationalis vnica, cū nō sit per corpus pducta ac extenta nō possit duo deiuncta corpora afficere. Itaq; manet anima alrix quæ nō potest manere sine calore vitali, nec manente calore vitali, potest perire. Tunc demū homo mortuus est, cū facultates omnes quæ viuentis sunt amittit, quas, nisi pereunte prius calore amittere non potest. Venit itaque omne mortis genus per vitium cordis. Quare rectē Galenus libr. septimo metho. capite vltimo dixit,

si necessitatem spectes cor esse membrum omnium
 præstantissimum, aliter, si actionis nobilitatem,
 nam hac ratione est cerebrum nobilissimum. Ve-
 rùm possit alicui videri falsum, quod modo di-
 ximus, atque oportere iecur vltimo mori, ac pro-
 inde intemperato multum corde posse vivere.
 Nam quod omnium primò generatur, videtur de-
 bere omnium vltimo mori, contrarius enim est re-
 solutionis ordo compositioni. At verò iecur gene-
 rari ante cor indicat fætuum dissectio. Sed hæc ra-
 tio etli videtur probabilitatem per se ferre, non e-
 uertit veram assertionem. Non enim cor necessa-
 rium est reliquis omnibus membris ad vitam pro-
 pter seipsum, sed propter vim vitalem quam tri-
 buit. Ea consistit in calore vitali, iecur verò in fæ-
 tu cum nondum erat cor, erat quidem sine corde,
 sed non sine calore vitali, hunc enim per venam
 & arterias accipiebat influentem à matre, verùm
 in perfectis hominibus non est vnde accipiat, cor-
 de exciso, aut multum intemperato. Quod ve-
 rò Galenus in propositæ assertionis confirmatio-
 nem addit, consideratione indiget. Nam sunt hæc
 verba, et si nec sentiendi actiones, neque eas quæ
 ab arbitrio procedunt retineat adhuc animal, quin
 nec nutriatur, veluti in latentibus euenit anima-
 libus, nihilominus vivere ipsum posse quoad cor
 manserit illæsum, haudquaquam negandum est.
 Primum omnium hoc non debet intelligi de facul-
 tatibus, sed de actionibus. Nam totum animal fa-
 cultatibus

cultatibus omnibus priuatur simul, actionibus non ita, sed potest carere hac ante illam, vt gratia exempli, dum viuit animal non potest carere anima altrice, quæ vis est alendi, tamen non nutriri aliquantulo tempore etſi viuât, vt per eam ægritudinem quam propter ſymptoma appellamus atrophiam, nihil habet veræ philoſophiæ aduerſum. Nam nutritio non eſt ſimpliciter ad vitam neceſſaria ac per ſeſe, ſed ad reparandum id quod perpetuò abſumitur, mors verò non euenit per ſe, quia hoc non reponitur, ſed quia illud aſſumitur abſumptio non potest repente fieri, ſed tempore ſatis magno. Non ergo detractio alimenti potest inferre mortem repente. Male ergo omnes Ariſtotelici vulgares quod de facultate Ariſtoteles aſſerit tertio de anima capite vndecimo, venit quæ intelligendum, vt ego explicui, ad actionem tranſferunt affirmantes non poſſe id quod viuit nutritionem vel tantillum tempus intermittere. Produciunt deinde argumenta quædam futilea. Cuiſmodi eſt illud: primus gradus animatorum eſt quod vim habet nutriendi, veluti reliquorum fundamentum, non ergo potest aliquo modo viuere quod hoc carebit. Sed argumentantur à facultate ad actionem: Quasi verò opus ſit, vt quod potest ingredi, ingrediatur, ac non poſſit quod modo, ſed & eam habere vim. Perperam etiam interpretæ quidam Galeni vbi ego legi actiones ſentiendi, & eas quæ ab arbitrio procedunt, legunt,

facultatem, cum tamen Græce habeatur *ἐναργείας*.
 Itaque Galenus rectè asserit posse quod uiuit non
 nutriri, sed quod in exemplo innuit animalia quæ
 latent in cauernis eo tempore non nutriri falsum
 esse puto. Nam ut Aristoteles obseruauit, atque
 octauo de historia animalium, capite decimoses-
 ptimo affirmat, pinguescunt eo tempore illa ani-
 mantia adeo ut non possint se loco mouere, quod
 sine nutritione non continget. Nutriuntur pro-
 fectò, quamuis cibum non capiant, succis cru-
 dis, quos interius continebant. Quod præter cæ-
 tera profundus somnus atque longus indicat, per
 quem non possunt non agi multæ concoctiones.
 Itaque non admodum cautè Galenus quod non
 vescantur, nutritione carere affirmauit. Iam ve-
 rò quod addit, & videtur sæpe multis deinde
 diebus aliquis neque intelligens nec sentiens nec
 motum habens tamen adhuc uiuere, est proculdu-
 bio præcipitata assertio, ac proinde falsa. Nam
 quo pacto uideri possit semel nedum sæpe ho-
 mo sine sensu & motu uiuens vno die nedum mul-
 tis deinde diebus, cum qui sine sensu & motu est
 careat respiratione. (Est N. respirationis motus anima-
 lis), sine hac re verò, quod ipse mox affirmat statim
 intereat animal. Nec si intelligas Galenum non qui-
 dem rigidè affirmare hæc, sed sine sensu & motu ap-
 pellare eum in quo sola seruetur respiratio, possis
 illud à temeraria assertione vindicare. Nam qui fie-
 ri potest ut sæpe Gal. uiderit apoplecticos homines
 uiuere

viuere multis deinde diebus cū illa tam repente iugulet nisi omnino sit leuissima? Certè cōcepit verum sensum quem incaute falsa assertione confirmauit, ferebatur nonnunquam, quantum suspicor, impetu sermonis. Verus sensus is est, quem ante expressi. Fieri posse vt homo multis deinceps diebus viueret etsi sensu & motu priuatus esset nisi hanc priuationem consequeretur læsio cordis. Verū id quidem re ipsa apparere falsum est. Nam fit necessario vt cor lædatur statim respiratus interceptione. Qua causa dormientes respirent reliquis omnibus musculis quiescentibus atque etiam per minorem apoplexiam dictum à me est supra.

IAM ex iocinoris quoque affectu mori accidit, sed alia ratione, inedia scilicet.

Vnde longiori temporis spacio, in huiusmodi affectibus vitam protelare possunt. Atque mori contingit nonnullus per aliū quoque modum, vt in sincopa stomachi vitio eueniente, & vehementi dolore, & timore graui, & voluptate maxima. Etenim quibus vitale robur infirmum est, animi vero passiones ob imperitiam fortes, iis ani-

mæffentia facilè diffolui potest, atque horum aliqui ob mæstitiam interierunt, sed non ilico, vt de superioribus diximus. At vir magnanimus neq; ob mæstitiam, neq; ob aliam aliquam animi egritudinem mæstitia fortiozem vnquam succubuit: vt pote cuius animæ robur validum est, passionēs verò non adeò vehementes.

SCHOLIUM.

NON omnes qui vitio hepatis pereunt, præ inedia perire verum est, sed eos tantum quibus illud præcipium mali caput est, quod actione iecoris priuantur, vt qui atrophia vocato malo vitio iecoris laborant. Verum qui præ inflammatione iecoris moriuntur, non inedia moriuntur. (Durarèt enim plus tēporis). Sed maligni morbi vi. De causis sincopes Gal. disputat satis diffuse lib. 12. meth. atq; à me lib. 5. controuer. multa disputata sunt, illinc ergo pete.

CAETERVM propria quoque passione cor laborare solet, vel ob simplicem intemperiem, siue inæqualis, siue

siue æqualis ea fuerit: vel inflammationem, vel erysipelas, idque dum fieri incipit. Illico enim antea quàm augebantur huiusmodi passiones animal corrumpitur. Atque has passiones rursus cardiaca sincopa sequitur. Quemadmodum quæ stomachi vitio fiunt syncopæ, ad eas passiones. Quibus os ventriculi (stomachum nonnulli appellat) infestatur, sequi solent. Verùm hæ consentiente corde veniunt porro vtriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones, aut à fortitudine taxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erysipelate, aut inflammatione, aut alio quopiam præternaturam tumore fieri solent. Igitur exiguæ quidem cordis intemperantiæ, pulsus arteriarum, pro sua quæque natura variant: de quibus in libro de pulsibus iam dictum est. Maiores verò per proprias quidem similarium partium intemperies subitam mortem non inducunt, per eas verò quæ ad instrumentales partes pertinent,

pertinent, subito, enecare possunt: sed præcedentibus prius signis quibusdam, quorū vnum ab Hippo. dictum est: qui sæpe & multum exoluuntur sine causa manifesta, hi repentiè moriuntur. Est & alia passio, palpitatio videlicet cordis, aut per se eueniens, aut cum significatione quadā: quod in humore cor ipsum moueatur. Neq; enim mirum videri debet, tantam humoris multitudinem cumulari aliquando in ambiente cortunica, vt ipsum, ne attollatur impedire possit. Quippe in animalibus dissectis vidimus plerūque plurimum humoris vrinæ speciem referentis, in eo, qui ipsum inuoluit, panniculo cōtineri. Etenim simiæ quædam cum emaciari in dies videretur, eam tamen necessariis nostris negociis impediti secare in tempore non potuimus, post mortem verò reliquis corporis partibus omnibus illæsis inueniuntur in ambiente cortunica tumor præter naturam, humorem in se

se continens qualem pustulæ hydatides emittere solēt. Atq; in Gallo quoq; vidimus aliquando cordis tunicam huiusmodi scirrhoso tumore affectā, perinde, ac si plures crassæ mēbranæ inuolute altera alteri fuissent: verū in eo nihil humoris cōtinebatur. Vnde verisimilis cōiectura elicitur, homines etiam similibus posse passionibus infestari. Inflammato autem manifestè corde gladiatores vidimus, haud aliter quàm qui cardiaca sincopa pereunt obisse. Igitur si ad ventrem cordis vulnus aliquando penetrauerit protinus magno cū sanguinis fluore hominem mori necesse est: idque præcipue si sinistræ partis venter fuerit vulneratur, si verò non ad ventrem vsque pertingat, sed in cordis substantia persistat vulnus, ex ita affectis aliqui non solum ea die qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte viuere potuerunt: qui oborta deinde inflammatione extincti sunt. Atque etiam

hi

hi quãdiu vixerunt mentes cõpotes inuenti sunt. Vnde euidens testimoniũ sibi sumere potest ea secta quæ negat rationalẽ animæ vim in corde consistere, palpitatio autem visceris huius pluribus integra valetudine degẽtibus, tũm adolescẽtibus, tum adultis subitò, sine alio manifesto accidente euenire visa est, atque omnes eos sanguinis detractio iuuat. Atque hoc accidente planè liberati sunt, qui post sanguinis missionem vsi sunt, victu & medicamẽtis, quibus esset extenuandi facultas. Horum verò nonnulli, quos rursus huiusmodi accidens infestabat, simili curatione sospites euaserunt. Cæterũ noui quendam quotannis verno tempore huiusmodi palpitationis accidente vexatũ, qui cũm per tres annos à sanguinis distractione se adiutum intelligeret, anno quarto, antea quam accidens ipsum inuaderet, sanguinem misit, idq; pluribus deinceps annis faciendo, idonea etiam post sanguinis detractiõnem

ætione medicamenta adhibuit. At nihilominus hic quoque ante senectutē morte præuentus est, sicut & reliqui omnes, quorum alii quidem per acutas febres alii verò cū sani degerent, affatim sincopa perierunt intercepti. Quāvis vnus vel duo citra sincopam alia quadam mortis specie perierint. At verò sic patientiū magna pars ætatem agebant, quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ quadraginta annos excederet. Porro panniculus cor ambiens quomodo cunque passio sit, nisi inflammatione infestetur, inter ignobiles partes reputatur. Quocirca ipsius dispositio per consensum ad cor transcurrit. Cū enim ipse solus patitur, exemplo reliquarum omnium partium, quæ ad custodiam, & tegumentum cæterarum nobiliorum factæ sunt, nullū affert periculum. Cæterum nulla à corde spirandi difficultas oritur, præter eas quas in priori libro diximus, cū de Dyspnœa sermonem

sermonem haberemus. Etenim insuper cal-
factum spirationem effecit magná & den-
sam, atque celerem, ac calidum insuper spi-
ritum reflat. Contra refrigeratum, exigua
reddit respirationem & raram.

S C H O L I V M.

DVBITE T aliquis qua ratione nō repugnat
Ga. sibi ipsi dicens, maiores verò per proprias
simplicium partium intemperies subitam mortē nō
inducunt Per eas verò quæ ad instrumentales per-
tinent subito necare possunt, cū lib. de diff. mor-
borum dicat intemperies omnes esse partium sim-
plicium, compositarum verò morbos in compositio-
ne: vocat Gal. hoc loco intemperies pertinentes ad
partes cōpositas, siue instrumenta, eas quæ non
sunt nudæ, sed fiunt à succo aliquo, qui simul mor-
bum in compositione facit, huiusmodi sunt tumo-
res præter naturam omnes, & omnes obstructions.

Cū tanta sit cordis necessitas ad vitam vt vi-
talis facultatis sedes sit, & vitalis spiritus contineat,
non mirum, si neque vlcera neque inflammationes
possit sustinere, sed neque mirum est posse per diē
& noctem viuere animal vulnerato corde, nisi vul-
nus penetret in ventriculos cordis, non enim spirat
repentē

repentè vitalis illa flamma (spiritus & tenuem sanguinem intelligo) nisi penetret, atque vt noxa citius in caua cordis penetrat, ita citius vitale robur extinguitur, vt non careat probabilitate quòd multi venatores affirmant, citius expirare animam ceruos & sues, atq; talia animantia, si sagitta veneno intincta pulmoni infixata sit, quàm si cordis carni, delato scilicet celerius veneno ad cordis caua.

CAP. II.

Relectiuncula.

Differit hoc capite Gale. de morbis ad thoracis ipsius partes pertinentes, docetque distinguere veram pleuritidem à non vera, ac dignoscere, an in musculis inter costas consistat inflammatio, an in membrana succingente costas. Docet etiam qua ratione succus eò loci in inflammatione conclusus, & pus quòd est intra thoracem possit tußi reijci per os, ac refutat de ea resententiam Erasistrati, proferens illius verba.



AT QV E huic quoque parti, vel primario patiēti, vel aliis consentiēti. Quemadmodū reliquis omnibus passiones quædā superueniūt, quas respirationē ledere necesse est. Quippe propriū respirationis organū eā esse iā demon-

M stratum

stratum est. Igitur vbi dolorificis passionibus molestat, exiguā densamq; edit respirationē, veluti cōmentationibus de difficultate spirationis ostēdimus. Id verò & vicinis quoq; partibus, & iis quæ simul mouētur passionibus euenire solet. Nā diximus antea de spinæ passionibus, respirationē interdū lædi, thorace propria passione nequaquā laborāte, sed vel neruo quopiā à spina procedēte, vel spina ipsa patiente. Earū verò, quæ propriè ad thoracē pertinet passionū, quēdā in ipsius musculis quēdā verò in mēbrana succingente costas consistunt. Nā de his passionibus quæ vel in cute, vel in costarū ossibus cōsistūt, hic agere nō proposuimus in quibus locus patiens sensibus subiiciatur. Igitur cū ex musculis alii spatium intercostalia vocata repleant, alii verò extrinsecus extendātur, dolorificę externorū musculorū dispositiones, vt vlcera, contusiones, abscessus, erysipelas, inflammatio, haud

haud difficulter à medicis manū adhibenti-
b9 discernūtur. At intercostalib9 musculo-
rū inflānationes eorū maximè, qui in ima-
pte cōsistūt (duo N. vt scitis sunt huiusmo-
di musculorū genera) tactu cōsequi nō pos-
sumus atq; hi grauiori, quàm externi dolo-
re cruciātur, ac fluxionē, quæ inflānationē
induxit, at interna per eā quæ costas cingit,
membranam transmittūt, quàm tunc pari-
ter cūm ipsis inflammare necesse est. Velu-
ti rursus vbi ipsa aliquando primaria pas-
sione infestatur, intercostalium musculorū
partes internę, similiter ei consentiunt. Ve-
rūm exquisita pleuritis fit, vbi cingens co-
stas membrana primaria passione laborat.
Proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præ-
cordia peruenire potest: ad iugulum quidē
superioribus eius partibus patientibus: ad
præcordia verò vbi inferiores patiūtur. At
que vehemēs quoq; febris huiusmodi inflā-
nationē perpetuo sequitur quia sedes pa-

tiēs, & parum distat à corde, & cùm pāniculo ipsū involuēte, ac septo trāsverso cognationē habet. Cæterūm patiatūr nē magis cingēs mēbrana, an mūsculi ipsam contingentes, à pulsibus inditiū petere oportet. Nāq; mūsculi minus, cingēs verò mēbrana magis & tēdit, & indurat arteriā. Vt in peripneumonia nulla penitus apparet, huiusmodi durities. At effusa in spaciū thoracis sanies in asperas arterias pulmonis trāssumitur, deinde tussiedo excreatur, qualis sit, qui inflammationē fecit, humor, declarās, an videlicet biliosus, aut melācholicus, aut pituitosus, aut cruētus. Etenim si bilis abundat, pallidū, aut flauū, si atra bilis nigrum: si pituita spumofum & cādicās: si sāguis, rubrū spūtum reiicitur. Quòd verò tussiendo ex thoracis spatio aliquid interdum spuatur, facile intelliget is qui eas dispositiones cōsiderauerit, quibus ab exterioribus, ab intima pectoris vlcus penetrare contingit, siue id

ob vulnus non cōglutinatū eueniat, siue ob
magnum abscessum vtrinq; eruptum, vel
perinde dissectū, ac si externas duntaxat par
tes afñceret, facta deinde sectione, inuenia
tur cingēs costas membrana erosa, aut costa
ob sphacelum (id est cariem) excisa, aut eò
quòd medici cingentem membranam, vt
pote erosam, putrescentēmq;, seruare illa
sam non potuerunt. In omnibus iam pro
positis dispositionibus, si aqua mulsa in tho
racis spaciū infundatur, mox tussiedo ex
puitur, laborans ipse aquam mulsam esse,
ex sapore depræhendit. Quo pacto autem
hoc fieri possit, atque per quos meatus ipsa
in asperam arteriam ingrediatur, perpende
re debet is, qui errorem illum in quem mul
ti in causæ inuestigatione inciderunt, effu
gere voluerit: ii namque ex thoracis spacio
in pulmonem quippiam recipi, impossibi
le esse iam sibi persuaferunt, fortasse ita se
sentire simulantes, ne videantur dere qua
M 3 piam

piam dubitare. Cæterum credere oportet huiusmodi fieri transsumptionem: quippe per vulnera haud obscure apparet. Deinde quo pacto ea fieri possit, inuestigare, ut quum inuenerimus, animo simus quietiori. Sed inter quærendum, quandiu nihil nos inuenisse putauerimus, ruditatem potius nostram accusare, quàm veritatem ipsam negare debemus. Atque videmus etiam conglutinatis cruentis vulneribus, in sputo notas quasdam fluentis ex vulnere cruoris, ad spatium quod inter pulmonem est & thoracem. Præterea suppurati in hoc ipso spatioso continere, & ipsum spueri haud obscure videntur. Atqui rationi consentaneum est, ut eodem modo tum cruor, tum pus ex thorace spuat. Quorum viam inquirens Erasistratus incredibilia quædam scripsit in eo libro, cui titulus de Sanguinis educatione est, sub hac verborum serie: Via autem per quam incedunt, ea quæ ab iis sedibus

sedibus reiciuntur, huiusmodi est : Ab ea arteria quæ spinæ adiacet, vasa quædam ad vtrunque latus, tam dextrum, quàm sinistrum similiter procedunt deinde in loca vicina, multiplici diuisione dispersa, tandem adeò euadunt exigua, vt sensum lateant. Quum itaque sanguis in huiusmodi arterias inciderit, nonnunquam per concavam arteriam, ad loca quæ circa pulmonem sunt, atque ad eos nexus per quos pulmo apud spinam arteriæ coniungitur, ascendit. Quippe ea quæ huc inciderint, hac via ad pulmonem ascendere solent. Verùm quomodo ex pulmone deinde reiciantur, antea dictum est. In his verbis manifestè declarauit Erasistratus, eas arterias quæ à magna arteria ad singula intercostalia loca procedunt, per ora quæ ad inflammata partem perueniunt, sanguinem suscipere, ipsumque ad magnam arteriam, quæ à corde orta, per

M 4

spinam

spinam extenditur, referre, atque ab ipsa rursus, ad ea loca quæ circa pulmonem, sunt, transitum fieri. Sed neque modum quo huiusmodi transitus fiet, neque viam explicauit. Verum deinceps scripsit. Atque per eos nexus, per quos pulmo arteriæ circa spinam adheret: fit enim (inquit) hac quoque via, eorum quæ inciderunt in pulmonem, ascensus. At quomodo & per quæ conceptacula id fieri possit, non ostendit. Proinde manet adhuc eadem quæstio nihil planè ad ipsam dissoluendam afferente Erasistrato. Quamuis ut in cæteris libris omnibus, ita in hoc ipso, de sanguinis educatione, perspicuam pollicitus fuerit interpretationem. Quocirca multò magis vitiosum quispiam huiusmodi sermonem reputauerit, ut pote qui ipsi quoque Erasistrato fuerit suspectus. Apparet itaque ex industria eum voluisse obscuris uti sermonibus, ut aliquid dixisse videretur, cum nihil diceret. Atque hoc in loco, quæstionis

quæstionis enarrationem dereliquit. Nam quomodo sanguis ex lateribus quidem ad magnam arteriam perueniat, manifestè declarat. At quomodo rursus ab hac ad eas sedes, quæ circa pulmonem sunt, ut ipse dicebat, ascendat, haudquaquam exposuit. Constat etiã ex eo quod dixit, loca quæ circa pulmonem sunt, cum dicere pulmonem potuisset, eum haud inuitum sermonis obscurationem affectasse, id quod postea declarauit, dicens : ex pulmone autem quomodo ad educationem ascendat, iam antea dictum est. Perinde enim ac si in pulmonem ex magna arteria sanguis iam delatus sit, quomodo inde reiciatur, velle nos admonere videtur. Quod verò de expuitione quæ ex pulmone fit, iam antea dictum sit, non ignoramus, ac perspicuam fuisse enarrationem testificamur. Verum optaremus ut de ea, quæ ex magna arteria in pulmonem fit, transsumptione dixisset. Quemadmodum cum in-

5 M quit,

quit, per eos quoque nexus per quos pulmo arteriæ apud spinâ coniungitur, fieri circa pulmonem sanguinis reiectionem. Ne hîc quidem quos nexus dicat declaravit. Etenim si velex membranis vel fibris consistant, ad sanguinis in magna arteria contenti, in pulmones delationem nihil conferunt. Quippe necesse est ex arteria oriri vasa quædam per quæ sanguis in pulmonem transferatur, quemadmodum Erasistrati secta hoc ipsum per arteriâ pulmoni substratâ fieri autumat. Huius enim arteriæ extreme partes, & quidem exiguæ, ad asperâ arteriam transire videntur. Atqui ipsa quoque ex magna arteria, antequam ad spinam perveniat initium sumit. Itaque duplici quadam ratione, Erasistrato ab hac arteria auxilium suppeditare conantur sectæ ipsius professores. In præsentia quidem ad sanguinis ex thorace educationem, alibi vero ad inflammationis in pulmone generationem, nã & hanc

hanc obiiciunt eis, qui aliter sentiunt, ut potè quam ita, ut Erasistratus docuit, fieri sit impossibile. Namque ubi docet quomodo fiat inflammatio, putat incidentem in arterias sanguinem, spiritui, qui à corde deferatur, obuium fieri, atque sic ad extremas arteriarum partes repelli, nisi vulneratæ aliquando quædam arteriæ, vacuato ex ipsis per vulnus spiritu, ex ea quæ ad vacuatum spiritum fit sequela, sanguinem suscipiunt. Hac itaque ratione non posse fieri inflammationē in pulmonis arteriis dicunt. Quippe si aliquando sanguis in eas inciderit, nulli ipsum spiritui obuiare, quod in solas pulmonis arterias, nullum à corde ferre spiritum Erasistratus contendat, quamvis reliquas arterias omnes à corde spiritum suscipere fateatur. Verùm è contrario, ipsas cordi spiritum suppeditare, quem per inspirationem ab asperis leues arteriæ suscipiant. Hanc igitur arteriam, quæ à maiori
arteria

arteria spinæ incumbenti, in pulmonē fertur in inflātionem in extremis partibus sustinere, atq; vt sanguis ex thorace reiciatur, effīcere dicūt Erasistrati sectatores. Sed inflātionis rationē hoc in loco tractare nō proposuimus. Cæterū quod ex magna arteria, in pulmonē sanguinis transsumptionem fieri Erasistrati sectatores dicunt à veritate deuiare videtur, imprimis enim sanguinē ex intercostalibus locis in magnam arteriam ferri impossibile est, quippe à spiritu, qui à corde per magnam arteriam ad hæc loca transmittitur, repulsus illico reuertetur. Si concesserimus autē hoc ita fieri, ac demus in magnā ipsam arteriam deferri multò absurdior ex Erasistraticæ sectæ fundamentis sermo euadet, etenim spiritū saluantem incursionis impetum, à corde in hanc arteriā expressum, in totū deferri corpus, per ortas ab ipso arterias autumat, perinde ac si ex vna arteriæ constrictione spiritus

tus ad extremas pedū partes peruenire possit, veluti à vehementissimo vento, delationis celeritate fieri putans. Quod verò tanta vehementia, sanguinē in magna arteria cōtentum, ad quālibet corporis partem non impellat, impossibile est. Neq; vlla ratione dici potest, ipsum in vnā arteriā quę in pulmonem feratur cōpelli: ita enim is impetus mentis sit particeps, atq; intelligat, qua via quā facillimē vacuari possit. Id ipsum verò rursus pugnare videtur, cū præsenti sermone qui sanguinē quā celerrimē vacuari per asperam arteriā concedit. Nam si tā facilis est per extremas harū arteriarum partes transitus, vt incidens in ea sanguis, tā celeriter vacuetur, fieri nō potest vt impactus, inflammationem excitet: eò quòd impingi, & excidere, inter se sunt contraria. Id verò multò maiori admiratione dignum est, quod cum Erasistrata. quam diligentissimē deinceps de puris vacuatione conscribat, si-

ue

ue id in pleuriticis, siue in suppuratis contineatur, ipse pugnam hanc, qua videlicet sermones eius, tū in nobis, tū in reliquis hominibus omnibus inter se certare videntur, nō intellexerit, ea facile depræhendetur, si sermonē eius, qui ad verbū sic se habet, hic subscripserimus. Atque in his ipsis passionibus, plurimi interdū puris excretio fit: causa, venarū natura est, quā si perpendere oportet: magna quēdā vena ex corde nascitur, adiacēs spinæ, ac in eo loco, vbi à vertebra septum trāsuersum nascitur, finē accipit, ab hoc verò, venæ quæ ad latera extensæ sunt, atque arteriis adiacent, oriri videntur. Igitur cum vel vlcus, vel abscessus, in his locis euenit, multū puris congregans, id quidē haud facile ad spatiū quod inter latera & pulmonē est, effundi potest. Quod succingens latera mēbrana nervosa est, & fortis, ac diuidi contumax: proinde coërcetur ad vasa mēbrana intrinsecus subiecta. Cum itaque te-

nuis magis, ac imbecillior vena sit quàm arteria, hæc vasa priùs diuiduntur quàm ipsæ arteriæ, atque per has diuisiones, pus effunditur in venas : per inferiores verò sedes pus deiici non potest, quia ad eas venarum natura non peruenit, sed finē sortiuntur, vt dictum est, circa septi transuersi ortum. Cū semper autē continuæ sedes repleantur, vt per superiores meatus exitum capiat necesse est. Perpendenda igitur est actio, quàm pulmo inter respirandum efficit, ac quomodo, tum spiritum tum humores, & attrahit, & expellit, quippe eodem modo pus à lateribus ad pulmonem ascendere solet. Sed quomodo demum à pulmone reiiciatur, antea dictum est. In hoc sermone quod pus in venas transsumptum est, non possit ad loca, septo transuerso inferiora peruenire, rectè ab Erasmo dictum est, vt potè vena, quæ octo inferioribus thoracis costis alimentum præbet. Non enim omnes alere potest, ad septum transuersum perueniente

ente: neque enim in præsentia contēdere velim, an exigua aliqua eius particula inde exiliat. At quomodo huiusmodi pus expuatur, neutiquā dicere aggressus est: similiter nec sectatorū eius quispiā. Neq; enim quēadmodum arteria quandam à magna deductam in pulmonē ferri affirmant, ita de vena dixerint, etenim arteria, tametsi non manifestè in viscus ipsum ramis distribuitur, ei tamen subterni, atque ad asperam vsque alteriam ramusculos emittere videtur. Verū à magna vena, quæ spinæ incūbit venam aliquā in pulmonē transire, neque nos vnquam vidimus, neque dissectorū quisquā scripsit: ac nec Erasistratus quidē id affirmare ausus est. Quippe inter omnes convenit, quod à dextro cordis ventriculo, per vnum duntaxat vas, pulmo sanguinē recipit. Oportet igitur pus quod à costis in eā venam, quæ spinæ adiacet, imprimis quidem peruenire ad cor, deinde ad venam quæ ab

hoc

hoc orta in pulmonē transit, postea ex hac in asperas arterias, quæ per ipsum dispersæ sunt trāssumi: postremò tussi indigere quæ scilicet ipsum vsq; ad os efferre possit. Quo autem pacto puris sanguini permixti, ab ipso fiat secretio, tanquam exiguum quippiam ac vulgare, & quod ad vniuersam ipsius rationem firmandam parum conducatur, præteriens dixere neglexit.

S C H O L I V M.

OMNIA intestina mouentur simul cum septo transuerso ad respiratum, vt hac ratione inflammatio etiam in illorum aliquo, consistens, possit respirationem parua & crebra facere. Et vt respiratio, quantum ego opinor, ad descensum ciborum, & delationem non parū conferat. Musculi thoracis sunt duplices, quidā habētes principiū extra thoracē & in thoracē ipsum delati ac inserti, venientis ex lumborū vertebra, ex collo, ex clauicula & spatula, quidam à costis ipsis nati, & in ipsas costas inserti per spatia media, qui propterea, intercostales appellantur. Horum etiam sunt quidā externi, quidam interni, nam alij alijs substant. Omnes musculi thoracis sunt expositi tactui, vsq; adeo

ut cùm inflammati sunt, compressi doleant, præter intercostales. (Nam duo: musculos qui interius sunt triangulorum formas referentes,) soleo ego intercostalibus internis annumerare.

N A M neque hoc dicere quisquã possit, sanguinẽ qui continetur in ea vena quæ circa spinam est¹, ad conferri. Nam contrarium prorsus dicendum est venam hanc à dextra cordis auricula oriri, ac simul cum ipsa sanguinẽ commeari partes omnes thoracis circa octo costas nutrientẽ, etenim superiores quatuor, non ab his, sed à vena ad iugulũ ascendẽte, quæ à medio loco inter cor & iugulũ exoritur, nutrimentum suscipiunt. Præterea & hoc quoque non minus absurdum ad Erasistrati verba sequitur. Nam pus quod à supernis quatuor thoracis costis, in concavã venam refertur, maximè quidẽ ad eas venas ducetur, quæ ad cervicem & scapulas, & caput, & manus, imò potius ad universas animalis partes perveniunt. Hæc sunt

sunt ferè absurda quæ ad Erasistrati scripta sequi videntur. Accedit ad hæc, quod causam in hac perpensione penitus non attingit : dicens enim , non facilè pus effunditur in spatium, quod inter costas est & pulmonem , quia succingens costas mēbrana neruosa sit, & fortis, atq; diuidi contumax, pus aliquando in hoc spatium effundi posse , non negauit : quippe qui neruis suis non facilè addiderit. Debit ergo dicere id quanquam non facilè, tamen aliquando fieri , deinde viam ostendere qua suppurati pus spuerere possint. Vt enim ex his non paucos perire, ita & alios quamplurimos seruari vidimus. Quorum si quis per singulos dies recti puris quantitatem collegerit , interdum sex, aut octo heminas interdum decem, atque interdum plures tantam summam æquare inueniet. Ceterum id quòd quam creberrimè dicere consueui , nunc quoque dicam, quod mul-

ti medici rerumque manifestè videntur
 causam reddere nequeunt, eas esse om-
 nino negant, quamquam (vt dixi) omnes
 quotquot in thorace vulnerati sunt, in-
 iectam per vulnus aquam mulsam, illi-
 cò expuere solent. Nonnulli etiam me-
 dendi modo & qui cruentis adhibetur &
 glutinatorio dicto haud paucis perfora-
 tionibus curati, imprimis quidem die-
 bus purulenta quædam expuunt, nisi re-
 ctè ac exquisitè, vniuersus sanguis per vul-
 nus (quatiendo videlicet hominem qui sic
 vulneratus est) fuerit effusus. At verò mem-
 brana costas succingens & valida est, &
 neruosa, ac diuidi contumax. Sin autem
 moles, adde sermoni etiam membranam
 pulmonem ambientem eandem cum illa
 naturam habente: eoque liquores in vacua
 thoracis infusus hæc quidem non trans-
 mittit, illa non transsumit. Itaque ad eun-
 dem modum dices cutem membranis esse
 multo

multò fortio rem, atque crassio rem in fracturis ossium callo obducendis sanguineū humorem, quominus per ipsum penetrando egrediatur prohibere possit: Hunc tamen in nonnullis videmus adeò copiosè effundi, vt tota etiam ligamenta possit irrigare. Quòd cū ita fieri videamus, idem haud absurdè per tenues quoque mēbranas fieri fatendum est. Atq; satius fuisse Erasistratum non de hac re dubitare, sed id potiùs abundanter intelligere, quomodo humor inter thoracem & pulmonem contentus, in asperas pulmonis arterias recipiatur, ad leues verò arterias, atque ad venas, peruenire non possit. Nam & ipso Erasistrato autore, tria hæc vasa simul extenduntur, atque simul diuisa terminantur suo extremo quodlibet ore, in adiacentem pulmoni membrana. Cū ergo tria hæc ora inter se proxima sint, cur in vnum duntaxat fiat transumptio, quæ-

N 3 rere

rere debuit Erasistratus. Nam longè præstantius erat ea quæ fiunt, quomodo fiant quærere, quàm quòd fiant negare. Quamquam neque dubia neque inuentu difficilis mihi videtur, corû quæ in thorace continetur, in pulmonem receptio, quæ quidẽ in asperæ arteriæ partibus extremis fieri potest, quippe quæ non adeò angustæ sunt, ut leuiû arteriarû atq; venarû partes extremæ, Atque quòd magna ex partè asperarû arteriarum essentia, cartilago est, quæ concidere atque concludi omnifariam non potest: quòd etiam earum, quam duorû vasorum reliquorum, ora multò sunt ampliora. Cùm igitur ipsorum circa pulmonem diuisiones numero sint æquales: rationi consentaneum est, asperæ arteriæ veluti ramos, reliquorum duorum generum partes, proportionem superare. Id verò manifestè apparet per visceris ipsius dissectione, nã vicina quæquæ vasa eandẽ inter se seruat

in magnitudinis excessu proportionẽ, quã ab initio maximè eorũ partes habere cõspi-
ciuntur. Hæc sunt quæ dicere debuit Eras-
stratus, ac deinceps, utrũ inspirationis, an re-
spirationis, an quietis tempore pus ex tho-
racis spatio in pulmonẽ recipiatur, explica-
re: ac deinde cũ id neq; per inspirationẽ, ne-
que per quietẽ fieri docuisset, ostẽdere ipsũ
spirationis tẽpore recipi: id q; facillimũ erat
demonstrare, ei cui prius persuasũ esset, respi-
rationis actionẽ ad thoracẽ p̄tinere, pulmo-
ne nullã propriã habẽte motionẽ, quippe p̄
consequentiã dilatato thorace pariter attol-
litur: eo verò cõstricto ipse spõgiarũ exẽplo
quas manibus exprimimus, in se se residere
solet. Etenim hoc pacto p̄ magna vulnera
fibra ipsius per vulnus p̄cidere videtur. Ve-
rũ citra vulnus, thorax vehemẽter cõstrictũ
humorẽ q; in eo spatio q; inter ipsũ, & pul-
monẽ est, cõtinetur in asperas ipsius arterias
comprimẽdo cogit, nec credas velim, huic

orationi vehementer frustrâ fuisse insertû, nisi enim vehementer admodû, thorax pulmonem ex omni parte comprimit, humor in asperarû arteriarum ora recipi non poterit. Quamobrem natura, quo robustior fieret expressio, tussi vocata, donauit animalia. Quæ cûm naturale sit accidens, & sternutamentum, & singultum, & nauseam, similitudine quadam iimitatur, de quibus in libro de causis accidentium satis dictum est. Verûm quia viribus opus est, quibus huiusmodi accidens naturale excitetur, cõtingit creberrimè per suppuratas passiones, mori laborantes, prostratis antea viribus, quòd à validissima thoracis constrictione eadẽq; celerrima, tussis excitatur, atque vires imbecillæ, neque validæ neque celeriter agere possunt. Ergo de spuitione quæ ex spatio thoracis procedit, satis fuerit hæc dixisse, redeamus igitur rursus ad eum quẽ ab initio proposuimus sermonẽ.

Sanè

Sanè quæ in succingente costas membrana, ac musculis illi continuis, fiunt inflammationes morbum quem lateralem vocant efficere solent. Huius accidentia inseparabilia sunt: febris acuta, dolor, perinde ac si locus vel intédatur, vel pungatur: spiratio frequens, & exigua: pulsus parvus, arteriam & duram & quodammodo tensam indicans: tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his. Has incoctas pleuritides nominant, quæ vel celeriter hominem rapiunt, vel longo temporis spatio finiuntur. Ac dolor modo ad iugulum, modo ad præcordia peruenire videtur. Sunt præterea alii laterum cùm febre dolores, per quos spirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, vt in ea re nihil à pleuritide sine sputo constante, differre videatur. Verùm hi facilè ab illis discerni possunt. In his enim nulla omnino tussis est: illi verò qui sine sputo pleuritide laborant

N 5

laborant, sicca tussi molestantur: deinde quod neque tensionem, neque duritiem ullam refert pulsus: postremo quòd nõ equè acuta feбри laborant, neque adeò difficulter spirant. Sunt etiam nonnulli, qui perisso extrinsecus inflammato loco dolere sese fatentur. Atque iiper sputum non purgatur, quia ab initio nihil eius succi qui inflammationem excitauit, ad thoracis spacium peruenire solet. At concocta inflàmatione, nisi pus prius discutiatur, ad cutem vsque attollitur atque inciditur.

S C H O L I V M.

VENAM sine coniuge appellat hoc loco Gal. venam quæ circa spinam est. Nam hæc nutrit partes circa octo costas inferiores. Verùm illa non oritur, quòd Gale. videtur inuere à dextra auricula cordis, sed à caua, supergressa iam cor, neque putes velim Gale. negare sanguinem eum qui continetur in vena sine coniuge posse retrocedere versus cor. Nam non dubium est posse illum præter naturam ita ferri, neque enim verum est, vt alibi ostendimus quòd

quod quidam commenti sunt, esse inquam ostiola
 quædam à natura, principio venæ illius affixa quo-
 minus quicquam ab ea recurreret. Quid ergo est
 quod Gale. dicit? Certè nihil aliud, quàm sangui-
 nem non solere secundum naturam à venâ illa ver-
 sus cor ferri, sed contra rursus venam illam ferri.
 Nam utitur verbo illo *παρὰ φύκιναι*, id est secundum
 naturam fieri aut contingere.

CAP. III.

Relectiuncula.

Docet toto hoc capite paraphrenitidem, quæ ex in-
 flammatione septi transversi ortum habet à vera phre-
 nitide, quæ est cerebri affectio propria, distinguere. Fit ea
 distinctio per respirationem quæ in phrenitide est magna
 & rara, & in inflammatione septi diuersa, ac inequalis: &
 per signa antecedentia vtrumque malum.



TERMINVM quo thoracis
 pars inferior finitur, antiqui phre-
 nas (id est mentem) appellauerunt:
 siue simpliciter de ipsis in animum venerit,
 siue (vt aliqui putant) quia eo inflamma-
 tione affecto, mens quoque lædatur.

A' Platone autem diaphragma vocari incepit: qui sanè & ipse aliis veteribus similiter, phrenas appellauit. Putat autem hunc in animalibus vsum habere diaphragma, vt irascibilem animæ vim in corde contentâ abs appetitoria, quæ in iecore sedem habet, septo distinguat. Postea Medici neglecto prius nomine diaphragma ipsum appellare consueuerunt. Id quod in dorsali quoque medulla eos fecisse constat. Quippe huic quoque hoc propriæ substantiæ nomen medulla est, quemadmodum instrumentum cuius nunc mentionem fecimus phrenes nuncupantur. Verùm quo clarior esset dignotio, illi dorsalis, quemadmodum & ceruicalis, & spinalis, atq; lumbaris, cognomina addiderunt. Postea ferè omnes simpliciter dorsalem appellare consueuerunt, Sic in præsentī quoque proposito, phrenū nomine reiecto diaphragma (id est septum transversum) nominare magis placuit. Aristoteles

stoteles autem hanc animalis particulam, succincturam appellat, nescius ipsam magnæ ac perquam necessariæ actioni, in animalibus esse deputatam, quippe quæ spirationis sit instrumentum.

SCHOLIUM.

MULTI philosophorum vt refert Arist. 3. de partibus animalium. Putauere mentem, aut vim sentiendi residere in septo transuerso, hancq; esse causam qua ij qui inflammatione huius membrilaborant, delirant perpetuò. Cæterum neq; Plato, neque Arist. ita sensere, sed Plato vim sentiendi in cerebro, irascibilem in corde, concupiscibilem in hepate. Arist. Has omnes in corde collocauit. Proinde Plato de huius partis vsu ita differuit. In pectore igitur mortale genus animæ posuerunt, cūq; id naturaliter partim melius partim deterius esset, disposuerunt rursus thoracis capacitatem, decernentesque sedem tamque virorum alteram, alteram fæminarum. Cartilaginem enim quandam, nomine diaphragma, quòd etiam phrenas vocât, inter hæc mediam interiecerunt. His verbis constat Platonē non alium vsum septo trāsuerſo adscripsisse, quàm vt separaretur mortalis animæ pars ignobilior, quæ
est

est in hepate, à nobiliori, quæ est in corde. Arist. 3. de partibus animalium. cap. 10. de huius partis, vsu ita scripsit. Habent hoc omnia quæ sanguinem obtinent æque, vt cor & iecur, cui⁹ rei causa est, quòd ideò habetur, vt sedem cordis à vêtre dirimat, videlicet vt animæ sentientis origo inoffensa seruetur neque faciliè occupetur exaltatione cibi, & caloris aduentitij copia. Hæc verba aperte indicant Arist. non minus quàm Platonem septi vsum huic membro dedisse, atque ambo eodem modo sensisse de particulæ vsu, esse scilicet eam ad separandum ignobiliorem à nobiliori parte, præterquam quòd in reliquis obseruant suis placitis consequentia, loquunturque cõsentanea. Scilicet Plato, vt qui irascibilem in corde consistere, cõcupiscibilem in iecore putat, partem animæ nobiliorem ab ignobiliiori dirimi: Arist. vt qui omnes animæ partes principes in corde collocet, sentientem animæ partem ab officinis alimenti ventre inquam, & hepate separari, ne vapore & calore ledatur, affirmat. Verùm vterq; omisit maximum particulæ vsum: nimirum septum transuersum est instrumentum proprium respirationis. Estque musculus quidam, quo solo subleuato & depresso modo flabeli agitur respiratio naturalis. Quòd non intelligentes illi philosophi vocabânt nunc membranam, nunc cartilaginem. Est tamen neque membrana, neque cartilago, sed musculus quam formatione & positu ab alijs musculis, non nihil discrepet. Confert itaque ad respirationem, vt

est instrumentum motus, sed & alia ratione confert ad respirationem, vt est scriptum nam aliter non esset thorax conclusus vndique, quare non magis egi posset in illo respiratio, quàm reciproce aër trahi & pelli potest folliis dirruptis, aut si totus etiam venter in cauo respirationis contineretur, agerentur huc & illuc, & contorquerentur, mouerenturque violentius, quàm par, erat, intestina, vesica, & omnia viscera.

IGITUR non immeritò cùm afficitur Inspirationem lædit: vt suprâ cùm de spirandi difficultate ageremus, diximus: vbi proprias eius passiones vnâ cū his qui per consensum cum spina & nervis ab ea exortisin ipso fiunt tradidimus. At verò nunc eas passiones, qui superne consentient principio, ei adueniunt, perstringamus. Igitur antea quàm aliquis deliret, frequentem ac exiguum: infestante verò iam delirio, multa varietate inæqualem spiritum reddit: vt in libris de Spirandi difficultate iam dictum est. Fiunt etiam desipientiæ, & his qui ore ventriculi malè habent, & ardentibus febribus,

bribus , & pleuritide , & peripneumonia,
 quæ verò ob septũ prope phreniticos sunt.
 Quippe per cæterarum partium passio-
 nes, atque per febres ardentes delirium mi-
 tigari solet, quoties morbus declinare vide-
 tur. At phrenitidis propria, præcipuâq; no-
 ta est, ne in declinatione quidẽ febrium de-
 lirium qui escere. Neque enim per consen-
 sum duntaxat, sed huiusmodi morbo cere-
 brum afficitur, sed propria primariâque af-
 fectione laborat, atque proinde paulatim
 accidere, quiescere verò neque subito, ne-
 que, affatim solet, vt in his partibus quarum
 nuper mentionem fecimus: ac antea quàm
 inualescat, præcedunt ipsum accidentia nõ
 pauca. Eâque omnia phrenitica indiciavo-
 cantur, quæ ab iis quoque, qui me præcesse-
 runt scripta sunt. Videas enim aut vigilias,
 aut quosdam somnos manifestis imagini-
 bus conturbatos antecedere. Nam interdũ
 vigilias præcedere, siue etiam somnum ma-
 nifestis,

nifestis imaginibus turbatum, ut clament nonnulli, & exiliant videre est. Interdum verò irrationalis accidit obliuio, ut laborantes aliqui cum matellam petiuisent, meiere tamen neglexerint. Aut cum lotium emitterent, matellam ipsam, haud quaquam prodere meminerint. Interdum maiori cum tumultu, aut temeritate respondent, praesertim ubi aliquis antea fuerit mansuetus. Atque ii omnes exiguo vtuntur potu. Spiratio ipsis rara est & magna: pulsus minores, magisque nervosos habent. Nonnunquam occiput dolor infestat. Quum verò iam proximè ad phrenitidem accedunt oculi eius vehementer euadunt squalidi, aut ex altero ipsorum acris lachryma effunditur, ac deinde lippitudo innatat, & venae ipsorum sanguine plenae videntur, & sanguis stillat è naribus. Quo tempore nihil quod exactè ad prudentiam pertineat respondent, & floscos auellunt, & festucas carpunt, atque ari-

diore febris cui non ita magnæ in alterutrâ partem mutationes accedunt, torquentur, quemadmodum in aliis quibusdam febribus videre est, quæ per vigorem quidẽ grauiſſimè infeſtant, inclinationes verò habēt mitiores. At hæc lingua quoque ſalebroſa eſt, nonnulli interdum audiẽdo falli videntur, ac interdum mœſti iacent, vix quicquã reſpondentes, atque diſpoſitione dolorifica affecti, vel acrius premẽte aliquo, eã haudquãquã ſentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis euenire ſolet. Ab aliarũ verò partiũ nulla, perpetuũ delirium procedit dempto ſolo ſepto tranſuerſo cuius vitio excitatum delirium, parum à continuo diſtat, adeò vt veteres putauerint, hac parte inflammatione affecta, homines phreniticos euadere, atque ob eandem ſuſpicionem phrenas (id eſt mentem) eam appellauerunt, tanquam ſapienti parti conferat quippiam. Verũ delirium,

quòd

quòd huiusmodi vitio accidit à phrenitide distinguitur, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis à naribus stillis atque spirationis specie. Quippe phreniticorum spiratio magna est, & ex longis semper interuallis. Contrà vbi à septo delirium oritur, inæqualis vt modo exigua sit, atque frequens, modo magna, & angustiosa. Nam incipiēte septi transuersi inflammatione; prius quàm delirent laborantes, exiguum ac frequentem reddunt spiritum: contra iis qui ob patientem cerebrum delirant, magna prodit, rarâque spiratio. Atque vt summam dicam veluti eorum accidentium, quæ phrenitidem antecedere diximus, aut nullū apparet, aut si apparuerit aliquod, id per exiguum est, in his quibus septum transuersum inflammatione laborare incipit: ita rursus sursum reuelli hypochondrion septi transuersi, illico ab initio patientis, proprium indicium est, id quod patiente cere-

bro posterius accidit, non incipiente videlicet affectu, sed cùm factus iam fuerit. Atque calor quoque circa caput & faciem vehementior est iis, qui ob cerebri vitium delirant. Reliquæ septi transuersi passionēs, siue primaria sint, siue per consensum illi eueniāt, partim quidē ab hoc nostro proposito sunt alienæ (nēpe quæ manifestè apparent: vt sunt, tùm alia accidentia, tùm abscissus in ipso exorti) partim verò iam antea dicti sunt.

S C H O L I V M.

SEPTO transuerso inflammatione laborante hominem perpetuo delirio teneri Arist. nouit, non minus quàm medici. Tamē rationem vnusquisque reddit suis placitis consonam. Arist. loco citato ex. 3. de partibus animalium ita inquit: contra calorem se efferentem hoc veluti sobolem esse, argumentum, ex his quæ plarūmque accidunt ducitur, vbi enim attraxerint humorem calidum atque excrementitium, cōtinuo mentem sensūque planè perturbāt nos medici duplici de causa nō possum⁹ hanc rationem

rationem reddere, & quòd septum alia causa factū esse asserimus, & quòd facultatem animalem in corde esse non putamus. Cur ergo magis accedit ad perpetuū delirium quòd ex septi inflammatione nascitur, quàm quòd ex ventriculi, aut pulmonis? Certè propter analogiam aliquam, quæ in vtriūsq; membri (septi inquam & cerebri) natura consistit? De hac analogia, atq; de omnis sympathiæ ratione scriptum à me est libro quarto controuersiarum diffusè satis. Certè delirium ex septo transuerso, tam est perpetuum, vt perpetuitate, quantum ego intelligo, nullatenus à vera phrenitide differat, sed alijs notis, quas Gale. scribit. Quare fortasse dicens cuius vitio excitatum delirium parum à continuo distat, posset illud parum tacere. Omnia signa phrenitidis, quæ hoc loco refert Galenus, scripsit Hippocrates, varijs in locis prognostici, & primò prorrhiticon, vbi Galenus ipse singulorū causas optimè scripsit, vt non opus sit, me eas nunc repetere.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Vsum eius partis quæ gula appellatur, & morbos qui ei accidunt, & dignoscendi eos rationem, continet præsens caput, & historiam multorum qui abscessu in gula facto laborauerunt.



A M partem quæ inter fauces, & os ventriculi media est, Quàm veteres œsophagon nominabant, qui post Aristotelis seculum scripserunt, stomachon appellare consueuerunt, Quamuis Aristoteles prisco semper vocabulo hanc animalis particulam nominauerit. Eius duplex est vsus : vnus quòd veluti via est eorum quæ deuorantur: alter quòd circa vtramque viam actionem quandam efficere videtur, tùm deuorando ea quæ ab ore ad ventriculum deferuntur, tùm reiciendo ea quæ ab hoc ad os eleuantur. Quum enim geminæ sint ei partes, (quas dissectores tunicas appellant) altera ad cibi potulque deglutionem vtitur: altera ad eam quæ vomendo fit expulsionem. Proinde rationi cõsentaneum est, duo esse affectuum ipsius genera: vnum vt viæ eorum, quæ ingeruntur, alterum vt instrumenti eorum tùm

quæ

quæ euomuntur, tum quæ deuorantur.

Constat verò, duorum iam memoratorum vsuum, alterum quidem semper esse necessarium, alterum verò propter occasiones quasdam. Igitur eorum accidentium quæ ipsum, tanquam viam infestant, genus vnum est, quum ob tumorem aliquem præter naturam angustia fit ipsius meatus. Alterum cum proprias actiones perficere nequit.

SCHOLIUM.

ὀισόφραγξ, aut σώμαχξ. Est id membrum quod latinis dicitur gula, estq; via cibi, & potus ab ore summo ad os ventriculi, ea simul cum toto ventriculo constat duplici tunica. Interna habet villos oblongos: externa transfuersos. Primam dedit deus particulæ ad deuorandum, secundum ad vomendum. Nam quanquam vomitu multi nunquam, perpetuo nulli indigeant, tamen dedit Deus id membro vt auctuarium, vt cum res posceret haberet eam vim. Vt vel hinc constare possit, quod

alio loco confirmauimus, vomitum esse euacuatio-
nem hominibus naturalem. Sed modo quòd præ-
sentis instituti est dicamus. Trahere & pellere ha-
bet gula vt instrumentum transglutiendi, vt via
nihil aliud, quàm patere cibo & potui, qui deuo-
ratur. Vtraque ratione pati potest mala, & vt in-
strumentum quo agitur aliquid, & vt via.

P O R R Oⁱ iam antea, vbi de ang-
ina quæ ad vertebrarum in ceruice lu-
xationem sequitur, sermo habebatur,
diximus quòd adquisititia ei angustia acci-
dit, vbi à vertebra ipsa comprimatur, cu-
ius rei nunc quoque admonitum te esse
velim. Neque obliuioni tradas tumores
eorum musculorum qui gulam ipsam
inuoluunt, quomodocunque fiant: nam
de omnibus in libro de Tumoribus præ-
ter naturam dictum iam est. Cæterum
in his omnibus commune est, quod tan-
ta sæpenumero inter deuorandum, infe-
stat angustia, vt potus ad nares remittatur.

Quum

Quum verò inflammationē patiente gula familiari propriâq; angustia, non à vicinis partibus acquisita, torquetur: tùm grauiſſimos inter deglutiēdum dolor infestat, accedente quoq; perquam difficilè transitu præsertim si supinus, qui laborat iacēs transglutire quippiâ conetur: quocirca sic affecti habitū transformare atq; erigere sese student, ex accidēte ipso edocti, faciliore ita fieri deglutionē, adeò vt haud parū habitus, hic ad ciborū in decliues partes delationē, conferre videatur. vt potè quæ possit sæpenumero vel sola fieri, si prius ex ore vsque ad gulæ initiū facta fuerit expressio, at supino decubitu nullum speratur auxilium, quo facilius ad infernas partes ferantur alimenta, quippe quod tùm à sola gulæ actione deuorandi munus perfici potest.

O 5

Scholium.

MVSCVLI gulæ substracti sunt ijs quos communes gulæ & laryngi esse supra diximus, ego non spero posse positum decliuem gulæ tantum conferre deglutioni ciborum, vt possit aliquando fieri deglutio per sese pondere ipsorum ciborum, nullatenus agentibus fibris gulæ, nisi forte cibus in potu accipiatur, sitq; liquidus. Hic enim vbi semel in gulam inciderit defluet per sese, vsq; ad ventriculum, maximè si nullo est lentore præditus, verùm cibus solidus hærebit in gulæ medio, nisi per partes singulas, gulæ facultate naturalis trahatur. Nam ni ita fieret deglutio, cur imbecillitatis gulæ ea nota sit, vt longo vix tempore per gulam transeant ea quæ deuorata sunt? nimirum deglutio facultatis ventriculi & gulæ munus est. Neq; enim tam patens cuiuspiam est gula, vt, in tunica trahat, descensui ciborum expedita via sit. Sed quam deglutionem facultas facit, ad meliorem deglutionem non parum decliuis positus confert.

SCITIS autem membra omnia cùm operatur dolere, in quiete esse sine dolore. Ergo cū sentiendi facultate gula prædita, cò ipso quoque vti licebit quasi auctario partis, vnde passiones eius dignoscantur:

tur : id quod à laborante, inter respondendum depræhendere licet, nisi adeo fuerit fa-
xeus, ut quid ipsum lædat, narrare non pos-
sit. Quod si huiusmodi est qui possit animi
sensu interpretari, gulæ sensus maximum
præstabit corrolarium, ad passionum ip-
sius dignotionem. Etenim imbecillitatem
nonnunquam percipere se dicunt laboran-
tes, ut longo vix temporis spatio per gu-
lam transeant, ea quæ ingesta sunt: quæ ali-
quando ad primum impetum facile descen-
dunt, deinde rursus arcentur, ut videantur
impacta, demùm per residuū spatium fa-
cile labuntur. Horum primum actionis in-
firmitatem, alterum particulæ cuiuspiam
indicat. Verùm utriusque differentias, ex reli-
quis accidentibus intelligere licet. Nam in
imbecillitate quæ à sola intemperie citra tu-
morem præter naturam fit, ingestorum in-
transitu tarditas æqualis est, & sine dolore,
& in supino decubitu augetur : erecta verò
cervice

cervice mitigatur neque ullus accidit angustia sensus. Vbi verò cū tumore est imbecillitas, vnam quanquam particulā robustiorem cæteris efficit, atq; per eam tardior erit trāsitus. Quod si tumor inflammationis fuerit particeps, aut erisipelatis, accidit ei partit, & dolor, & sitis, & multi caloris sensus, & febris non admodum ardens, quæ etiam siti proportionem haudquaquam respondet. Si verò tumor aliquis ex non ita calidis fuerit: tūm citra febrim, & calorem, & sitim, deglutionis inæqualitas eueniet, retentis in parte quapiam alimentis, præsertim si maiusculum, atque solidum fuerit id quod deuoratur: acciditque dolor aliquis, sed exiguus. Ergo cū aliquādo huiusmodi accidentia longo temporis tractu nobis apparuissent, accedente nōnunquā ephemera febre, nonnunquam etiam horrore, coniecturam faceremus abscessum concoctu difficilem esse in gula: accidit procedente tempore

pore vt laborans ruptionis sensum perciperet, ac subinde puseuomeret, idq; nō solum eodem, sed postero quoque die atque itidem tertio, deinde succedebant ei deinceps omnia vlceratæ gulæ indicia. Quippe siue acria, siue acida, siue falsa, siue acerba deuoraret, aut vellicationem, aut constrictionem sentiebat: dolebátq; hac in parte, vel nihil deglutiendo, sed moderatius. Vehementiorem verò dolorem excitabant, ea quibus mordendi aut constringendi vis erat. Hic ergo longo temporis spatio vix seruatus est, fretus scilicet ætatis beneficio, etenim natu maiores ferè omnes perierunt. Sane quotquot dolorificum quēpiam in gula habent passionem omnes ex dorsi quoque dolore ipsum significantem declarant, cuius rei causa haud obscura est, iis qui gulam spinæ incumbentem viderunt. Quinetiam constat, quod ex gulæ vasis, haud secūs quā ex reliquis omnibus sanguis vomendo reii-

ci

ci potest, id si ob ruptū vas acciderit, dolor ibi percipitur ac locum, vbi aliquid ruptū est indicat. Haud secūs vbi vena fuerit erosa, siue diabrosim, siue anabrosim, siue aliter quomodolibet nominare volueris, locus patiens depræhendi potest, aperto autē vasis alicuius ore, nullus omnino dolor sentitur. Atque hac re à reliquis distinguitur, ac præterea quod neque ictus, neque casus hanc profusionem præcessit, id quod rupto vase videre est. Quanquam ob solam sanguinis plenitudinem, nulla adueniente extrinsecus causa, vasa interdum dirumpi possunt. At venæ erosione vlcus præcedere solet, fit autem vlcus, vel rupto vase vel vitiosorum humorum influëtia, id quod in cute quoque sæpenumero accidere vidimus.

Scholium.

CVM Ga. inquit, membra omnia cū operantur dolēt, cum quiescunt sunt sine dolore, intellige, cum mouentur loco, neque enim omnis operatio facit ad dolorem, intellige etiam dictum de membris quæ dolent, non enim omnia possunt dolere, vt quæ sunt sensus expertia cuiusmodi pulmo & hepar, reliqua huius capitis si attentè legantur, non indigent explanatione.

CAP. V.

Relectiuncula.

Docet Gal. in prima capitis parte, morbos qui ob vitium ventriculi euenire solent, vtq; vëtriculo consentiat cerebrum & cor, vsq; adeo vt omnia vitia quæ propriè illorum passione fieri solent per consensum, cum ore ventriculi fiant, docetq; notas quibus hæ passionēs per consensum factæ distinguantur ab his quæ primaria passione fiunt, quanquā notas quasdam ineffabiles adhiberi etiam debere dicit, reddit cum admiratione, huius consensus causas, & de melancholia hypochondriaca disputat, & syncope ob ventriculum, & de picca. In secunda capitis parte de passionibus fundi ventriculi disputat, & sententiam quorundam refutat putantium non posse sanguinem aut pus ex hepate aut liene vomitu reijci.

Veteres



VETERES os ventriculi cornominabant, ab accidentibus quæ inducere videtur hanc (vt aiunt) deducentes appellationem. Neque enim vt cardiacis syncopis: ita & stomachicis, nonnulli corripuntur: sed etiam conuulsionibus, sopore, morbo comitali, & melancholia, nec non accidentibus qualia per suffusiones infestant, vt iam antea, quàm de oculis loqueremur, dictum est. Atq; omnes hæ passiones, cõsistentibus ei cæteris partibus, in ipso fieri dicuntur. Nam ad propriam eius rationem pertinet & appetentiam prohibere, & natantes cibos corrumpere, quæ admodum id haudquaquam fieri solet, cùm cibi in ventriculi fundo firmantur, præcipuè si suapte natura non ita facilè corrumpantur. Igitur exactè animum aduertere oportet, vt discernantur passiones, quæ in ipso per consensum eneneniunt ab iis quæ huiusmodi particulis, quarum actionibus nocere

re cōsuevit os ventriculi passionem, (quod
 vt veteres omnes cor appellabant, ita no-
 stra tempestate stomachus vocatus) prima-
 rio accidere censentur. Sed hæc inter se di-
 scernere facilè poterit is, qui assidua exer-
 citatione circa notiones versatus, ea quæ
 præcesserunt, diligēter considerauerit. Sunt
 enim proprietates quædam inefabiles, sed
 quæ accidentibus quæ narrari possunt, suc-
 cedunt, quibus certiores stabiliorésq; eua-
 dunt patientium partium notæ. Sed has v-
 nus quisq; per se iuuenire poterit. Quæ ve-
 rò tauquam fundamenta vniuersæ digno-
 tionis existunt, atq; ex quibus studiosissimi
 quique inefabiles accidentium propieta-
 tes discunt, deinceps explicare aggredior.
 Igitur grammaticus quidam iuuenis quo-
 ties vel nimis vehementer doceret, aut co-
 gitaret, aut in ediam sustineret, aut irascere-
 tur, comitiali morbo corripiebatur. Perpē-
 di quidem in hoc oris ventriculi (vt potè

P

quod

*mti Imihai
 et Henry Van
 Culi*

quod facile sentiret) passionem esse, ac deinde per consensum & totum cerebrum & corpus vniuersum cōuulsione concuti. Cui probam concoctionē accuratē procurare. tertia vel quarta hora panem optimē præparatum exhibere iussi, atq; hunc quidē, solum, si non sitiret. Si verò citi cruciaretur, ex vino diluto, & quidem albo, atque modicē adstringente. Nam huiusmodi vinum vt vētriculum robustum efficit, ita haudquaquā tentat caput: id quod facere solent ea quæ vehementes vires obtinent. Cū igitur hac victus ratione vtens non vt antea afficeretur: exactā iam notitiam me habere arbitratu sum, eorū quæ prius sola coniectura cōsequebar. Itaq; quolibet anno bis, aut etiā ter medicamentū amarū ex aloe ei exhibui: totum enim ventrē purgat, virēsq; reparat: atq; ita vir ille viginti annis, quibus postea superstes permanfit, integra inculpatāq; valetudine vitā exegit. Quod si aliquando ob

ingruentia

iratio

ingruentia negotia diutius à cibo abstinere
 cogeretur, exigua quadà conuulsione vexa-
 batur. Iam alios quoq; vidimus conuulsio-
 ne comitiali ob oris stomachi vitium cor-
 reptos: cum aut non probè concoxissent,
 aut vini & quidem meracioris plurimùm
 potassent, aut vbi veneri immodicè operà
 dedissent. Quinetiam per febres quosdam
 conspeximus de repentè conuulsione præ-
 hendi, nullo (quod eam præfagiret) præce-
 dente indicio: qui bilioso superueniēte vo-
 mitu, protinùs ab omni noxa liberati fue-
 runt: atque hoc modo patientium nonnulli
 res quaidam fuscas vomendo reiecerant,
 alii humorem porri succo similem: Qui-
 dā etiā vitiosis grauati cibis, soporosi per-
 manserunt, donec ea quæ os ventriculi op-
 primebant, omnia euomuisent.

P

2

Scholium.

*Caj 2 multis
 epistolis ex
 hinculo, imed
 mala Cochis,
 hy meny, nix
 Venus, copia
 in illo*

SCHOLIUM.

VENTRICULI sunt tres partes, gula, os ventriculi, & fundum, differunt hæ particulae v-
 su, & formatione, & morbis, quos solent pati. Gula
 est ea pars quam proximo capite descripsimus, eius
 vsum esse diximus deglutionem, idq; eam præstare
 bifariam, vt viam, & vt instrumentum. Quà ea finitus
 est os ventriculi, pars ventriculi angusta, inflexa
 ad sinistram partem, crassa & neruosa, tam multis
 nervis prædicta, quia ad sensum famis & sitis est
 formata à natura, hicq; est illius vsum, fundum est
 profunda ventris pars à medio deorsum, quæ qua-
 si reducto ventriculo ad dextram partem est loca-
 ta infra septum transuersum, est hac parte ventri-
 culus multò magis carnosus, quia hæc pars maximè
 ciborum concoctioni dicata est. Cum ore ventricu-
 li tam multum consentit cor, vt hac de causa vete-
 res os ventriculi καρδια .i. cor, & illius dolorem
 καρδιαλγiam, id est cordis dolorem appellauerint,
 neque solum cor cum ore ventriculi consentit, sed
 & cerebrum. Quare ventriculi malum facere po-
 test syncopas, & conuulsiones, sopores, morbum co-
 mitialem, melancholiam, & suffusiones. Verùm hi
 morbi non pertinent ad propriam illius rationem.
 Nam illi morbi dicuntur pertinentes ad propriam
 membri alicuius rationem, qui proprias illius mē-
 bri

bri actiones lædunt, vt lapsus appetentiæ & ciborum innatantium corruptio, & appetitus rerum alienarum qui vtero gerentibus solet accidere, & fames canina, oris ventriculi morbi sunt, ad propriam illius naturam pertinentes, quia læditur per eos apprehensio & appetitus ciborum, quæ actiones sunt oris ventriculi. Proprietates ineffabiles appellat Gale. quædam quæ morbos sequi solent, quæ non tam dici possunt verbis, quam in ipsis operibus inueniri ac demonstrari, vt hinc intelligant tyrones quæ perperam ij faciant, qui quam primū duorum triumvæ Ga. libellorum enarrationes à præceptoribus audire praxim illorum minime obseruantes, relicta schola in patriam conuolant, & ad artis opera sese transferunt, & ignari multarum rerum, quas vsu oportuit edisci (nimirum sunt quædam ineffabilia) amicorum (hi enim se primum illis concedunt) salutem ludunt. Immodica venus solet facere epilepsiam per consensum cum ore ventriculi, quia debilitato calido innato impedit concoctionem ciborum & corruptionem facit.

*Serena regina
D. Vincente Br.*

ATQVI horum accidentium vix illum crederes à ventriculi ore procedere, quemadmodum nec sincopas quoque, nisi tam crebro ita euenire videntur

rentur. Quamquam enim non pauci ad ipsum ex cerebro netui perueniunt, non tamen tot esse videntur, ut per eos tantus sit principii cum ore ventriculi consensus, ut inde conuulsio inferri possit. Tantum abest ut quis credat, cor ipsum tam vehementer ori ventriculi consentire, ut acuta protinus sequatur syncopa. Porro multos non solum insomnia, & somni tumultuosi molestant, sed amentia quoque propter vitiosum humorem in ore ventriculi aceruatum. De flatuoso verò vocato & hypocondriaco morbo nemo non dixit, quomodo tristitiam, desperationem, mœstitiam inducat: atque, ut summatim dicam, ad melancholiæ accidentia nihil reliqui facit. Quippe laborantes huiusmodi morbo, post cruditates dictis accidentibus multo vehementius infestantur: ac quidem ex ipsis splenici quoque fiunt. Quocirca coniiciendum est ex

*et anxia ex
utrinque, hy
ndriaco*

hoc etiam viscere vitiosam saniem in ventriculum irruere. Ergo ea accidentia quæ vel cerebrum, vel oculos afficiunt, vitiosorum humorum vaporationem sequuntur. Ac syncopa quæ stomachi vitio solet euenire, ob dolorum ipsius proprietatem, exolutionem inducit: eius quoque intemperie ad cor fortasse perueniente. Quemadmodum vbi cor vehementer intemperatum est, vires agminatim cadere necesse est.

S C H O L I V M.

CA V S A qua ori ventriculi adeo consentiunt duo membra præcipua, cor & cerebrum, similis est ei quam de septo transuerso & cerebro diximus. nimirum obscura quædam analogia. Quanquã manifestas etiam causas habet, cum corde magnam viciniam, cum cerebro continuitatem, per neruulos quos accipit ex sexta coniugatione neruorum, qui ex cerebro oriuntur.

P 4

Atq;

ATQVE constat etiam, quod ^{κίττις}
 (id est picæ) vocatæ mulieribus acci-
 dunt, vbi hæc particula affecta est.

Quæ enim aut canum more, aut nihil o-
 mnino, aut malos cibos, cupiunt, iis ap-
 petentiæ instrumentum læsum esse cer-
 tum est: id verò os ventriculi esse demon-
 stratum iam est. Sic etiam nausea cordis
 dolores, singultus inter huiusmodi partis
 passiones numerari debent. Verum omniū
 harum passionum causas in libro de acci-
 dentium causis, iam diximus, vt nihil nunc
 opus sit, in earū explicatione tēporis iactu-
 ram facere. Etenim quæ per intemperan-
 tiam ei velutisimilari corpori morborū dif-
 ferētiæ adueniunt, iam ibi enarratæ sunt. In-
 strumētales verò morbi, qui ei accidere so-
 lent, adeò manifestas habēt notas, vt latere
 possint neminem qui communes significa-
 tiones: quæ & in his antea commenta-
 riis, & in aliis quibusdam præscriptæ sunt
 memoria

memoria tenuerit. Neque enim abscessus, neque inflammatio, neque erysipelas, neque ulcera huius loci in obscuro sunt, ut potè quorum communes sunt notæ cum iis, quæ supra de gulæ passionibus dictæ sunt. Atque illis eo manifestiores, quo facilius huic parti sensus est, hac claram quoque promptamque notionem habet. Similiter ubi ex hac parte sanguis reicitur, inditiorum proprietas communis est, cum illis, quæ de gula iam diximus: verum cognitio longe manifestior euadit.

S C H O L I V M.

CITTA siue pica est is affectus, per quem appetunt laborantes absurda quædam, & aliena, ut carbones, cineres, & similia. Huius causam docet Gale. libr. 1. de causis symptomatum esse succos prauos quibus os ventriculi est imbutum. Sed quæ ratione illi succi, cum præter naturam in ventriculo sint ad similitudinem appetentiam alliciunt, dixi ego capite septimo, libri quinti, controuersiarum.

AT Q V E par esse videtur totum
 ventriculi spatium simili dispositio-
 ne affici, quales sunt ille quas in ipsius
 ore fieri diximus, atque similia quoque ei
 aduenire accidentia. Quòd verò longè ma-
 iorem inferunt violentiam ea, quæ in ipsius
 ore cōtingunt, idcirco medici ea quæ in par-
 te ventriculi inferiore eueniunt perinde ac si
 omnino non fierent, & despiciere & con-
 temnere solent. At quia coctionis opus in
 partibus ab ore inferioribus fieri nemo ne-
 gat, necesse est, hanc ipsam partē, cū in ma-
 lè disposita fuerit, cruditatum esse causam.
 Cum videlicet, vel ob inordinatam alimē-
 torum ingestionem, aut multitudine, aut
 qualitate homo concoquere nequit, mor-
 bi verò, cæteris partibus omnibus com-
 munes, siue instrumentales sint, siue per so-
 lam intemperiem infestent quorum sedes
 affectæ manifestæ sunt, ad hanc præsentē
 commentationē propriè non pertinent.

*de Cruditati
 Ventriculi*

Quippe

Quippe eas dūtaxat partes, quæ sensus indicium effugiunt, considerare propositum est. Sed sanguine qui ex ipso vomendo reicitur, non conuenit inter medicos. Etenim sunt qui putent, nequaquā fieri posse, ut sanguis, vel ab hepate, vel à liene effluens, per ipsum euacuetur similiter de pure quoque ab ipsi serumpente existimāt. Verū enim verò per artis exercitationem vtramque opinionem examinanti mihi, via est per ipsum fieri euacuatio ex ipsis visceribus. Cæterum differre volumus huius rei doctrinam in eum locum, vbi de ipsis sermonem faciemus. Quippe deinceps, & iocinoris, & lienis pāsiones percurrere propositum est.

SCHOLIUM.

CRVDITATEM fieri posse inquit etiam sine malo ventriculi, esu nimio, aut inordinato. Ego addiderim, aut intempestiuo. Qui sit ordo assumendi alimenta, atque occasio opportuna. Si scire hoc loco cupis, lege caput 4. libri 6. cōtrouerfiarū.
Cap.

CAP. VI.

Releſiuncula.

diſtinguit hepaticum ap. leu. it. co

Docet hepar pati poſſe intemperiei omne genus, & quemcumque tumorem præternaturam, & obſtructiones, verùm non poſſe illius tumores tactu deprehendi, ob octo muſculos abdominis, qui ſunt ſuper hepate, niſi tumor ſit magnus, & homo gracilis, inflammationum tamen habere alias notas non obſcuras, alias cum in gibba parte alias, cùm in caua conſiſtit. Harum alias dicit omnibus hominibus, qui ita laborent communes, alias quibuſdam proprias, hydropiſ etiam tres ſpecies aſcitem, timpanitẽ, & anafarcam, non antea fieri, quàm hepar affectum ſit, quàmquam uon ſemper, ex primario illius affectu procedant.



HIC parti, quemadmodum, & cæteris omnibus duplex morborum genus accidit: vnum à ſola intemperie, citra tumorem præternaturam. Alterum vbi vna, cum intemperie tumor quoque infeſtat, vt inflammatio, eryſipelas, ſcirrhus, id eſt tumor durus: obſtructiones, à craſſis, & viſcoſis humoribus, ſpirituofæ, ſeu flatulente diſtentiones, idque in extremis

extremis vasorum partibus quæ ex venæ ipsius portis exoriuntur. Has quidē obstructions sequitur gravitatis sensus, quæ dextro hypochôdrio incumbat. Quod si halituosus quoque spiritus, cui non pateat exitus, ibi concludatur: non solum gravitas, sed tensionis etiam sensus sequetur. Inflammationes verò quæ in hoc viscere citra ipsius imbecillitatem nascuntur, si quidem in gibba parte consistant, præcipuè si grandes fuerint, perfacilè vel solo tactu dignosci possunt. At si marum partium inflammationes per alia potius accidentia, quàm per tactū investigare oportet. Incipiam igitur ab his quæ in parte gibba oriuntur: si priùs vos admonuero eorum quos in corporum dissectione conspexistis musculorum, qui sub cute tenduntur. Sunt verò octo numero quatuor contenti coniugationibus. Quarum prima ex musculis constat rectis, per totum carneis à locis quæ circa sternon sunt, ad pubis

*signy obstru-
tionis gravi*

*sunt etig flat
his.*

pubis ossa, ita enim vocant dissectores descendentibus. At reliquarum trium coniugationum muscoli, usque ad rectorum contactum, carnea quidem parte constant: ubi verò illos primo attigerunt, in nervosas membranas degenerare videntur. Horum itaque musculorum una coniugatio, quæ quidem reliquis omnibus exterior est, à thorace obliqua deducitur, in anteriores partes & deorsum descendens: Altera huic cōtraria ab infernis exorta partibus, obliqua ad anteriores & superiores ascendit. Huic tertia musculorum coniugatio subiicitur, qui trāsversum habent positum: atque peritonæo, id est membranæ quæ intestina continet, inniuntur. Rectorum autem musculorum tumores præter naturam oblongi atque per medium ipsius ventris extēsi videntur: umbilicum, veluti ipsi quoque muscoli, comprehendentes. Quapropter haud obscura est eorū dignotio, ut pote quos & positus, &

& figura declarat. Accedente ad hæc, quòd ipsi à nullo exteriori musculo cõteguntur. Hæc autem obliquis quoque musculis, qui à thorace descendunt, sunt communia. At multo difficilior est notitia musculorum qui iis subiecti sunt difficillima verò transversorum. Constat autem iecur intra hos sub peritonæo esse positum: quòd cum tribus contegatur musculis, fieri non potest, vt tactus aliquam ipsius notitiam præstet, nisi vel magna in ipso oriatur inflammatio, vel incumbentes ei musculi extenuentur.

Sed iecur affici declarant, in dextra hypochondriorum parte grauitas, dolor tota hypochondria retrahens, atque ipsius vsque ad iugulum extensio (nam & hoc nonnunquam euenire solet) exigua tussis, linguæ color in primis quidem ruber, deinde verò niger, ingens fastidium, sitis inexhausta, vomitus tùm synceræ bilis, tùm eius quæ ouorū vitellis assimilatur, quæ postea æruginis aliquando

*Signa inflamm
nis iictæ par
grauias, dolo
hypochondria
hens co
Vide p. 65.*

aliquando colorem referre conspicitur. Alius quoque adstringitur, nisi vna cum visceris huius imbecillitate inflammationem excitari contingat. Erysipelatis autem accidentia iis ferè similia sunt, & insuper febris quoque cum vehementissima siti laborantes cruciat. Eas enim febres quas ardētes antiqui vocabant, magna ex parte aduenire videmus, iecoris, aut ventriculi flammeis dispositionibus, atque in pulmonis inflammatione erysipelatis particeps, ardentes febres excitantur. Quemadmodum vbi in vniuerso quoque corpore biliosi humores ad immoderatum feruorem perueniunt. Verum hæ quæ aut iecoris, aut ventriculi occasione eueniunt, omnium sunt vehementissimæ. Quibus particulis ita laborantibus febres magna ex parte in marcorem transmutantur. Sed de hac alibi seorsum scriptum est. Quæ in finis iecinoris partibus eueniunt inflammationes, vt magis quàm illæ quæ in

in eius gibbo fiunt, fastidium nauseam, vomitum biliosum, sitim ingentem inducunt: sic è contrario hæ maiori quàm illæ, inter spirandum dolore (vt dictum est) laborantem afficiunt, magisque tussiles excitant, atque dolorem vsque ad dextræ partis iugulum, adeò vt detrahi videatur, extendunt.

Porro vtrique parti cum dolor adest, notæ costæ nonnunquam consentiunt.

Itaque eis commune est, non omnibus: propterea quòd iecur per membranas non omnibus coniungitur: id quòd non solum in finis sed in aliis quoque animalibus videre est. Etenim aliis quidem cõiungitur aliis minimè. Igitur quemadmodum interdum in gibbis dūtaxat, ita & in finis huius visceris partibus inflammatio oritur: quamuis in neutra partium exquisitè distincta possit consistere. Nam omnium eius partium carnes inter sese continuantur. Cæterum quibus natura, abdomē gracile est, quādo mor

Q bo

bo gracilius efficitur, in his facile est videre ingentem iocinoris inflammationē. Quæ propriā hāc à musculis incumbētibus fortitur differentiam. Quòd moles sub manibus ad coaceruatā circumscriptionē definit. At musculus quilibet, cū totus sibi continuus sit, inflammationis ipsius moles sensim diminui cōsuevit. Quippe soli iocinori propriū est vt tumoris cumulū compræhēsim habeat circūscriptum. Vnde manifestum est, quòd durus in ipso tumor (græci scirrhus vocant) multo euidentius dignosci potest eo quòd durior, scirrhi sit ipsius, quàm inflammationis moles, quodque in huiusmodi dispositione extenuata sint corpora, quæ ei incumbunt, At verò tractu temporis quauis magis increſcat scirrhi tumor, non tamen æque facile fuerit, per tactum ipsum cognoscere, intercipiente scilicet iudicium aqua inter cutem, quæ illico scirrhum sequi consuevit.

Scholium,

SCHOLIUM.

MERITO dubitet aliquis, quæ ratione possit esse inflammatio, in parte quapiam, siue illius imbecillitate. Cum fluxionis causa debilitas partis recipientis esse soleat. Itaque putet non posse inflammata particulam, non esse debilem, ac proinde malè Galenū dixisse. Inflammationes verò quæ in hoc viscere, citra illius imbecillitatē consistunt. Sed intelligendum est, hoc loco de ea imbecillitate sermonem esse, per quam naturalis hepatis facultas cōcoquendi, aut retinendi, aut vtriūsq; in essentia est læsa, quæ læsio non fit nisi temperamentum ipsum membri, sit radicitus euersum, habeâtque membrum intemperiem factam, quòd non necesse est, accidere inflammato membro. Non enim fluxionis quæ in membrum aliquod concitatur causa est perpetuo membri imbellicitas, sed nonnunquam redūdantia, aut ardor trahens. Quòd si in his quoq; quādam imbellitatis speciem esse tibi persuadeas, at non dices necessario esse tantam, vt membrum simpliciter imbecille dici debeat. Quid enim prohibet hepar quòd confluentem succum, non repulerit, posse sanguinem mediocriter retinere, & coquere? Nam si inflammata particulam mediocriter sanguinem coquere negas, quòd vrat, & biliosiore faciat, id non est imbecillitas facultatis essentia. Nam ita infra mediocritatem cōsisteret, sed deprauatio

Q 2 actionis

actionis ob deprauatum instrumentum, itaque potest esse inflammatio hepatis citra illius imbecillitatem. Sed qua ratione dixit inflammationes hepatis quæ citra illius imbecillitatem nascuntur, si in gibba parte consistunt, præcipuè si grandes fuerint, perfacile vel solo tactu dignosci possunt. An inflammationes hepatis quæ cum imbecillitate consistunt in gibba parte non possunt tactu dignosci, & si sint grandes? Nam id videtur inuere: Non certe. Sed quia post hanc disputationem de inflammatione sine debilitate, in sequenti capite disputaturus est de inflammatione, cum debilitate, quasi proponens qua de re nunc agat, dixit, inflammationes quæ in hoc viscere citra illius imbecillitatem nascuntur. Historia musculorum abdominis perspicuè satis narratur à Gal. nulla opus est enarratione. Sed oportet hoc loco considerare, quàm leuiter multi solo tactu tentent obstructions, & omne tumoris genus in hepate & liene dijudicare, cum sit res minime leuis, sed quæ fallere possit per tumores octo musculorum vt Gale. inquit, & vt ego arbitror, per tumores omenti. Quos ego hac ratione dijudico. Si quæ pars in toto ventre durior, aut latior, aut vtrunque videtur quàm pro natura, primum omnium considero, an id in vna parte fixum sit, an possit manibus de parte in partem trahi. Si potest, aut est in parte supra vmbilicum, aut infra. Si supra vmbilicum est, tumorem in omento esse coniicio. Nam solum est id membrum eo loco mobile, &

veluti

veluti pendens, alijs non affixum, si infra, duorum alterum esse potest, aut tumor in omento (attingit enim omentum in hominibus infimas partes) aut vola matricis. Reliquas ergo notas volæ matricis confidero. Si tumor in vna parte fixus est, animaduerto tumoris figuram, an longitudinem aliquam fibrarum in musculis trāsuersis, longis, an obliquis, obseruet, an nullam. Si quam obseruat in musculo esse constat, sin minus, situs dexter, aut sinister altus, aut humilis, mihi declarat, an sit in hepate, an liene, an vtero, an vesica. Inflammationibus magnis vētricoli, & hepatis plerūque succedit tabes, quia vicina sunt cordi, atque quia remittunt alimenta ad reliqua membra sicca, & vsta: non aliter ac inflammato pulmone aër calefactus remittitur ad cor.

Q V I P P E nisi hepar afficiatur, haud quaquam fieri potest huiusmodi passio, non tamen semper, ob primariam eius affectionem excitatur. Quamuis hoc fit, quàm frequentissimum. Etenim quia ipsum eius facultatis, quæ sanguinem gignit instrumentum est, consequens est, vt vitiato hoc viscere, actio quoque

Q 3

quoque eius vitietur. Accidit autem (vt dixi) cum alias, aliam partem frigida admodum intemperies afficit, vt hepar quoque refrigeretur. Igitur si vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum vniuersorum, maximè ieiuni, mesentericæ venæ omnes habituali intemperie afficiantur, facilè etiam vna refrigerare possunt, omnes simarum iecoris partium venas: quo fit vt ad hepatis quoque corpus intemperies ipsa perueniet. Si verò vel pulmonis, vel septi transversi, vel renum occasione id accadat, in primis venæ, quæ in visceris huius partibus gibbis consistunt, per consensum afficiuntur: deinde tractu temporis totum hepar quoque eadem dispositione infestatur. Ergo quæ hucusque diximus sic se habere nemo inficiabitur, nisi forte quis, aut suapte natura contentiosus, aut omnino fuerit indoctus. De obstructione verò, non æque, certè habentur coniecturæ. Etenim

quòd

quòd finarum partium venæ, ab ea quæ in porta est oritur, intenuissimas extremitates finiantur, haud obscure apparet; Atque quòd ad eundem locum, aliæ quoque venarum extremitates à concaua vena, in gibbas visceris partes distributarum peruenient, similiter constat, licet quomodo per sua ora ipsæ inter se coniungantur, videre nequaquam possimus. Neque enim dubitat aliquis, sed omnes ferè medici, ex vno ore enuntiant, quòd cibus vniuerso corpori distributus, ex omnibus finarum partium venis exiens, ad gibbas partes prædictas, extremitates transfumitur. Quòd si fateamur sanguinis transitu, ob tumoris venarum, quæ inflammatione, & scirrho occupantur, molem constringi, ratione consentaneum esse videtur (vt nonnullis placuit) vt pars quæ in sanguine magistenuis, atque aquosa est, transfumatur, atq; vehatur per vniuersum corpus:

pus: sincerus autem sanguis, qui propter sui crassitudinem in caua vilceris parte permanet, ei morborum qui ex plenitudine fieri solent, causâ esse censeatur. Percussantibus verò nobis, huius sectæ placita, videntur partim, cùm his quæ iam supra dicta sunt, consentire: partim verò nonnihil ab iis, quæ apparere solent, differre.

Quòd enim aquosa sanguinis pars transumpta in venam concavam, usque quaque per corpus dispergatur, consequi videtur ad ea, quæ iam in confesso esse diximus. Quemadmodum crassiorem sanguinem in vilceris venis præ angustia earum retentum ad intestinum ieunum, & tenue, & color, & cæcum, atque rectum defferri, & (vt quispiam dixerim) in ventrem fortassis, nemo tamen id accidisse vidit, neque in hepatis præter naturam tumoribus, neque etiâ obturationibus. Verùm in omnibus corporis partibus, tum super-

pernis ; tùm inferioribus pituitosus sanguis contineri conspicitur in his morbis quos Græci & anasarcas & leucophlegmatias nominare consueuerunt. Per aluum autem nihil cruentum , neque in iis , neque in ascite, neque in tympania secerni solet. Sed spatium quod inter peritonæum & partes ei subiacentes est , aquoso humore impletur. Proinde rationi inagis consentaneū est, vt ob visceris refrigerationem cibus qui reliquis partibus distribuitur in sanguinem transmutari non possit, quin etiam refrigerantur cum ipso vniuersi corporis venæ, idquē maximè, vbi nullo plerunque tumore in iecinore apparente, laborans aqua inter cutem molestari videtur : vitio existente vel in liene , vel ieiuno, aut tenui intestino, aut mesenterio, vel pulmone, vel renibus, aut etiā vbi plurimus per hæmorrhoidas sanguis excernitur, aut ob muliebri profluuium, aut cum retinentur menstrua, aut

Q

s

ob

ob aliam ingentem in vteri dispositionem. Nam per omnes huiusmodi passiones aqua inter cutem hominem vexare contingit, vel nullo existente in hepate præter naturam tumore. Id verò præcipuè intelligitur ab is, qui didicerunt quomodo ex intēpestiua aquæ frigida potatione iecur affatim refrigeratum, statim aquam inter cutem inducit, antequam scilicet in durum tumorem attollatur. Verum si affecti vehementi ciborum desiderio tenentur, nec mirum, quippe ob refrigeratum os ventriculi, huiusmodi cupiditates inualescere, iam antea didicimus. Sed de aqua inter cutem, quantum ad præsens attinet propositum, ea dixisse satis est.

SCHOLIUM.

VIDETVR vitio alterius partis ab hepate eò nondum consentiente posse fieri hydrops, contra ac Gal. docet. Nam ea hydrops sicca de qua Hippo.

po.loquitur aphor. 11. quarta particulæ, quibus tor-
mina & circa vmbilicum dolores & lumborum do-
lor, qui neque à medicamento, neque aliter solui-
tur in aquam inter cutem siccam firmatur, vide-
tur fieri ex intestinis & partibus circa lumbos, etiã
nondum refrigerato hepate. Siquidem etsi hepar
refrigeratum non sit. potest illa pars ex alimentis
& excrementis quæ in sese secundum naturam cõ-
tinet flatus eleuare. Præterea, singe hepar habere
secundum naturam, ac proinde consuetam feri co-
piam generare, tamen renes esse adeò imbecilles vt
nihil feri ad sese alliciãt, fiet vt serosus sanguis di-
stribuatur, ac proinde multum feri in regionẽ quæ
est inter peritonæum & intestina resudet, fietq; ita
hydrops, etsi hepar sanum omnino sit. Certè hæc
argumenta non sũnt leuia aduersus Gale. senten-
tiam, tamen possis pro illo respondere, non posse
satis multam flatus copiam ex intestinis & partibus
circa lumbos prodire, ad distendendũ ventrem nisi
hepar etiã illius generationẽ augeat: neq; fieri pos-
se vt tantum feri retineatur in venis & arterijs vi-
tio renum, vt in regionem intestinorum multa co-
pia regurgitet, quin suffocato calore hepar refri-
geretur, vt refrigerari solet retentis menstruis.

Cap.

Relectiuncula.

Docet hoc capite quibus partibus patiētibz fiat morbus regius, & quomodo cognoscatur pars male affecta, docet etiam earum affectionum quæ hepaticæ vocantur signa & essentias, primum cum per se sunt, deinde cum sunt cum inflammatione hepatis. Narrat deinde longam historiam de hepatis inflammatione quā coram Glaucone cognouit. Deinde repetit quædam eorumquæ ad sermonē facultatum naturalium pertinent, & species & causas dicit excretionum cruentarum. Concludit deinde caput, & librum ad morbum regium sermone conuerso.

PORRO' vtrum semper in morbo regio locus patiēs sit hepar, an alia præterea dispositio hunc affectum efficere possit, deinceps percurrendo scrutemur: siquidem vidimus nonnunquā iecinore nequaquam affecto per morbi iudicationem, effundi ad cutem bilem pallidā quomodo humorum in aliquam partem decubitus quoque aliqui interdum euenire consueuerunt. Videmus etiam aliquādo ci-

rus acci-
ahente ieu

tra morbi iudicationem sanguinem ab ex-

*2a. Causa Inven-
tury. in bily a
hama. Causa*

tranea quadam corruptione in bilem verti. Qualis ferarum morsu fieri solet, etenim imperialium seruatorum quidam qui viperarum venationi deputatus erat cum à vipera morsus esset, aliquanto tempore medica-

menta quibus vti consueverat potabat: cūque vniuersi corporis color mutareretur, adeo vt porri colorem referret, accedens singula nobis enarrauit, cui epota theriaca,

Cura. huius

quàm celerrimè color secundum naturam restitutus est. Solent autem medici inuestigare, an assumpti veneni propria extent signa, cò quòd sæpenumero videant, citra le-

f

talis veneni potionē humores similiter vt epoto veneno corrumpi verum nō mirum est, si sic aliquando mutantur humores, vt vniuersum corpus auriginosum euadat.

Quamquam fieri etiam potest, vt iccinoris secundum naturam temperies mutata, humores huiusmodi vitio afficiantur, & qui

dem

dem citra obstructionem, aut inflammationem, aut scirrhum. Quinetiam manifestè quandoq; videmus, vniuersum corpus herbis candenti pallore infectis simili: interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum referre colorem: interdum etiam alias quasdam inefabiles colorum proprietates, quæ iecinore suo munere non recte fungente, sine tumoribus præter naturam accidere solent. Sic ob splenis quoque vitio huiusmodi colores eueniunt, sed multo nigriores quàm ab hepate. Quos vt clara interpretatione enarrare difficillimum, ita cognoscere facilissimum. Iis præsertim qui illos sæpenumero conspexerint, etenim Stesianus cùm medicorum iudicium subiisset, nescio quo pacto eorum non pauci abscessum in ipsius hepate cōsistere crediderint. Sed postea quā lōgo temporis spatio nihil se in melius proficere sentiret, me quoq; vocauit. Igitur simul atque domum vbi iacebat fuisset ingressus,

gressus, aspiciens eum hoc inquam scias velim nullum tibi esse in viscere vitium : sed quid aliud te molestat nudatis præcordiis declarare conabor, inueni ergo in profundis musculis abscessum contracto iam pure in medio spatio eorū musculorū, qui per transversum incedunt, atque illorum qui obliquè ab infernis sursum tendunt, qui (vt nouistis) medii sunt inter eos qui transversim peritonæo incumbunt, & eos qui sub externa cute obliqui deorsum feruntur. Sic etiā alios complures scitis me notasse, per colorem declarando modo iecur, modo splenē esse affectum : nulla audita præteritorū accidentium narratione, neq; etiam per tactū inuestigato viscerū affectu. Proinde sæpe numero audiuitis me malè imprecantem iis, qui medicæ quidem professionis (quod ad spectatiuā pertinet) principes se esse iactabant, nullius verò ægri volebāt aggredi curationem. De quorum numero plurimi fuerunt

fuerunt tùm empirici, tùm methodici: quibus si quis dixerit, fieri posse, vt solo perspecto colore, affecta sedes interdum cognoscatur, illi, aperto ore atq; rabidi canis exemplo, exerta lingua impudenter ei resistunt. Verùm præsens sermo haudquaquam ad illos dirigitur. Itaq; ad aliud accidentiũ genus quod sola iecinoris imbecillitate, quæ per se ac sine inflammatione euenire solet, continetur, nunc transeamus. Quemadmodum & de ipsius inflammatione quæ citra propriæ facultatis suæ imbecillitatem accidit, seorsum iam diximus.

S C H O L I V M.

AN sint notæ propriæ accepti veneni an non, sequenti libro declarabimus, modo illud oportet intelligas Gal. disputare de affectionibus hepaticis. Hepaticæ vocantur omnes hepatis imbecillitates, siue cum inflammatione, siue sine ea consistant. Non tamen pertinet ad hoc genus inflammatio hepatis, sine illius imbecillitate.

Cæterum

CAETERVM postquam sanguinis generationē hepatis munus esse intelligimus, si causa aliqua fuerit, quæ hunc generare possit, eam hepatis propriā facultatē esse dicemus. Propriā autem diximus, propter eas quæ omnibus corporis nostri partibus communes esse dignoscuntur: quas in libro de naturalibus facultatibus, iam percurrimus attracticē dico & retentricem & expultricē. Neque quarta generatim quidem alteratrix, speciatim verò sanguifica vocatur.

S C H O L I V M.

EX his, verbis intelligunt plerique in venis & arterijs esse vim sanguinem generandi, influentem ab hepate, proprias verò facultates, attracticē inquam retentricem & expultricem & alterantem, quæ cuiusque membri nutritioni subseruiunt insitas esse singulis partibus, non venientes ex hepate: ego verò qui nullam facultatem naturalem influentē esse libro 2. controuersiarum confirmaui, aliter interpretor hæc verba. Nempe sanguinem venarum

R

(consulto

Nota

(consulto addidi venarum, quia sanguis arteriarum tenuior multo, in corde generatur) in hepate generari per se, & à facultate propria, gratia similitudinis modi substantiæ, tamen in venis non per se, sed feruore quodam & calore mouente vt multum fit vinum in dolijs, in quibus non est facultas vt ita dixerim, viuifica, vt in libr. secundo diximus. Ergo dixit Ga. Cùm sanguinis generationem hepatis munus esse intelligamus, quia in nullo alio membro est facultas talem sanguinem generandi, addidit si causa aliqua fuerit, quæ hunc generare posset, id est vbi est facultas quæ hunc generet, hepatis propriam facultatem dicimus, quia etsi in venis generetur tamen id non fit à facultate, sed vt explicauimus.

PORRO omnium facultatum essentiam in peculiaribus partiũ téperantiis consistere didicistis. Proinde cū iecur ad aliquam octo intemperantiarum labitur, accedit viribus ipsius noxa quæ illi intemperantiæ peculiariter debetur. Sed de his generalem scripsimus sermonem, in tertio libr. de accidentium causis: propria autem cuiusque secundum speciem partium communi ad portionem respondet. Igitur calida

calidæ iecoris intemperantiæ cùm contentos in ipso humores, tùm eos qui per mesenterii venas deferuntur, & affant, & adurunt: frigidæ autem, contentos iam in ipso humores, crassos atque ad fluxum & motû contumaces reddunt: id verò quod ad ipsum fertur, & pituitosum, & crudum, & semicoctum efficiunt. Sic de reliquis quoque duabus dicendum est, arida quidem intemperantia, sicciores, crassioresque: humida verò: magis tenues aquosioresque reddit humores. Igitur cum alui sedimina, aquæ, in qua nuper mactata caro abluta est, similia esse videritis efficacissimum inde affecti iecinoris signum elicere nequaquam dubitetis. Ac nominantur hepatica, ea præcipuè quæ ob imbecillitatem ipsius deiciuntur: quippe ad iecoris essentiam pertinent huiusmodi passionibus. Atqui didicistis cuiusque primorum corporû essentiam ex quatuor quali-

R 2 tatum

tatum constare temperamento. Sicetiam cum fæci sanguinis similia per aluum excrementa deiiciuntur, iecur affectum esse coniiciendum est. Vt enim tenuè & saniosum excrementum infirmi iecinoris sanguinem creare non potentis, ita id quod fæci similatur, superaffantis sanguinè hepatis indicium est. Neque enim à memoria vestra decedit, cū sæpe videritis quosdam, imprimis quidem saniem & cruenta quædã, dein tractu temporis crassum, ac melancholicum sanguinem, postremò atram quoque bilem, & quidem sinceram deiicere. Accidit autem interdum ut hic affectus ob frigidam intēperiem citra febrim incipiat, quando tenuis sanies sanguinis excernitur, deinde tractu tēporis, corrupto in viscere sanguine, febris supuenire solet, quæ tamen ab imperitis vsque adeò negligitur, ut laborantē interdū nequaquã febricitare putent, quippe hãc passionē ob
inedi

inediā accidisse existimant. Siquidē quod nulla sit ipsis cibi cupiditas potius, quā ob medicorum institutū laborantes à cibo abstirene inuenerunt. Itaq; cū interim nihil excernatur, videatūque laborans omnino liber à febre, balneis eum exponūt, ac debitam victus rationem prescribere negligunt. Quo circa rursus corruptos cibos, aluus deiecit, quos deinde hepaticorum excrementorum nonnihil sequitur.

Ad nonnulli qui ob frigidam intemperiem laborare inceperunt, non solum non perdunt cibi cupiditatem, verū etiam interdū multò magis quā antea se esurire a-
iunt. Calidas verò intēperies nunquā committatur ciborū appetentia, sed cibi fastidiū sitis vehemens, febris insignis, vitiosorū humorū vomitus. Hæc sunt propria hepaticorū accidentia. Sic N. nominari iā dixi eos, quibus visceris ipsius vires fuerint imbecilles. Qua in re vulgus medicorū errās, hanc

*Syne p^{re} intemperies
Cath.*

passionē putat esse dysenteria. Inflammationē autē alia (vt dictū est) sequuntur accidentia. Cum itaq; ambæ interdū passionēs cōueniant, vtriusq; accidentia simul apparere solent, quæ in prōptu medicū habere oportet. Sic enim nō solū laudabūt nos, sed admirabuntur etiā ii, qui opera nostra indiguerint, præsertim si accidētia quoque, quæ aliis morbis cōmunia sunt, insuper prospexerimus. veluti quod dolor ad nothas costas peruenit, quod iugulus detrahi videtur, quod spiratio parua redditur & frequens. Equidē cū primū Romā venissem magnificē admiratus est, me Glaucō philosophus ob huiusmodi quandā dignotionem. Etenim per viā mihi occurrens, oportunē (inquit) aduenisti, iūgēnsq; dextrā dextræ, proximi sumus (inquit) laborāti, quē nuper vidi: itaq; oro, vt vnā mecū ad ipsū venias. Est autē ficulus medicus, quē non ita pridē mecū ambulantē vidisti. Ego verò, quid in-

quæ

quā molestat ipsum? tū ille & copiosè admodū & apertè id declarare aggressus est. Neque enim adeò erat vafer, vt aliquid me cælare posset. Quoniā heri (inquit) & Gorgias, & Apelas, mihi nunciauerunt, motiones præfagiāque edidisse te, quæ ad diuinationem potius quā ad medicinam pertinere videbantur: cupio equidem periculum facere, non adeò vt tuam experiar doctrinā, quā vt sciam, num tota sit in arte medica tūm, cognoscendi, tūm præfagiendi facultas. Interim cū hæc diceret, venimus ad laborantis ostiū, vt neque verbo eius prouocationi respondere, neque etiam ea quæ sæpenumero me dicere audiuiſtis, effari possem: quod scilicet multa interdū nobis feliciter facileque apparēt, interdū verò omnia sunt ambigua: atque idcirco & alterā & tertiā quoque considerationē expectamus. Itaque in primo statim aditu obuiā nobis venit quidā perluim

à cubiculo efferens, continentē tenuē cruoris saniem carniū nuper mactatarū ablutioni haud abfimilē euidentissimū affecti iecinoris indicatiū, qua vix dū inspecta, vnā cum Glaucone ad medicū ingressus sūm. Apprehendi itaq; manū in carpo, id est brachiali, quo intelligerē vtrū inflāmatio, an sola imbecillitas esset in viscere. Quia verò (vt diximus) medicus erat: nup (inquit) à deiectione decubui, itaq; perpende arterias ob id quod surrexerā crebrius pullare. Hæc quidē ille dixit, ego autē deprehendi inflāmationis indicatiū, prospiciensq; ad fenestrā hyſopū ex aqua mullā decoctum in olla consideraui proinde cogitaui, medicum se pleuriticum esse putare, dolore videlicet nothas costas infestante, qualis iecinoris quoque inflammationibus aliquando accidere consuevit. Hunc itaque cum sentiret, essetque spiratio, & parua & crebra, atque exigua tussi infestaretur, pleuriticum se esse existi-

existimabat. Quamobrem Hysopum quoque ex aqua mulsa præparauerat. Intelligens itaque ego, quòd fortuna viam mihi præberet, qua apud Glauconem clarum nomen adipisci possem, manum eius ad nothas in dextro laborantis later costas detuli, indicato quoque loco, dixi eum ibi dolere. Quòd cum ipse fatetur, Glauco ex solo arteriarum pulsu existimans me sedem affectam inuenisse, planè admirari me cæpit. Verùm vt vehemētius stuperet, hæc quoque addidi. Quemadmodum hoc in loco dolere te confessus est, ita velim fatearis, etiam tussiendo cupiditate vexari te. Etenim ex longis interuallis tussis exigua, arida, & qua nihil expuis molestare te solet: atque ita me dicente incæpit forte fortuna huiusmodi quadam tussis specie (qualé iam diximus) tussire qua de re tanta admiratione Glauco commotus est, vt

R s

clamando

clamando in laudes meas prorrúperet. Túe-
 go: nō putetis (inquā) sōla hāc ex arte posse
 praelāgi i. Sūt N. alia quoq̃, quæ nūc aggre-
 dior. Quibus & laborās ipse testimoniū fe-
 ret, itaq̃ rursus incipiēs dixi: cū magnā tra-
 his spīrationē, dolor ea parte qua notavi, ve-
 hemētius te cruciat, senti s̃q̃ in dextra hypo-
 chōdriorum parte grauitatē. His auditis, ne
 infirmus quidem sese potuit continere quo-
 minus prae vehementi admiratione, vnā cū
 Glaucone exclamaret. Itaque sentiens equi-
 dem arridentem mihi fortunam, de iugulo
 quoque, quod videlicet ad inferiora trahi vi-
 deretur, aliquid efferre volebam. At quia
 magnas inflammationes quemadmodum
 & icirrhū, id commitari solent, dicere nō
 sum ausus, veritus ne laudem quā anteā
 de me excitaueram fauciatem. Cumq̃ ani-
 mum induxissem tutō me aliquid eloqui
 oportere, aspiciens laborantem, haud ita
 multo post (inquam) iugulum ad infernas
 partes

*tor iuguli in
 tamar. he
 is reperitur
 i quando est
 gyna*

partes detrahi senties. Nisi fortasse id iam
anteâ tibi euenerit. At cum hoc quoque fa-
teretur, conuersis equidem oculis ad ægro-
tantem mirificè attonitum vnâ (inquam) ad-
dêda est prædictis diuinato. Etenim dicâ, quâ
de morbo suo laborâs ipse habuerit suspi-
cionē. Tū Glaucō, ne de hac quidem diuina-
tione desperare se aiebat. Laborâs autē incre-
dibili hac pollicitatiōe in stuporē adductus,
& acriter me intuēs, quid essem dicturus at-
tēta mēte spectabat. Igitur dicēte me q̄ in-
festatē pleuritidē esse putasset, ille ingēti cū
admiratiōe hui⁹ quoq; rei se testē exhibuit:
quòd etiam affirmabat ex astantibus vnus,
qui paulò ante latus ei⁹ ex oleo fouerat. At
que ex eo tēpore Glaucō, tūm de me, tū de
vniuersa arte quâ optimâ cōcepit opinionē
cū antea nihil magni ab arte spectaret, vt
poteq; nūquā cū cōsumatis in arte viris ver-
sari consueuisset. Hæc ideò dicere volui, vt
intelligatis quæ accidetia cuilibet morbo
propria

propria sint, & quæ aliis quoque morbis communia, ac præterea quæ ab vtrolibet genere sint inseparabilia. Item quæ magna ex parte, & quæ rarò videri solent, atque ea quæ ancipitem habent euentum, vt si aliquando fortuna huiusmodi vobis occasionem qualem mihi fuisse oblatam iam dixi præbeat, ea commode vtisciat. Sepe enim fortuna non contemnendam adipiscendæ laudem ansam suggerit, ea tamē vulgus medicorum ob imperitiam vti nescit. Quamquam doctissimus quisquā cūm accidentium aliquod huiusmodi conspexerit, haud difficulter reliqua quoque inueniet: quorū alia quidem necessariò, alia verò magna ex parte, & locum patientem, & morbum ipsum sequuntur. Verū meminisse debetis generalium præceptorum, quæ & vniversalia appellantur, & quæ multorum specialium, communia genera sunt, vt ea in particularibus prouidè discernere discatis.

Scholium.

ESSENTIA facultatis, si quis exactè consideret, non est temperamentum. Nam facultas nō aliter diffiniri potest, quā ad actionē vis aliquid agendi. Tamen quæ sit eius essentia absolute, & ad nihil aliud relata ignoramus, docente Gale. ipso in fragmento de substantia facultatum naturalium, tamen medicus, perinde de reliquis omnibus sentiēs, ac si facultatis essentia esset, in temperamento nihil errabit. Proinde Gale. ita statuit. Vt libro octauo, de compositione medicamentorum secundum locos cap. 6. docet Gale. ipse omnis hepatica affectio, id est hepatis imbecillitas primū incipit ab excretionibus diluti sanguinis, deinde degenerant aliæ in alias qualitates, vt est intemperies quæ imbecillitatē peperit. Si frigida est in pituitosa, aut aquea, si calida in atrum sanguinem. Merito Gale. Curabat admirationem sibi, & arti comparare, debet medicus quiuis eandem solertiam imitari. Vt cum occasio anam obtulerit honoris, eam arripiat. Neque enim id vanum est, facit siquidem ad salutem ægrotantium. Quia vt Hippo. docet in principio prognostici, ægrotantes audent sese committere medicis, & magis parent, quare illi melius moliuntur curationem. Præterquam quod & fides infirmi habet ad illius salutem aliquid momenti, quia facultas alacrius pugnat cum morbo, neque succumbit, vt cum animum ægrotantes despondent.

EST igitur communis sermo, quem inuenire proposui de naturalibus facultatibus, quas in qualibet parte generatim quatuor esse didicistis : primam voco attracticem , quæ peculiare parti succos alendi ipsam gratia , & appetere , & attrahere potest . Deinde secundam tractorum commutatricem à qua similis succus tractus fit particulæ . Huic aliæ duæ ministrant : retentrix quæ suo munere fungitur , quando pars attractum succum coquit, donec in suam ipsius naturam eum mutauerit: & expultrix quæ à coctione , quod inutile est excernit, idque excrementum vocatur . Has itaque facultates in qualibet affecta parte utrum validæ sint , an infirmæ consideretis hortor: ut in hepate. Quoniam de hoc dicere instituimus , vis attrahendi si quomodolibet afficiatur, cibum in ventriculo iam in succum transmutatum relinquet, ut per aluum exactè confectus , liquidus,

duſ, & haudquaquam exiccatus excernatur. Atque hoc quòd ipſa affecta, ſit ſignum vobis erit. Quidquid enim ab aliquo tanquam à cauſa procedit, id etiam illius ſignũ eſſe conſtat. Hanc paſſionem nonnulli ad meſaræum pertinere autumant, vocântque ſic laborantes meſeraicos, eo quòd vident cibum per venas meſaræo, & meſenterio intextas diſtribui, vt ſolebat, non poſſe, eodem ſeducti errore, quo ii qui manus eorum, quos ſyncopa vel ſtomachica, vel cardiaca proſtrauit, affectas eſſe arbitrantur: vt pote quæ haudquaquam vt antea, munere ſuo ſuugantur. Quippe iecur meſaræi venis, veluti manus, quæ ex ventriculo ei cibum afferant, vtitur. Similiter etiam fallũtur nōnulli, vbi crura reſoluta ſunt, ob paſſionem aliquam, eam ſpinæ partem, quæ iuxta lumbos eſt infeſtãtem. Quippe neglecta ſpina, cruribus remedia adhibent; igitur ſi meſenterium vel inflammatione,
vel

vel alia huiusmodi passione laboret, hunc propriè ad ipsū referemus: si verò iecur ob imbecillitatem per venas suas cibum alligere nequeat, nō mesenterio (idest lactibus) sed iecinori, remedia sunt adaptanda. Quomodo ne resolutis quidem vel manibus, vel cruribus, ob passionem quæ in spina consistit. Verū ubi vel inflammatio, vel erysipelas mesenterium afficit, haud ita difficilè est discernere, si alui excrementa diligenter consideres. Neque enim solū qualia excerni diximus in iecinoris imbecillitate cū ad sese cibum trahere non potest, talia planè deiciunt: sed apparet etiam, veluti ab inflammatione, sanies quædā admixta. Nam ab omni parte inflammata, cui spissum crassūque tegmen nō incumbit, in primis quidem tenuis sanies defluit, quæ concocta deinde inflāmatione, & crassior, puri similior redditur. Cū ergo nulla existente in iecore inflammatione, huiusmodi quippiam

quippiam, cū excrementis succi speciem consequutis deicitur, in mesaræo pãisio-
nem esse censendum est. Igitur vt non po-
tente ob imbecillitatem hepate succum à
ventriculo attrahere, attrahendi facultas af-
ficitur: ita cum retinerenequit, comprehen-
dens, continēsq̃ facultas, infirma pu-
tanda est. Proinde in priinis quidem
cruorem saniosum excerni videmus, po-
stea verò crassum & fæculentum.

Similiter aliæ quædam eueniunt excretio-
nes. Non quidem ob imbecillitatem, sed
ob expultricis facultatis robur, ratione
plenitudinis, & quidem sæpenuero
integra etiamdum constante valetudine.
Sic plærūmq̃ pars aliqua, cum affecta,
per hepar purgatur, viribus ipsius iam fa-
tis robustioribus. Quippe concoctis in ip-
sa vitiosis humoribus sequitur excretio, sed
ita sequitur, vt vtilis humores retineantur,
expellantur verò inutiles. Atque sunt non-

S nulli

nulli qui huiusmodi vacuationes nominant cruentas dysenterias : quæ euenire solent quibusdam, vel mutilato aliquo membro, aut vbi quis in exercitatione educatus ad otium se conuerterit. Ac solet quoque mulieribus retentis menstruis huiusmodi per sedem euacuatio fieri. Atque interdum per vomitum quoque eandem ob causam quibusdam mulieribus. Verùm his sincerus sanguis excernitur, similis ei qui ab hostia interfecta profundi consuevit, modo inferne per aluum, modo per superiores etiam partes. At per erysipelata, & inflammationes, accedente concoctione, vitiosus, cænosus, & putris deiecitur. Atque vt in hepaticis passionibus (quam rarò medicamentorum auxilio, robustiore euadente iecinore, interdum deieciuntur excrementa, tum colore, tum odore pessima, purgato ita viscere. Sic eodem modo vrinæ quoque deteriores redduntur,

quibus

quibus imperiti medici: nonnunquam de-
cepti grauis morbi periculum subesse ar-
bitrantur . Etenim quibus sine ratioci-
natione , rudis duntaxat experientia suffra-
gatur , de his quæ rarò eueniunt experi-
menta habere non possunt , veluti eo-
rum quæ sæpe numero , accidunt facilè
meminerunt . Quòd autem protractò
per longum spatium morbo apparenti-
bùsque notis concoctionis, huiusmodi fiant
euacuationes , non semel duntaxat , imò
creberrimè, ex enarrationibus, quas in Hip-
pocratis , opera edidimus didicistis,
Igitur quemadmodum retentrix facul-
tas cùm imbecillior est, ac rem quæ ip-
sam grauat, retinere non valet vis expul-
tris id quòd molestat, euacuat: ita infir-
ma expultrice, res quædam retineri so-
lent facultate retentrice, non admo-
dum grauata . Nàm in quolibet in-
strumento aliàs , alia facultas fortior,

aut imbecillior fit secundum relationem,
ad actionem, nobis semper ad aliquam in-
telligentibus quamcunque facultatem. Ná
re vera semper tota particula operatur se-
cundum propriam temperiem, quæ illi ac-
cidit frequenter, verùm aliquando rem gra-
uantem sustinet, ac longo temporis tractu
eam vincit, conficit, alterat, & cōcoquit: de-
inde rursus alio tempore, rei infestantis, vel
qualitatem, vel multitudinem ferre non va-
lens, ad ipsius excretionem insurgit. Sicuti è
contrario cùm interim admodum mole-
statur: ipsam rem molestantem deicere cu-
piens, viribus grauissimè prostratis, ob im-
becillitatem, id efficere non potest. Igitur
hæc omnia in quouis naturali instrumen-
to perpendere, atque mentem in ipsis di-
gnoscentis perpendere debetis. Sic enim in-
uenietis partium quarundam passiones, an-
tea haudquaquam indagatas, veluti ne folli-
culi quidem fel continētis. Sic enim (vt ostē-
dimus)

dimus) biliosum humorem ad se trahit, quemadmodum renes uti sanguinis serum, aut splen, id quod vini fecibus, aut amurcæ similatur: accidit interdum, ut ob huius folliculi imbecillitatem, impurus fiat sanguis, atque idcirco alia eveniet regii morbi species, præter eas tres quas iam supra proposuimus. Ac nonnunquam ita repletur etiam (quemadmodum vesica quæ urinæ est conceptaculum) ut euacuari non possit, aut quia obstructus est, aut secretoria ipsius facultas est imbecillior. Veluti etiam, cum obstructis, aut infirmis vasibus quæ, ab ipso exorta ora sua in hepar extendunt, biliosum humorem interdum attrahere non potest. Proinde excrementorum proprietatem in morbo regio considerare, perquam necessarium est. Id enim non mediocrenobis ad huiusmodi notitias auxilium suppeditavit. Hæc equidem considerans inveni quorundam regium morbum patientium excrementa flava

bile vehementer colorata fimiliter etiam & vrinas: item per cutem quoque, vt nonnullis plurimum flauæ bilis à balneo profundî, ita aliis plurimum ipsius retineri, ac perquam exiguum effundi comperimus.

Hanc rem si accuratiori experimento intelligere volueritis, nulla prius adhibita vnctione, hominis sudorem strigili auferri iubete: videbitis profectò non eodem modo in omnibus, strigilis concauitatem impleri, vt pote quòd in aliis magis aquosum, atque in aliis magis biliosum est.

Itaque loci patientis notitia vobis multo erit dilucidior, si cum prædictis hanc quoque notitiam adiiciatis, quidam enim acuta biliosaque febre laborans, die septimo multa flaua bile ad cutem transmissa, à morbo liberatus est, mansitque sequentibus, deinde diebus auriginosus. Itaque & excrementa & vrinas considerauimus: vtriusque verò secundum naturam se habentibus,

bentibus , atque ob eam causam nullam
visceris passionem declarantibus , venit in
mentem , fieri posse , quòd translata in cu-
tem bilis crassior esset , qua ratione pro-
motus dicere volui qualisnam esset su-
dor, illo autem apparente aquoso , coniec-
tilem esse, dissipari contumacem , præcepi
itaque laboranti vt aqua suapte natura ca-
lida, & cui discutiendi vis esset, vteretur , ac
præterea victum adhiberet humidiorum
qui humorum crassitudinem moderatè
posset extenuare . Hic autem bonam vale-
tudinem consequutus est . Vnico auxilio,
& notitia confirmata, & à curatione abso-
luta . Quinetiam alium multam in strigi-
libilem relinquere vidimus , vnde eam plu-
rimà in vniuerso corpore procreari perpē-
dētes, ipsum adhibita idonea curatione sana-
uimus . Quibus verò citra febrim morbus
regius accidit: urgente in dextra hypochon-
driorum partē grauitatis cuiusdam sensu,

iis omnibus aperiens (vt scitis) obstructio-
 nes & cibis, & potibus & medicamētis ex-
 tenuantibus, deinde medicamentum quod
 bilem educere posset exhibens, eorum pluri-
 mos vna die sanitati restituiimus. Qui ve-
 rò purgatione liberari non potuerunt, iis
 rursus valentiore ad aperiendum data po-
 tione, medicamentum quòd vehementi-
 us purgaret, exhibui. Sic deinde sub fine pur-
 gationis, vel cærulea, vel flaua bilis, cùm a-
 cri mordacitate fecernebatur. In his conie-
 ci fellis folliculum, simili quapiam passio-
 ne laborare, qualis in vesica exuberante
 vrina interdum fieri solet. Etenim adeò
 multam nonnunquam recipit, vt nimis in-
 tenta nequeat eam quæ in ipsa contine-
 tur expellere. Verùm in vrinæ recepta-
 culo (neque enim absurdum fuerit, ve-
 sicam ita nominare) bifariam id fieri solet.
 Interdum vel ob excretoriæ facultatis im-
 becillitatem : interdum vel ob grauem
 somnum

somnum, vel negotia quæpiam, retenta
 ultra quam par est vrina: quæ deinde ve-
 ficam nimis intendens, ac ipsa ratione vi-
 res prosternere potest. At folliculus fellis
 vt pote cui nullum succurrit ab animali fa-
 cultate præsidium, vnicum habet imbe-
 cillitatis principium, veluti cætera quoque
 naturalia instrumenta, à partis intemperie
 ortum.

S C H O L I V M.

Q V A T V O R esse naturales facultates di-
 ctum à me est, libro secundo, controuersia-
 rum, neque minus disputatum est, libro quarto, *cap. 4 an*
 qua ratione harum facultatum, vna lædi possit, *medium*
 alijs non lætis, cum facultates omnes eiusdem sunt *lib. 2. con*
 particulæ, si omnes habent essentiam in tempera- *cap. 23.*
 mento, & vt videtur consentaneum vnus parti-
 culæ vnicum est temperamentum. Reliqua etiam
 omnia huius capitis, partim sunt per sese perspi-
 cua, partim alijs locis à me disputata, vtque actio
 facultatis quæ contrariam habet possit esse nimia,
 vel ob inordinatum illius motum, vel per debili-
 tatem

tatem contraria, & vt quadam expellantur violentia facultatis expellentis, quadam langore retinentis. Quod in fine huius capitis Gale. dicit, indiget animaduersione. Nam vesica fellis potest, imbecillitatem pati, non tantum ob intemperiem, sed etiam ob fibrarum distentionem, cum plus satis plena est, non aliter ac vesica vrinae. Nam distentio

nem quam negotia, vel somnus faciunt in

vesica, potest in illa, obstructio

via facere, ac deinde, soluta

etiam obstructione,

imbecillitas

super-

esse.

LIBRI QVINTI
FINIS.

✻ Liber sextus de LOCIS PATIEN- TIBVS.

C A P. I.

Relectiuncula.

Docet breui hoc capite Gal. omnes lienis affectiones similitudine cum affectionibus hepatis cognosci, clariùs quàm vt indigeant propria disputatione, idq; indicat facta quarundam affectionum enumeratione.



X iis, quæ de iecore diximus, facile inuenientur notæ, quibus lienis passiones discernantur: præsertim cum inflammationes ob duritiem facile

tangendo deprehendantur. Quum itaq; splē multa habeat accidentia cum hepate cōmunia, illa nullare differre videntur, nisi quod quædam magis, quædā verò minus, alterutri euenire solent. Nā quod ad coloris rationē pertinet, vniuersum corpus, vbi splen imbe-

imbecillitate laborat, magis nigricare videtur. Nam hoc ei natura officium dedit, ut melancholicum sanguinem ex hepate ad sese atrahat, quo ipsum aliā demonstratum est. Igitur attrahendi facultate facta imbecilliore, sanguis ex iecore in vniuersum corpus impurus transmittitur, quocirca color nigrior euadit. Quinetiam hepatis exemplo, sæpenumero excrementa quēdā ex se reiicit, ita ut vomitione, in nausea quoque accedit, melancholicum sanguinem excernat: qui interdū per inferiora quoque decedere videtur. At huiusmodi vacuatione suppressa, nonnulli mæstitia melancholica vexantur, atque cibos auidissimè concupiscunt, idque præcipuè, si valde fuerint acida, quæ ad ventriculū transferuntur, excrementa. Quod si alia accidat humoris melancholici corruptio, euerti, deiicique appetentiam videas. Quod verò indurato ipso, aqua inter cutem effundi possit, consentiente

sentiente iecore, iam antea dictum est. Qui-
netiam laborante aliquando utroque ulce-
re, regium morbum euenire conspeximus,
nigriore, quam pro consuetudine, subsequen-
te colore, ita ut putaretur flaua bilis fuligi-
ni esse permixta. Atque medici quidam iecur
nulla passione laborare existimantes, dubi-
tant, quomodo à splene morbus regius na-
sci possi. Quemadmodum dubitant qui à
solo liene indurato, nullo existente in ieco-
re vitio, aqua inter cutem fieri posse arbi-
trantur, haud secus dubitare consueuerunt, in
ea quoque aquae inter cutem specie, quae ad
acutos morbos sequitur: quippe ab iis iecur
calida, & saepenumero sicca quoque intempe-
rie tam grauius laborat, ut cibum in san-
guinem transmutare nequeat. Atque ne in
iis quidem iecur pati existimant, ab Eras-
trato accepta consuetudine, ut nullam par-
tem laborare arbitretur, nisi vel tumor quis-
piam, vel vlcus in ipsa consistat. Verum
id

id illis concedendū est, qui existimant nullū ab intemperie morbū fieri. At medici, qui sequūtur ea, quæ manifestè apparēt, qui & refrigerata parte quapiā, accidentia quædā fieri suspicantur, admiratione digni sunt, quod aquam inter cutem consistere posse putant, neutro horum viscerum patientie. Si enim ob id, quod nullus est in hepate tumor, ipsum haudquaquam pati existimant, nec aliarum partium vlla patitur, in his, qui aqua frigida vitiosa epota, mox aqua inter cutem corripuntur: quippe noxam infert internis partibus aqua sic ingesta, alias aliis, sed præcipuè & in primis, ei, quæ forte fortuna eo tēpore reliquis fuerit imbecillior. Verūn nisi ad iecur frigus transmittatur, aqua inter cutem subsequi potest minime. Sic splenis quoq; vitio aqua inter cutē nonnunquam euenire cōsuevit: aut cū tumor quispiam, vt scirrhus, ipsum refrigerat, aut vbi citra tumorem refrigeratū est, vt cū

quis

quis aquam frigidam, & vitiosam, affatim, & importunè potauerit. Quod verò melancholica mæstitia, ipso huiusmodi excrementa ad os ventriculi trās mittente pueniat, antea, vbi de ore vētriculi tractauimus, iam dictum est. Quamobrē in hoc viscere diutius nobis immorādū nō est, cū eius instrumentariæ passiones rationali dignotione non indigeant. Quæ verò ab intēperie proficiscuntur, partim ex iis, quæ iam diximus, partim ex ea doctrina, quàm supra de iecore proposuimus, notæ sunt, nam aliæ quidem nominatim sunt explicatæ, aliæ verò, quæ similiter vt illæ, cōsistunt, similē quoq; habebunt dignotionem.

S C H O L I V M.

LIENEM duris passionibus laborare solitum ob crassitiem alimenti, quo vtitur dictum est à Galen. libro 13. metho. his verbis, lienis verò rarior substantia quam iecoris est, cæterum crebrius scirrhis vitijs affligitur ob nutrimenti quo vtitur speciem

speciem. Monstratum namq; est, quod crasso nutritur sanguine, qui veluti limus purioris est. Ceterū videri possit alicui ratio à nutrimenti specie ducta in contrarium cedere. Nam Ga. ipse asserit lienem nutriri tenui succo libr. quarto de vsu partium his verbis. Splenis verò corpus cum tanto rarius hepate sit, quantò est crassius pulmone, meritò ex tenuiori parte sanguinis nutritur. Verum scire licet alimentum quod alendo spleni trahitur crassissimum succum esse puta melancholicum, tamen ex melancholico illo succo per crassas arteriarum tunicas tenuissimam partem assumi, qua illius caro nutritur. Hinc fit, vt ex tenuissima parte melancholice rara fiat substantia membri, & ex facibus succi alioqui crassi, tumores soleant in eo duri fieri. Hinc palàm fit, non mirum esse, Gale. modo dicere splenem nutriri succo crasso, modo tenui. Nimirum trahit succum crassum, quo alatur, deinde illius accipit tenuissimā partem. Nec proinde accusare debemus contradictionis Galenum, vt facit Lacuna Segobienensis, qui nimis adstrictus verbis videtur iam non satis assequutus, sed aduersus huius viri contradictiones quodam commentariolo à me scriptū est, atque de lienis proprio alimento. 2. libro controuersi. capi. tertio. Calida & sicca intemperies iccoris videbitur fortasse nō posse parere hidropē, quandoquidem ea intemperies videtur alia ratione sanguinis generationem vitare posse, nempe sanguinem biliosum generando, non tamen pro sanguine.

*ny acalidam
nigum 2nd xy*

sanguine aquam. Nam id videtur frigida esse intemperiei. Verum scire licet omnem intemperiem, cum eatenus iam processit, ut natium partis temperamentum corruerit, actiones quasque tollere aut minuere, quia facultates omnes debilitat. Quanquam antequam eatenus processum est, alia intemperies incipiunt ledere, tollendo aut minuendo, alia vitiatas edendo actiones. Non video cur dicat morbos instrumentales lienis non indigere rationali dignotione. Nam si de tumoribus præter naturam, qui morbi sunt, partim in temperamento, partim in compositione, dicit, falsum est ad eorum dignotionem non esse opus ratiocinatione. Nam illos tumores nisi magni sint, impositi muscoli prohibent sentiri tactu, quod si magni sint tumores, tactu sentiuntur, sed non nisi ratione dignoscuntur ab iis qui sunt in omni to & musculis. scilicet ex figura. Cõstat verò ut ea dignotio quæ agitur ratione adiuncta sensui rationalis dici debeat. Quod si de morbis solum instrumentalibus vocatis dicit Ga. multo clarius est eos indigere rationali dignotione. Nam si venæ, quæ ab hepate veniunt in lienem, aut à liene in ventriculum, obstructæ sint succo aliquo crasso ac læto, sine omni tumore) quid enim prohibet, cum id in renum venis fiat quotidie & aliis plerisque,) quæ erit ratio dignoscendi ex solo sensu? aut quæ alia quam ex symptomatis, quæ eas vias obstructas esse argumenta sint? Certæ morbi instrumentales lienis ratiocinatione indigent, nihilominus verum est Gale. non multum defecisse

674 DE LOC. PATI. G. CVM SCH.
 in horum enarratione. Nam omnes sunt spleni cō-
 munes cum hepate, aut similes ijs qui sunt in hepa-
 te, & similem habentes dignotionem. Nam si qua d-
 ctarum venarum obturatio sit, eadem via procedē-
 dum est, qua in obstructionibus vesicæ felis proce-
 debatur. Nā vt ex his colore pallido tota cutis tin-
 gebatur, ita ex illis colore nigro tingetur, aut regur-
 gitante melancholico succo aliorsum, accident de-
 iectiones nigræ, aut nigræ vrinæ, aut manabunt he-
 morrhoides largius.

CAP. II.

Relectiuncula.

*Cap. hoc est de affectionibus imi ventris, quo non om-
 nes morbi referuntur sigillatim, sed præcipui & maxi-
 mi, vt dysenteria tenesmus, & dolor colicus, & voluulus,
 & celiaca affectio, ac lienteria.*



V V M de ventriculi passio-
 nibus, superiore libro loque-
 remur, in duas maximas ip-
 sum partes secari diximus,
 quarum altera, quæ superior
 est, gulæ continua est, ex multis nervis sen-
 sificis

fificis contexta. Altera verò huic continua, ad intestinorū vſq; exortū extenditur. Porro ſicut vtraq; in animalibus proprio munere fungitur, ac pro vtilitatis differētia diuerſa eis eueniunt accidentia : ad eundem modum quæcunque paſſiones communiter, tūm ſimilaribus, tūm inſtrumentalibus partibus aduenire ſolent, eæ etiā iis, tūm inter ſe, tūm etiam in vniuerſis inteſtinis, cōmunes eſſe cenſentur. Verūm accidentium ſimilitudo, non ſolum in iis inter ſe, ſed etiam in vicinis quoque partibus, quæ ipſa attingunt, inuenitur : qualis eſt renum, & coli communicatio : atque horū nonnulla ſedem patientem habent cognitu facilem, vt dyſenteria & tenefimus. Sanè in præſentia nomen dyſenterix propriè audire oportet, vt potè quod ex appellatione ipſa, inteſtinorum vlcus ſignificat. Neque enim affatim fit eiufmodi paſſio, id, quod in ea, quam hepatis vitio accidere dicimus, fieri

T 2 ſolet:

solet : atque proprias etiam habet notas. Etenim protinùs ab ipsius initio bilis mordax scernitur , quàm deinde interaneorù abrasiones sequuntur , postea paulù cruoris simul excerni videtur , quando videlicet passio ipsa iam dysenteria esse censetur. Quum itaque huiusmodi abrasiones solæ excernuntur , considerandum est , num pingue quippiam simul cum ipsis deiciatur : ita enim in crassis intestinis vlcus consistere credendum est. Vbi verò cruorem quoque excerni videris , intueri oportet , utrù is reliquis excrementis ita sit admistus , vt vniuersus misceatur vniuersis , an pars eius aliqua reliquis supernatet : etenim si admistus est , in superioribus : si verò supernatat , in humilioribus intestinis vlcus esse portendit. At idem quoque in ramentosis excrementis videre est , verùm non ita manifestè vt in cruore. Similis etiam de crustulis ratio est. Nam & ipsa , vtra intestina
sint

sint læsa, declarant, tùm ex essentia propria, tùm ex modo, quo vel commisce-
ri reliquis excrementis, vel vni eorum par-
ti supernatare videntur. Cæterùm non me-
diocriter conducit ad curationem, nosse in
qua intestinorum parte consistat vlcus.
Nam si in superioribus intestinis est, ab e-
potis medicamentis præsidium petendum
est: si verò in humilioribus, clisterem sub-
iicere magis conuenit. At huiusmodi dy-
senteria ab his, quæ ab hepate proflunt,
ita discernuntur. Nam ab initio tenuis sã-
nies siue serosus humor sanguinis ab hepa-
te deiicitur, deinde aucto malo, crassus hu-
mor fecibus vini haud absimilis. Præterea-
que in hepaticis excretionibus nihil abra-
sum expellitur, atque interdum duorum,
aut trium dierum interuallo supprimitur
euacuatio: deinde rursus redit malũ, at-
que excernũtur excrementa prioribus mul-
to peiora. Id verò per intestinorum vl-

cera haudquaquam apparet : quippe in iis neque affatim, neque ex longis temporum interuallis, laborantes deicere consueverunt. Atque vlcera, quæ in recto intestino oriuntur, (tenesimum vocant) vehementer quidem tensione & prompta deiiciendi cupiditate infestant, paucis admodum frequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa, pingua, progressu verò temporis etiam ramenti specie deiiciuntur, sed per totum morbi spatium iis, quæ à supernis descendunt, haudquaquam misceri videntur, scribunt nonnulli, quod à forti excernendi conatu, præcedente dolore vehemente, aliqui lapides callosos deiecerunt, iis, qui in vesica nascuntur, haud ab similes : id, quod neque ego vidi, neque alium, qui viderit vnquam, audiui. Sed coli vehementē dolorem sæpenumero conspexi, medicis illū nō ad colū, sed ad renes pertinere putantibus, veluti renū quoq; crucia-

tus

tus, ad colum referre videntur. Sunt qui omnino negent, in sinistris partibus, colicam passionem euenire posse. Igitur ab initio, harum passionum distinctio difficilis est, quo tempore neque ita magnâ præsidiarum differentiâ ipsi requirunt. Itaque accidentia exuperantia, etiâ tunc diligenter intueri oportet. Nam & nausea, & vomitus vrgent, multo grauiore, & magis assidui, dolente colo. Euomuntque ita laborantes pituitosa quædam atque corrupta, hac in re nephriticos longè superantes, ac retinent etiam magis excrementa, vt ne flatum quidè, neque etiam rictum excernere possint. Sæpe numero etiam veluti circuire videtur dolor, atque ampliorem locum occupare, & diuersas quoque partes occupans, modo in hac, modo in illa parte, vehementior fit, nephritici verò dolores, eodem in loco stabiles iugiter infestant. Quum itaque dolor in loco fuerit renibus altiore, ma-

nifestum colicæ inditium portendit. Si verò in vno loco, vbi scilicet renes ponuntur, stabilis constiterit, nihil ad notitiam potest positus ipse conferre: proinde cum his notis quas nuper percurrimus vrinæ quoq; considerandæ sunt. Nam nephritici ab initio dilutas, purasque reddunt vrinas: deinde sequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere videtur: demùm omnino arenosæ minguntur. At in colica, si quid ab aluo deiicitur, id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatare consuevit, similē habens bubulo stercore consistentiã. Quinetiam colicorū cruciatus multò magis, quàm nephriticorum, lenietibus mitigantur clisteribus. Atq; euenit interdū, vt frigido aliquo humore simul eiecto, illico quiescant: eritque mitigās præsidium, non mitigans tantū, sed etiam curatiuum, & ad cognitionē faciens. Porro vt hi frigidum humorē aluo excernente, ita nephritici

nephritici cùm vrina lapide exeunte, & à dolore liberantur, & simul locum patientem ostendunt. Itaque nihil relinquitur, nisi vt prouideatur, ne postea tam facilè pati possint. Nam vt perseverante dolore, vtraque pars eisdem indiget præsidis, ita tempore subsequente oportet diuersa auxilia adhibere.

SCHOLIUM.

DE intestinorum doloribus & renum vesicæq; malis, tam multa dicta sunt à Galeno in exemplis, libris primo, & secundo, & de reliquis intestinorum affectionibus proximo libro, qui totius operis erat, quintus ob communem rationem cùm ventriculo & hepate, vt liceret ei. Hic breuius agere de his omnibus, aut illic esset immorandum in exemplis minùs. Licebit ergo nobis hic omnia quæ illis locis enarrata sunt intacta præterire. Vt differant ventriculi os & fundum, vsu & symptomatis dictum est à me cap. 5. lib. 5. vt vicinarum loco partiũ maximè continuitate quadam coniunctarum morbi similes difficilè dignoscantur constat, cùm desit argumentum à loco & situ, indicatũque est suprà multis exemplis, maximè in doloribus renum & co-

T s li,

li, dicetúrque hoc capite rursum. In maximis intestinorum morbis sunt dysenteria, & tenesmus, & dolor colicus, de quibus hic disputat. Reliqua quæ de dysenteria vera distinguenda à dysenteria cruenta per hepatis affectionem dicit, enarrata sunt satis. Causa, qua, in cruentis deiectionibus per hepatis affectiones sanguis fluat copiose, sed ex quibusdam interuallis, in vera dysenteria contra, guttatim, & assiduè est, quòd in hac non alia causa quàm vlceris effluit sanguis, vlcus verò adest perpetuò, non per interualla, in illis verò effluit hepate demittente sanguinem & intestinis rapientibus per mesenterium. Verùm euacuationes omnes quæ aguntur membro in membrum mittente ex interuallis omnino fiunt. Nam nullum membrum perpetuo emittit, sed cum irritatur, aut grauatur, quare cum quodã tempus insumat in colligendo quòd grauet, quoddam quoque tempus est antequam secundo expellat, ex quo primo expulit. Quòd dolor colicus non possit in sinistra parte fieri nulla ratio est, quanquam nonnulli ante Galenum ita putauerint. Nam colum non minùs attingit sinistram quam dextram partem, vidimùsque non rarò sinistram partem dolere, atque dolorem è dextra in sinistram partem, aut contra migrantem.

Quapropter

QUAPROPTER nullum, quòd ad curationem pertinet, committe-
tis errorem, si in prima protinus ho-
rum morborum accessione, eos difficulter
discernatis, eo quòd tum nec extrinsecus,
nec intrinsecus, differentibus egent auxiliis,
quòd satis sit, ea, quæ dolorem lenire pos-
sint, adhibere. Quum autem omnia intesti-
na ordine quodam à ventriculo descendât,
atque omnium suppræmum ieiunum sit,
deinde quòd tenue vocatur, postea cæcum,
quòd vsque ad infernas partes extenditur,
deinde colum, quòd ad superiores reuerti-
tur partes, donec sæpenumero & lienem, &
iecur attingat: satis mirari nō possum, quo-
modo non solum medici ferè omnes, sed
etiam populares, vehementissimos quosq;
dolores, in quacunque parte euenerint, ad
colum referant. Id quòd mihi quoque veri-
simile visum est, atque hoc, cùm causam
quesiuissem, cur tam vehemens, tamque
perseuerans

perseuerans esset dolor, nō simpliciter huic
 assertioni fide habita. Neque N. similiter,
 vt in renibus, atque vreteribus impacto la-
 pide, ingētes dolores in transitu excitātur, sic
 & in tenuibus intestinis, rationi consentane-
 um esse censebis, frigidos spiritus retentos,
 atque similes iis humores, dolorem in ipsis
 efficere. Nam tenuium intestinorum tuni-
 cæ rara, tenuique essentia constant, vt non
 ita diu huiusmodi causas continere possit.
 Ergo probabile est, frigidū, eundemque cras-
 sum, aut viscosum humorem, aut flatuo-
 sum spiritum, in corpore crasso, densōque
 genitum, sed egredi nequeuntem, dolorem
 excitare, vehementem quidem, geminam
 ob causam, intemperantiam, & corporum
 quibus continetur, tensionem: longum ve-
 rò, quia difficulter vacuatur. Nam corpora
 ambientia, tum ob crassitudinem ipsius, tū
 spissitudinem suam, ipsum arcere possunt.
 Atque interdum alii quoque dolores, &
 quidem

quidem vehementissimi in sublimioribus
intestinatorum partibus eueniūt, grauius vo-
mitibus cruciantes, adeo vt nonnulli sub
fine, stercus quoque euomere conspiciātur,
à qua passione vix vnquam aliquis potuit
sanus euadere. Nunc ileon vocant, nonnul-
lietiam chordapson, cum scilicet tumor ali-
quis eminet, in tenuium intestinatorum par-
te, vt videatur intestinum ad chordæ simili-
tudinem conuolutum. Itaque non ab re vi-
sum est medicis antiquioribus, vel ab inflā-
matione, vel obstructione aridi stercoris,
huiusmodi tenuium intestinatorum passio-
nes oriri. Sunt alia quoque accidentia, quæ
quidem haud absurde, & intestinis, & ven-
triculo simul patientibus euenire credun-
tur, vt sunt passiones, quas lienterias, & cæ-
liacas nominant: cum videlicet materiæ ne-
quaquam sunt mordaces. Nam vt morda-
ces, ob mordendi vim totum intestinum
ad excretionem excitant, ita non mordaces
intestinatorum

intestinorum imbecillitatem sequi consue-
 uerunt: quia retinere cōtenta, ne exiguo qu-
 dem tempore possunt. Siquidem illico ex-
 cernunt ea, perinde, ac si grauē aliquod o-
 nus deponerent. Haud secus, quā in stilli-
 cidio vrinæ contingit. Nam & in hac, mo-
 do ob acrimoniam, & vellicationem, vesi-
 cæ iugiter, quidquid ad eam peruenit, secer-
 ni, modo ob id quòd molem ipsius, & vel
 exiguam, sustinere nequit. Cæterū à qui-
 bus causis intestinorum leuitas proueniat,
 alibi particulatim ostendimus, præter ea,
 quæ in libris de curandi via, & ratione, de na-
 turalibus facultatibus, & de accidentiū cau-
 sis iam dixeramus. Etenim hunc librum nō
 incæpimus, ut causas, quæ morbos efficiūt,
 sed ut patientium locorum, qui & tactus,
 & visus iudicium effugiunt, notas perstrin-
 geremus. At quia ad exactā horum notitiā,
 etiam de ipsis passionibus interdū aliquid
 dicere coactus sum, idcirco de causis quoq̃,
 quæ

quæ ipsas efficiunt, mentionem facere non sum grauatus. Itaque sermoni de intestinorum passionibus finem imponamus. Sunt enim in ipsis passiones quædam cognitu faciles, quæ & ipsæ cum prædictis communes habent notas. Nam abscessuū, inflammationum, scirrhorum, inflationū, erysipelatum indicia, omnibus cognita, cū in ventris locis apparēt, & passiones ipsius, atque simul patientis sedis notitiam ostendunt. Sed de iis iam antea satis dictum est.

SCHOLIUM.

MAGNUM medicis profectò solatium, quòd cū difficilis est morborū dignotio, facilis est curatio, quare aut nulli, aut leuissimi committentur errores ex obscura cognitione. Nam difficilis dignotio, è magna, morborum similitudine nascitur. Quæ N. diuersa admodum sunt, nullus non distinguet, quæ verò similia sunt mala, non indigent dissimilibus curationibus, sed communia habent auxilia. Quanquam alijs locis sex nomet Gal. intestina, hic verò quatuor tantum, nihil repugnans putetur.

tetur dicere. Nam ieiuni nomine intelligit duode-
num, & ieiunum, nomine coli, colum & rectum inte-
stinum. ἰλεον, est voluulus ita dictus à verbo ἰλεω,
hoc est volui. Dicitur etiam χορδαντες, à χορδένω,
id est implico, quòd per eum morbum videantur ef-
se intestina inuoluta & implicata. Cæliacæ affectio-
nes ventri, ita dictæ à κυλία, id est venter. Dicuntur
verò ita affectiones similes lenterijs, id est leuitati-
bus intestinorum, quæ vergunt magis ad ventricu-
lum quàm intestinum. vt leuitas ad intestinum ma-
gis. Itaque leuitas intestinorum à ventriculo humi-
dis excrementis abundante principium ducens est
cæliaca affectio. Reliqua omnia quæ hic dicuntur
libello, de causis morborum require.

CAP. III.

Relectiuncula.

Cap. hoc est de renum passionibus, imprimis de dolore
renum cum lapide, aut arenulis, quem docet à colico distin-
guere, & de abscessu in renibus, & excretionem pilorū, &
caruncularum, & mictu sanguinis, & de diabete. Quem
morbum, quanquam habeat multa symptomata commu-
nia, cum alijs membris, confirmat multis argumentis Gale.
propriè ad renes pertinere, docetque longiuscule illius cau-
sas & generationem. Tandem disputat de magna totius
corporis dissolutione.

Igitur

N G I T V R cūm derepente nephritis inciderit, lapide notatu digno, vel in renū aliquo, vel in vreteribus impacto, dolorē excitat colico haud absimilē. Verū distinguitur colicus, ex nauseæ tū multitudinē: tūm magnitudine. Sūntque per vomitū reiecta, & biliosa, & pituitosa, quibus præsumpti quoque cibi aliquid admistū videtur. Sæpenumero etiā ex loco, cū superiore coli partes patiuntur. Atque ex eo interdū, quòd nō vni loco dolor innititur, sed reuoluitur, & ad plurimas extenditur partes, præterea quòd ne flatus quidem transmittitur. Atque omnia hæc colicis duntaxat euenire solent, sed alia quidem magis, alia verò minus. Quum verò ex his, quæ in vrinis resident, aut lapide cū vrina excreto, planē discerni possunt, nullus relinquitur quæstioni locus, Sunt non pauci laborantium, qui dolorem modicum in profundo lumborum infestantem
V sentiunt,

sentiunt, quãuis ab initio nondũ fabulosum
 quippiã manifestè excernatur. Quibus (vt
 scitis) dato medicamẽto, quòd lapidẽ in re-
 nibus cõterere posset, simul & passionẽ ip-
 sam, & sedẽ patientẽ cognouimus, atq; ip-
 sum habuimus curationis principiũ. Quũ
 N.ã medicamẽti potione, in vrinis fabulo-
 sa quẽdã subsidere cõspicerẽ, nephriticã pas-
 sionẽ esse cognoui: atq; deinceps eadẽ medi-
 camẽta exhibẽdo, reliquã simul perfeci cura-
 tionẽ. Quũq; renẽ quẽpiã ita laborare co-
 gnoueris, si dolores cũ horrore interpella-
 to, varióq; infestare videãtur, sequáturq; fe-
 bres quãdã inordinatæ, tũ pronũ in ventrẽ
 decũbere, atq; interdũ in alterũ latus, vt su-
 blimis sit patiẽtis partis positũ laboratẽ se-
 se vertere iube, ac deinde interroga, nũ circa
 renẽ dolẽtẽ veluti suspẽsi cuiusdã ponderis
 sensum percipiat. Etenim cũ hæc ei accide-
 rint, abscessũ iã coneretũ conũcere oportet.
 Quo concocto, pus miẽctum, vt laboran-
 tem

tem à dolore liberat, ita vlceris in rene periculū affert. Proinde exacto studio laborandum est, vt inducatur cicatrice. Quòd nisi cito contigerit, difficiliorem reddet curationem. Porro perseverantis vlceris notæ ex vrina haud obscurè depræhéduntur. Adde quòd laborans creberrimè in patiente rene dolorē sentit, atq; interdū cū vrina exiguū pus, veluti ab vlcere, excernitur. Similis crusta vlceris nonnunquā cū vrina expellitur. Ac interim sanguis quoque qui erosi iam vlceris indicium est. Quāquā rupto aliquando vase, aut ob plenitudinē, aut casum, aut vehementem ictum, nonnulli magnam sanguinis copiam inciēdo profuderunt, id quòd etiam aperto interdum venæ alicuius ore fieri contingit. Sed certissima vlceratorū renū cōiectura est si cū vrina exiguæ quædā carūculæ excernātur, vt potestas renū essentiaē partes, easq; ob vehementē vlceris erosionē auulsas esse, constat.

Ea verò, quæ pilis similia sunt, Hippocrates quoque cum vrinis excerni vidit, quemadmodum in Aphorif. scripsit, ac ipsi etiam vidimus aliquando, quæ palmi longitudinem æquarent, interdum etiam iis longiora, nonnunquam valde, exigua, vt mirarer quomodo in renum spatio talia posset consistere: proinde probabilius mihi videbatur, in venis huiusmodi res procreari. Quemadmodum in quodam Arabie loco (vt aiunt) in tibiis hominum dracunculi vocati nascuntur, neruosa natura, colore crassitudinèque lumbricis similes. Igitur cum multos audiuerim, qui sese vidisse eos dicerent, ipse verò nunquam viderim idcirco nec de ortu, nec de essentia ipsorum quicquam exactè conicere possum. At vbi pilos meiando excretos vidi, tum ex colore, tum ex mole, credidi dicentibus eos ex crassa, lentâque materia quàm calor calfecit, exiccauitque in venis consistere: quanquam

longitu

longitudinis ipsorum causam non intelligo. Verùm cum primùm eos vidissem, curationem à medicamentis, quæ vrinam ferre possent, tentavi, quàm postea experientia comprobavit. Atque nullis ferè qui hac passione laborauerunt, symptoma aliquod nephriticum, aut prius fuit, aut postea superuenit, medicamentis vreticis curatis. Verùm etiam si alia quæpiam humorum vitia à venis per vrinam expurgentur, quemadmodum si puris quoque multa, fiat per vrinas excretio, nihil ab iis, vel renes, vel vesicam, vel vreteras, molestari cognouimus. Cæterùm in hac re, non parum cum intestinis conuenire videntur, quæ in hepaticis passionibus nihil læduntur, licet à bile sincera lædantur, veluti vesica quoque, vbi longo tempore acres per ipsam vrinæ transeunt, vlcera pati solet.

V. 3

Scholium.

DE caruncularum, quæ in vrina conspiciuntur substantia dictum à me supra est in hoc ipso opere. Similia capillis dicit hic in venis non in renibus generari, tamen comment. 76. part. 5. aphor. inquit succo in renibus quodammodo vito pili generantur. Certè vtrunque puto verum esse, comparareque capillos in venis longitudinem, in renibus soliditatem, & consistentiam magis. Dracunculos illos, quos in quodam Arabia loco oriri audiuerat Gal. viderat autem nunquam, ferunt generari sæpe in quibusdam locis indiarum quæ superioribus annis regno castellæ accesserunt.

EST etiã alia renũ passio, qua tenuis sanguis, siue humor serosus sanguinis mingitur, similis excrementis quæ in hepaticarũ passionũ initio excernũtur, nisi quod magis videtur cruẽta. Cuius rei causa est passio haud absimilis ei, qualem in iecore diximus imbecillitatẽ esse, insuperq; cũ ora, aut meatus, (vt cuuque nominare volueris) per quos ex cõcaua vena in renes vrina percolatur, supra modũ dilatãtur: atq; ad renes quæque pertinere ea videtur passio, quã alii Hippocritæ dropen

dropē matellæ, alii vrine profluuiū, alii diabētē, alii diplacō appellāt, quæ certē quārarissimē euenire solet. Equidem eā hactenus bis dūtaxat videre potui, supra modū videlicet sitiētibus infirmis, atq; subinde bibētibus. Quapropter exuberāter quoq; reddūt id, q; biberūt, eo à sua qualitate nō mutato. Atq; hec renū, vesicæq; palsio, similis est vētriculi, intestinorūq; leuitati. Sed de intestinorū læuitate alibi separatim iā dictū est, vbi ostēdimus nō vētriculū dūtaxat, sed vniuersa quoq; intestina ad excretionē, tū ciborū, tū potuū assumptorū, celeriter excitari, quæ ne pauxillo quidē tempore citra molestiā ferre possint, ipsorū aut pōdus, aut qualitatē. At q; affatim, celeriterq; ad vesicā vrina defertur, id neq; ad vētriculi, nec ieiuni, nec tenuiū intestinorum, imbellitatē, tanquā causam referēdū est. Si N. ob id q; potū sustinere nō possunt ad excretionē properant, quid obstat: quominus per sedē ex-

cernatur? Id, q̄ in læuitatibus intestinorum fieri planè videtur. Nèque N. cibus duntaxat, tã celeriter, per tã lōgã intestinorum cōvolutionem transiens deicitur, verùm etiã ea, quæ epota fuere. Porro transmissionem à totius ventriculi partibus ad hepar, non propter hepatis, aut venarũ in mesenterio, aut ventre, aut earum, quæ ab hepate exortæ ad renes tendunt, imbecillitatem fieri didicimus. Quippe in libris de naturalibus facultatibus iã ostensum est, iecur ex ventriculo per mesenterii venas, veluti arbores à terra per radices, cibum ad se se allicere: sic etiam renes id, quòd aquosum in sanguine est, verùm vesicam non trahere à renibus, quemadmodum nec intestina à ventriculo, sed renes quidem per vreteras excernendo in vesicam mittere ventriculum, aut in iejunum per eum exortum. quem Herophilus dodecadactylon vocat, à duodecim digitorum longitudine nomen ei imponēs.

Itaque

Iraque renum potius imbecillitas accusanda est, ut pote qui continere diutius] urinā non valēt, non verò aliarum partium, per quas potus transire solet. Sed rursus reprehendendo dicet quispiā, cum infirmi fuerint renes, quomodo fieri potest, ut tā celeriter urinā ad sese attrahāt? An dicere possumus, quemadmodum in vētriculo quibusdam lentericis vehementissima excitatur ciborum cupiditas, ita in renibus quoque cupiditatem simul oriri, atque hanc ob causam eos urinam per concavam venam ad sese trahere, sed illico ab attractiōis impetu grauari? Etenim quemadmodū in his, qui camina vocata appetentia vexantur, videmus ut affatim impleti, paulò post aut euomant, aut fluore deiciant: id quod non solum iis, qui præter naturā se habent, accedere solet, verum etiam animalibus quibusdā integra valetudine degentibus: ut in auiculis quas nostrates in Asia Seleucidas vocāt, videre

V 5

dere est: quippe quæ iugiter locustas edunt easque celeriter excernunt. Ac in aliis quoque animalibus huiusmodi accidens naturale videtur. Ut igitur canina cupiditas in ore ventriculi consistens, non potente ipso deuoratorum pondus sustinere, multa impetuosè ingerere, atque ea celeriter excernere cogit: ita in renibus quoque accidit serosæ humiditatis cupiditas, vnâ cum virium imbecillitate, vnde & humiditatē assatim attrahere ac eam deinde in vesicam impellere coguntur. Sed queres fortasse, quamobrem vrinæ fluor subito euenire potest, leuitas intestinorum non potest? Veluti nec canina cupiditas, sed pluriû dierû numero opus est. Nam passionis initium ab incremento, incrementum à vigore distinguitur. Quoniam ventriculi cupiditas qua cibum, potumque appetit, animale officiû est, quo citra sensum nostrum nequaquam fungitur. Renum verò desiderium naturale est, neque ab ipso sensus

sus nostri patiuntur. Proinde cùm ad statum peruenit, ne sensum quidẽ mouet, quemadmodũ appetẽtia canina. Qua de re rationi consentaneum videtur, vt cùm inceperit, paulatim increseat. Imprimis enim trahit sanguinis serum ex venis, vel nihil noui sentientibus: quod cùm totum attraxerit, videatũr q̃ sanguis in venis, huiusmodi humiditate spoliatus, exiccata tũ vasa humorẽ trahũt ex hepate, deinde hoc ex intestinis, & ventriculo. Quum itaque exiccatae fuerint venae, quae in ore ventriculi sunt, potũ desiderat homo, vt potẽ passionẽ ipsam, tum primum sentiens, deinde exhibitam potionem venae ex hepate ad ventriculũ venientes, vt potẽ aridae totam rapiunt, atq̃ ex his aliae deinceps, donec ad renes perueniat transfusio. Quippe in libris de naturalibus facultatibus dictum est, non solum potionem, verum etiam cibum transsumptione per attractionem facta, per vniuersum corpus

pus deferri. Igitur hæc palsio, quod ad transitus celeritatē pertinet, persimilis est intestinorum læuitati: atq; etiā quod renū passio vetriculi passioni eadem sit. Verum hoc vno inter se differunt, quod quæ ante renes fit lationis actio in naturalibus numeretur, attractoria facultate successionē agēte. Atq; hac ratione inter sese nō nihil differunt: quāuis in vna re similitudo inueniatur, quippe ex concaua vena ad renes attractio, primæ deglutioni eorum, quæ ex ore in ventriculum deferuntur, haud absimilis est.

S C H O L I V M.

διαβήτης dicitur is morbus per quem accidit fitis inexhausta, & mictus celeri impermutati potus, à verbo *διαβαίνειν*, id est trāsire, quasi transitus potus. Dicitur ob aliud Symptoma *διψακός*, à verbo *διψᾶν*, id est, sitire, quasi siticulofus morbus. Hydrops quoq; matellæ vocatur, ob similitudinē cum hydrope vera, infert enim vtraq; sitim, quā potus copiosus non sedat, sed auget. In vera quidem hydrope, quia aqua epota falsum saporem comparat
putre-

putrescens, in diabete, quia præ debilitate retētrici-
cis è renibus defluit in vesicam aqua, illi rursus a-
rescentes trahunt è ventriculo, sitq; ita sitis, & po-
tus rapitur statim in renes, qui copiosior est, cò-
plus grauat, & minus in renibus moratur. Itaque
sitis crescit potu. Nimirum docente Aristotele sect.
3. prob. 21. Nimius potus facit celerem miētum. Hāc
affectionem ad renes præcipuè pertinere, id est in
renibus esse affectionem propriam, in ventriculo,
hepate, & vena caua, & vesica per consensum mul-
tis argumentis probat Gal. quæ omnia vno hoc cō-
tinentur. Sola debilitas retētrici- in renibus est oc-
casio omnium symptomatum, etsi alijs partibus nul-
la propria passio sit. Nam hæc facit ariditatem re-
num, hæc magnum tractum renum. Hepar ergo sic-
catum violenter trahit è vētriculo, qui siccatus ve-
hementer sitit. Debilitas quoq; renum facit descen-
sum vrinæ in vesicam confertim factum. Copiosus
potus grauat vesicam, quæ proinde statim expel-
lit. Quod inquit Gal. hoc loco, vesicam non trahe-
re à renibus, sed tantum recipere, nisi cum quadam
limitatione intelligatur falsum est. Nam capi. 11. lib.
5. de vsu partium ita scriptum est ab ipso Gal. ac ve-
sicarum tunica rectos, & rotundos, & obliquos ha-
bent villos. Vna enim vtriusq; vesicæ tunica cum
sit, ad omnem motus speciem, constructionem ade-
pta est accommodam, siquidem & eum motū, quem
attrahendi gratia villi recti, & eum quem excernē-
di causa transuersi tandem eum quem vt ea etiam
retine-

retineant, vt quæ vndique constricta sunt obliqui efficiunt, instrumenta ipsa habere æquum fuerat. Itaque docet his verbis trahere vesicam longis villis. Sed & alij omnes dissecctores hoc idem confirmant, atq; si nullus diceret, res ipsa indicat vesicæ esse tunicam vnicam triplicibus contextam villis, longis ab intima parte, obliquis ab extima, medijs transuersis. Quid ergo dicendum? Certe trahere. nō-nihil vesicam, id verò multo minoris momenti esse quam vt possit efficere celerem vrinæ descensum ē renibus, qualis per diabetem fit, nisi debilitas re-tentricis in renibus potissimum iuuat. Vbi Gal. inquit, tractoria facultate successione agente. Caue intelligas tractionem fieri successione eius quod euacuatur. Hoc enim in opere de facultatibus naturalibus refutauit Gale. Sed perinde est ac si diceret, facultate attractoria in membris agente, primum in hoc, deinde in illo, successione membrorum.

AT verò actiones quæ hanc antecedūt. Ad vrinæ fluorem propriè pertinent.

Non rectè autem putasse quosdam diabetem veluti caninam cupiditatē ad vē-triculum pertinere, hinc manifestum est.

Nam qui præ nimia siti ventriculum im-pleuerunt, seruare potionem longo tempo

re

re possunt. Sed vehemēti siti laborātes quatuor accidentium periculū à potione subire solent. Vnum, & quidem primum, vomitio est. Alterum, velox per aluum excretio, aut fluore, aut intestinorum læuitate.

Tertium, quod potus diutius, quā par est, in ventriculo manet. Quartum, id ipsum, de quo nunc sermo est, siue id diabetem, siue dysfacon, siue vrinæ fluorem nominare vo-
lueris. Neq; enim vt idoneū ei nomen imponamus, sed vt curationis viam, tūm ex loco patiente, tūm ex ipsa passione inueniamus, scrutari animus est. Atque alia interdum passio occurrit diabeti perquam similis, & quidē à multis cibis, qui nec crudi sunt, nec per aluum deiciuntur, nec plenitudinem efficiunt, nec etiā probè alere possunt, sed citò dissipantur, discutunturq;. Cuius vt crebrior est, quam dysfaci euentus, ita faciliorem admittit curationem, quippe si prius, quam ad summum peruenit

nerit, ipsam cognoueris, haud ita difficulter curabitur. Nam vbi quis duplum consuetorum alimentorum assumpserit, nec corpus ali videatur, idq; citra alui fluorē, hanc passionem non solum priuati, verum etiā medici paruipendunt. Quum verò triplū ingerit idoneis auxiliis liberari potest, priusquam scilicet ad quadruplum, aut quintuplum perueniat. Igitur rationi consentaneū est, hanc passionem, à celeri dissipatione incipere, omnibus partibus attracticem, atq; ei coniugatam facultatem, quæ propria appetentia vocatur, seruantibus. At verò ingētis sitis, quæ citra diabetē accidit, causa est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut vtrāq; intemperie affectus, maximè verò os ipsius. Proximè vētriculō hepar, sed maximè pars eius sima, simul inflāmati mesenterii partibus, & ieiuno, ventriculōque ac stomacho, & pulmone. Atque huius accidētis radix inde plæruncq; proficiscitur, quod à passione

passione erysipelatis naturam referente incenduntur. Quibus ut plurimum marcoris genus aliquod sequitur, aliàs aliud, veluti cum hanc tractaremus materiam, declaratum est. Hęc itaque propter accidentium communicationem, simul cum renū passionibus dicta sunt. Porro diabetes propria renum passio est, quæ caninæ in ore ventriculi cupiditati proportionem respondet, accedente præterea retētricis facultatis imbecillitate. Nam si citra vehementem cupiditatem, ipsam fieri diceremus, nulla omnino insignis urinae copia ad renes perveniret. Si verò citra retētricis facultatis imbecillitatē non tanta celeritate sequeretur urinae profluvium.

S C H O L I V M.

QUORSUM de attractiōe, quā urinae agunt ex vena caua, disputās, inquit, at verò actiōes quæ hanc antecedunt ad urinae fluore propriè pertinent: an quæ antecedunt, pertinent ad urinae fluorem, & quæ sequuntur non pertinent? At verò magis

gis videtur ad illum pertinere emissio vrinae è vesica, quæ illam tractionem sequitur, quâ sitis; quæ antecedit. Certè non dicit, actiones quæ antecedunt pertinet ad vrinae fluxum, quasi, quæ sequuntur non pertinent, sed quod hæc aperte pertinent, de illis est aliquanto magis dubium an pertineant. Id ergo asserit confirmatq; G. confirmationes haud sunt obscuræ. Non erat hic locus disputandi, si quis rectè consideret, de vehementi fame per nimiam dissipationem toto corpore contingentem, nec de siti per consensum cum totis venis, sed ex similitudine symptomaticis cum appetitu naturali præter naturam contingente in renibus, occasionem cepit. Nimirum vt diabetes fit per appetitum naturalem qui nimius est in renibus, ita illa canina fames fit per nimium appetitum eumq; naturalem, toto corpore.

CAP. IIII.

Relectiuncula.

Scribit morbos vesicæ, ischuriam in primis, & stranguariam, & disuriam. Docetq; vt hæc nonnunquam fiant per passionem propriam vesicæ, nonnunquam per consensum cum alijs partibus. Stillicidiū vrinae nonnunquam fit debilitata retentricæ vesicæ, nonnunquam vrina reddita aëri vitio alicuius membri superioris, suppressio vrinae nonnunquam eadem debilitate vesicæ, nonnunquam obstructione viæ, fit etiam nonnunquam inuoluntaria excretio vrinae

vrinæ per læsionem spinæ, in quam sententiam narrat multas historias, deinde dicit quæ partes per vrinam crebro expurgentur, & quæ raro, & horum omnium causas & signa.



VESICAE superueniunt accidētia, partim cæteris communia, veluti omnes ipsius præter naturam tumores, dolores, atq; quæ hos facere possunt, passiones: partim ipsi soli propria, vt ischuria, stranguria, atq; alio quoquo modo immoderata vrinæ excretio. Verùm huiusmodi euacuationes (vt de renibus supra dictum est) vesica, tanquam meatu vtūtur, ipsa haud quaquam patiente. At verò stillicidium, si ob vrinæ acrimoniam fit, accidēs vesicæ est, passio verò minimè. Si verò aut ab vlcere, aut imbecillitate procedit, à vesicæ passione factū esse dicitur: quemadmodum vbi acrimonia in causa est, aliquando ob renum vitium, aliquando ob alias partes, quæ cum vrinis, humorum suorum vitia aut pus, vbi abscessus aliquem infesta-

uerit, transmittere possunt. Euenit etiã interdum vrinæ stillicidium, humoribus, qui in venis sunt, & per renes, & p vesicã expurgatis. Cæterũ quũ ab intemperie vesicafit imbecillior, læditur propria ipsius actio, quæ est vrinæ excretio, ad quam animal excitari solet, cùm vel à multitudine contentæ in ipsa vesica materiæ grauatur, vel à mordacitate conuellitur, ambo verò hæc debiles quam fortes maiori dolore afficiunt. Debilitas autem fit & ob instrumentorum nonnunquam passiones, & ob intēperies, cum alias, tũm ob eas quæ multis sæpius eueniũt, huiusmodi est frigida. Manifestè enim videtur tunc tēporis grauata, & parũ in ipsa humidi est. Atq; vesicæ etiã veluti meiendi instrumento ischuriæ accidens superuenire solet. Interdum quidẽ (vt dictũ est) cùm circa id quod in ipsa continetur, obuolui vehementer non potest, vt ipsum exprimat. Interdum etiam obstructio inferiori meatu,

aut

aut à crassis humoribus, aut impacto lapide. Atq; accidit nonnunquam, vel ab inflammatione, vel alio huiusmodi tumore, ut angustior reddatur meatus, vel etiã omnino obstruatur. At verò nec neruorum à spinali medulla exortorum, neq; etiam ipsius spinalis medullæ pæsiones, vesicæ tantã imbecillitatem afferre possunt, ut vrina, propterea supprimatur, quemadmodum nonnulli putauerunt, credentes vesicæ officiũ à consilio, & electiõe procedere, quod scilicet vrinam retinemus, quoad voluerimus, atque eam pro voluntatis imperio excernimus. Verũ satiũs fuisset nosse non vesicæ, sed meiendi officiũ, veluti etiam deiiciendi, non intestinorum munus ab electiõe, cõsiliõq; pendere. Quippe vesicæ officium vnicum est, obuolutio circum vrinam. At musculus qui vrinæ meatũ in circuitu ambit in origine ceruicis vesicæ positus, instrumentũ est, cuius opus ab electiõe excitatur, ut potè

qui ambiens vesicę ceruicę, eam ita stringit, ut nihil humoris ex vesica in meatū ingredi possit. Atq; similē quoq; & actionē, & utilitatē habet musculus, qui recti intestini partem extremā ambit. Proinde ipsis resolutis neque urinam vesica, nec stercora alius retinere potest, sed præter voluntatē, paucis omnino intervallis utrāq; excernūtur. Itaque veluti in reliquis musculis, quod à resolutione fit nobis inuitis, id electio nostra haud inuita efficere solet: ita eadē ratione ab horū actione quiescimus, cū vel stercus, vel urinam excernere propositū est. Atque ut nonnulli tūm vrinarū, tūm cibi excrementorum deiectionē, totam ab electione procedere existimantes, errauerunt, ita rursus alii his è diuerso, totū hoc opus naturale putantes, à veritate deuiauerunt. Etenim cibi à vētriculo in ieiunū transmissio, tota naturæ opus est. Rursus omnino ab electione pēdet, & utrorūque mēbrorū, siue artū, & cuiuslibet

bet digiti, vt extēſio, tū inflectio. Delatio N. quæ à vētriculo ad ieiunū fit, & quæ ab hoc in tenue inteſtinū, à ſola naturali facultate ꝑcedit. At alui deiectio, & vrinæ redditio, vtroque inſtrumēto ꝑpriis ſuis facultatibus agēte perficiūtur. Rectū inteſtinū, atque veſica naturali vtuntur facultate, muſculi verò, ea, quæ & animalis, & voluntaria nominatur. Quippe muſculi qui fluores cohibere ſolēt, tūm quieſcunt ab opere, abdominis muſculis munere ſuo fungētibus, maxime verò mediis. Sunt nōnulli, qui cū nō ita facilē deiicere poſſunt, manibus huiusmodi muſculos cōprimunt: nec nō vbi vrina ita ſuppreſſa eſt, vt omnino retineatur, idē facere cōſueuerunt. Cū itaq; nerui, per quos animalis facultas ad iā dictos muſculos puenit, patiuntur aut ſpinalis medulla ipſa leſa eſt, reſoluitur muſculorū actio, atque excernitur, & vrina, & ſtercus, vel inuito laborāte. Cū verò veſicę corpus ita labora

uerit, vt quod in ea cōtinetur, exprimere nō possit, supprimitur v̄rina, nominaturq; hoc accidēs ipsius ischuria. Accidit autem & ob difficilē sensum illius fieri nonnunquā sup-
pressionem vrinarum, quin affecta sit excre-
trix facultas. Quū proprii vesicæ nerui
patiantur, qui autē sunt constringentis illius
cervicē musculi, fungūtur suo munere reti-
nentes suā vim, vt cum resoluti sunt. pro-
prium signum est resolutionis huius mus-
culi vrinarum inuoluntaria excretio. Quū
autē sit hęc passio, & via illius obstructa est,
difficile est cognoscere affectiones ambas.
Proinde vt exquisitē dignoscantur, non so-
lum eæ, sed reliquæ quoque omnes vesicæ
passiones, perquam necessarium est præsci-
re euidentes causas extrinsecus aduenientes,
quas p̄priè procatarcticas vocant. Sed mul-
to etiam accuratiori inuestigatione, eas, que
præcesserunt in animantis corpore, passio-
nes inquirere oportet.

Scholium.

QUOD dicit, ambo verò hæc debiles quàm
 fortes maiori dolore afficiunt, cōsideratione
 dignum est. Videtur N. non esse roboris minus sen-
 tire ea quæ offeruntur, quare videntur robusti non
 minus dolere quàm debiles. Sed aut nomine for-
 tium & imbecillium intelligimus pingues & graci-
 les, aut eos qui propriè robusti, aut debiles nuncu-
 pantur, idque aut animali aut naturali facultate.
 Vt cūq; intelligas, debiles magis dolēt ab eadē cau-
 sa quā robusti. Graciles quidē quā pingues, quia sūt
 magis ex carnes. Debiles facultate animali, nō q̄ ma-
 gis sentiant, sed q̄ magis lædantur, ac proinde ma-
 gis eorum sensus contristetur. (Non N. tam est do-
 lor in sensu simpliciter, quam in sensu tristitia: debi-
 les facultate naturali non tam dolent magis, quàm
 læduntur plus, id est, quo homo debiliorem facul-
 tatem naturalem habet in vesica, eo citiùs stillici-
 dium patitur ob copiam, aut acrimoniam vrinæ,
 quia quæ debiliora sunt citiùs, & plus compatiuntur
 cum alijs, quàm quæ fortia. Fit verò omnis in nostris
 instrumentis excretio consensu quodam facultatū,
 naturali scilicet insurgente in id, quòd animalis cū
 molestia fert. Ergo naturalis facultas cū debilis est,
 citiùs consentiet animali quàm robusta. Quæ N. ci-
 tiùs patiuntur, citiùs etiam compatiuntur. Nam cō-
 passio passio quædam est. Constat verò vt passioni
 sint magis opportuna, debilia quàm fortia. Videtur

Gal. hoc loco contraria proferre ijs quæ supra docuit. Nimirum hic dicit. At verò nec nervorum ab spinali medulla, nec ipsius medullæ passiones, vesicæ tantam imbecillitatem asserre possunt, vt vrinæ suppressio accadat. Lib. 1. huius operis cap. penultimo, sæpenumero etiam vbi ab alto quis cecidit, aut vehementem fortémque ictum spina subiit, inflammatio ad plures partes extensa non solum musculis, sed vesicæ quoque noxam intulit, quibus ob vesicæ ipsius passionem vrina suppressitur. Altero horum loco videtur affirmare, posse vrinam suppressi consensu cum spina, & altero negare. Tamē re vera nō facit. Nam primo loco affirmat læsionem spinæ posse suppressionem vrinæ facere, intercepta facultate sentiendi, secundo loco negat posse facere suppressionem asserendo vesicæ debilitatem facultatis, facultatis inquam illius, qua vesica comprimitur exprimens vrinam, nam facultatem illam non accipit vesica per nervos, quare nec privari ea per nervos possit. Accipit verò per nervos sensum, quo læso nervorum principio, privatur. Cessat autem ab expulsionē privata sensu, quia non sentit irritationem. Hanc esse Galeni sententiam intelliges ex ijs, quæ hac ipsa huius capitis parte addit paulò infra dicens, accidit autem & ob difficilem sensum illius fieri nonnunquam suppressionem vrinarum, quia affecta sit excretix facultas.

Igitur

IGITUR cuidam, cum cecidisset, spina
intro sinuata est, quapropter urinam red
dere non potuit. Nā & id aliquando fieri
solet, quemadmodum ab Hippo. dictum
est. Verum non ilico suppressa fuit urina,
sed perendie, ob afflictarum vertebrarum
intro luxationem inflammata vesica. Itaque
dolebat in ea parte vel nemine tangente sed
multo magis, si quis manu eum tangeret.
Atque hunc curauimus inflammationi re-
media adhibētes. Rursus alter luxatis verte-
bris, urinam inuitus profudit, nullo infestan-
te vesicam dolore. In hoc coniecimus eius
musculi neruum, qui vesicam claudit, fuisse
passum, proinde spinalem medullam cura-
re uoluimus. Atque in alio similiter labo-
rante, suppressa fuit urina, torpente ob pa-
tientes nervos vesicæ sensu. Quum itaque
inter dormiendum, non sentiret homo ve-
sicam impleri, ipsa extensa nihil excernere
potuit. Etenim accidit interdum, ut hoc mo-
do

do vrina supprimatur:quemadmodum etiam fanis quibusdam, aut vrgentibus negotiis, vel in concionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio. Tum N. retenta longo tempore vrina extēditur vesica, atque vrina supprimitur, obuolvente ipsam facultate læsa propter immoderatam tensionem. Quidam etiam, cum cecidisset, manente spina illæsa, in primis quidem magnam sanguinis copiam cum vrina emisit, postea verò omnino suppressa est vrina. Cuius rei causam esse coniecimus, quòd concreti sanguinis grumus intus se opposuit. Quocirca dimissa per colē fistula paululū vrinæ reddit, extracta deinde fistula apparuit in ipsius ore grumi indicium. Præterea cum aliorum quosdam diuturni dolores vna cum abscessu suo notis infestassent, finitis abscessibus tamen pus cū vrina profluere visum est, deinde subsequens vrinæ retentio, coniecturam occasionem dedit, quòd à crasso pure meatu

tus

tus obstrueretur. Atque in pueris etiā, quos lapis in vesica cruciabat, vidimus sæpenu-
mero urinam retineri. Eos itaque relupino
figurato corpore, cōculsumus, vt ita à mea
lapis dimoueretur.

SCHOLIUM.

VIDETVR præter eas causas quas Gal. hic re-
fert, conuulsio musculi vesicæ posse esse occa-
sio suppressionis urinæ. Atque ego ita sentio. Tau-
la, qua, cum vesica urinæ (eadem est ratio vesicæ bi-
lis, & intestini, & ventriculi & vteri, & aliorum om-
nium instrumentorum naturæ) plus distēditur, quā
pro sua capacitate, non potest sese contrahere, est,
quod fibræ illius veluti euulsæ sunt, atque earū mo-
tus non potest esse satis firmus, quali ad expressio-
nem opus est. Quod dicit, atque in pueris etiam
quos lapis in vesica cruciabat, vidimus sæpe urinā
retineri, non eo dicit, quod in adultis non faciat ve-
sicæ lapis suppressionem urinæ, sed quod in pueris
crebrius accidat.

QVVM verò id quod iam dicam,
sæpe videritis, oro vt ipsum tenaci-
temper memoria seruetis. Quod
ad

ad grumos vocatos, non solum eos, qui in vesica, sed multo magis illos quoque, qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnumquam continentur, animi defectio, & color pallidus sequi solet, pulsus verò parvus, obsecurus, frequens apparet, & laborans ipse cum anxietate resolvitur: quemadmodum in magnis musculorum vulneribus sæpe numero accidit, ut mirari aliquis possit, quamnam sit huius eventus causa. An sanguis, cum omnium, quæ in corpore sunt, maximè nobis sit familiaris, ex vasis suis effusus, tantum maliauctor est. Nam & putredo partium & mortificatio ipsum sequi solet. Etenim vidimus, ubi vesicæ meatum grûmus obstruxerat, eadem sequi accidentia: grûmum verò adesse coniecimus hoc argumento, quòd plurimum antea cruorem laborantes cum vrina reddidissent. Itaque medicamentum, quòd lapidem terere posset, ex aceto mulso, atque ipsum quoque acetum mulsum

hulsum per se in potu dedimus. At nihilo
minus alii quidem perierunt vno quodam
seruato, solutis grumis, quos paulo post
cum vrina excreuit.

SCHOLIUM.

VIDERI posset hoc loco Galenus, causam red-
dens, qua grumi sanguinis afferunt tam gra-
uia symptomata, fauere quorundam neotericorum
sententiæ, quàm in controuersijs refutauimus pu-
tantium maligniores febres fieri putredine sangui-
nis, quàm aliorum succorũ. Videtur enim innuere,
quòd illi affirmant, sanguinem, eò quòd nostræ na-
turæ maximè familiatis sit, cū degenerat, malignio-
rem fieri. Tamen Gal. non hoc affirmat, cum alijs lo-
cis docuerit, bilem & flauam & atram, quæ sangui-
nis, vstione fit, mitiorem esse alijs generibus, quan-
to sanguis alijs succis benignior est. Quid ergo est,
quòd hic dicit? An sanguis, cum omnium quæ in cor-
pore sunt, maximè nobis sit familiaris, ex vasis suis
effusus tanti mali causa est? Certè sanguis facit cū
extra vasa funditur, maiora mala quàm alij succi,
quia familiaris est nostrorum membrorum naturæ,
non quidem quia familiaris est magis putrescit, sed
quia familiaris est, cum putrescit facit partes com-
putrescere, & omnia membra magis compati fami-
liaritas

liaritas N. patientium maioris compaffionis caufa
 eft, Hinc fit, vt grani fanguinis, membris gangrenã
 fve mortificationem afferant.

QUOD verò non fatis eft ad labo-
 rantis fedis inuentionem, ea dunta-
 xat accidentia, quæ in præfentia in-
 feftant, intueri, fed & ex his quæ præceffe-
 runt, fubinde definimus, facile intelligetis, fi
 eorum, quæ antea vidiffis, memineritis. Igi-
 tur cum multi creberrimè pus cum vrina
 emitterent præteritorum accidentium me-
 moria & fedem patientem nobis oftendit,
 & paffionẽ in ipfa cõfiftentem declarauit.
 Quidam N. cum priùs in regione renũ sæ-
 penumero doletet, accedente inordinato
 horrore, & exiguo rigore, febre correptus
 eft. Alius circa veficæ pofitum fimul cum
 horrore, ac febre, dolores præfenfit. Nõnul-
 li circa feptum tranfuerfum, & thoracem.
 Atque alii in dextra præcordiorum parte.
 Coniecturã itaque fecimus in iis omnibus,
 quòd

quòd pus per renes expurgaretur, vomica scilicet in loco dolente erupta. Cum iudiciis autem supra propositis, nonnihil confert puris quantisatem, & quomodo totum cum urinis misceatur, utrum confusum, an contra, considerare. Veluti iam antea in intestinis dictum est. Nam ut in his si à superioribus intestinis quippiam deferatur, id ciborum excrementis perinde admistum videtur, ac si cum ipsis subactum fuisset: si verò ab humilioribus, cum una ipsorum parte excernitur. Simili modo urina, aut tota à pure cum ipsa emissio conturbatur, aut per partes quasdam dispersum pus inæqualiter defertur. Plerumque etiam solum pus, sine urina excernitur. Idque haud obscurè in vesica suppurationem consistere indicat. Quòd verò exactè commixtum est, à supernis aliunde partibus venit. Sed quòd mediam inter hæc conditionem servauerit, à renibus descendisse certum est.

Y

Similiter

Similiter si erupta vomica, cum patiētis loci indiciis, vlceris quoque signum aliquod appareat. Nam & hoc aliquando quidem exactè comistum videtur, aliquando verò mediocriter: interdum vel nullā habet missionem, vel quodāmodo superfertur, vel solum excernitur. Atque vocata quidē crustula, vlceris: essentia verò proprietas, patiētis partis proprium indicium est. Quippe partes à vesica auulsæ, lamis: è renibus verò, carunculis sunt similes. Ita etiam vbi ex sublimioribus pars aliqua laborat, excrementa cum vrinis reiecta intueri, & ea suspectarum partium essentia comparare oportet.

SCHOLIUM.

QUOD hoc loco dicit Gal. pus purum sine vrina ex vesica solere excerni, videtur pugnare eum sententia quam. 6. cap. quòd libri huius est vltimū scripsit his verbis. Quòd verò à vesica egreditur vrina admistum videtur. Tamen intelligi debet,

bet, quòd modo affirmat, de suppuratione recēs rupta. Nam tunc prodit pus multum & purum, & quòd sine vrina emitti potest, tamen cū multo ante rupta est, minus est iam puris, quàm vt solum ac sine vrina excerni possit. Cole ipso laborante, etiam ex vlcere prodit pus ante vrinam, quia musculus qui est in collo vesicæ, extentus per totum colē est, exprimitq; illum antequam ex vesica vrina affatim prodeat,

IGITUR per vrinam expurgantur gibbæ hepatis partes, atq; omnes quotquot sunt his superiores: per aluum verò pars iecoris resina, intestino, ventriculus, lien. Præter has aliæ quædam fiunt purgationes, sed raro, vt cum thorax, & pulmo per aluum purgatur: quæ sub septo transuerso positæ sunt partes, per vrinas. Quorum causam cum nonnulli ignorent, neque id vnquam accidisse viderint, quòd à multis visum est negant fieri posse vt abscessu in pulmone orto pus per renes excernatur. Nos verò pulmonis vomicam per vrinā, thoracis autem per intestina, & aluum expurgari

Y 2

purgari vidimus. Quanquam re vera de la-
tione ex pulmone in renes nulla omnino si-
dubitatio. Etenim vt à concaua vena, ita ex
magna quoque arteria, rami descendunt ad
renes. Hæc quæstio tamen Erasistrati secta-
tiores non parum vrget, quippe qui puta-
uit solum spiritum in arteriis contineri.
Nobis verò nihil difficultatis adfert, vt po-
te intelligentibus, quòd læuis arteria pulmo-
nis, quantum puris exerupta vomica susci-
pit, id in sinistrum cordis sinum deferre po-
test, quòd inde in magnam ipsius arteriam
incidens per renes transit in vesicam. Hoc
tamen non ita crebro euenire videtur, vt
pote pure prius in asperas arterias magna,
ex parte transsumpto. Itaque quam ob cau-
sam pus in pulmone genitum cum vrinis
(licet rarò) excernatur, iam dictum est.
Id verò, quòd per ventrem purgatur, aliam
& quidem raram (quæ in corporum disse-
ctione apparet) habet causam. Quippe cõ-
caua

caua vena, mediante vase quodam stele-
chieæ vocatæ videtur interdum adaptari.
Proinde nihil mirum, nec impossibile est,
& ex partibus septo transuerso superiori-
bus, pus in ventrem defluere, & ex his, quæ
eidem supponuntur, ipsum per renes in ve-
sicam peruenire. Nam corporum ra-
ros habitus par est, vt rara etiam acciden-
tia sequantur.

SCHOLIUM.

QUA via quauis particula expurgari soleat
seripsi libr. ~~de~~ ^{de} ~~no~~ ^{no} controuersiarum, capite
~~decimo~~. rarum est pulmonem, & thoracem expur-
gari per ventrem, per vrinas non ita. Imò verò par-
tium omnium quæ ad thoracem spectant expurga-
tio per vesicam magis quàm per ventrem sit. Ta-
men cum dicit rarum etiam esse partes, sub septo
transuerso positas expurgari per vrinam, ne intel-
lige de omnibus quæ sub septo sunt, nam gibba he-
patis & renes non aliter expurgantur, sed intellige
his exceptis. Nam hæc veluti in ipsa via vrinæ
sunt, ad quam è ventriculi fundo aut ventre infer-

lib. 8.
cap. 9.

no, aut liene nullus venit furculus venæ, aut arteriæ. Nisi perpaucis quibusdam hominibus quibus venæ cauæ cum aliquo vase stelechiæ (est verò id mesenterium) coit. Qui coitus aditum præstat, & ijs quæ sunt in thorace ad ventrem infernum, & ijs quæ sunt in ventre, aut liene, aut cauo hepatis, in renes.

CAP. V.

Relectiuncula.

De vteri affectionibus hic disputat, in primis de præfocatione vteri quæ frigida passio est, & suppressione menstruum, aut seminis fit, affertque multo grauiora symptomata, cum fit ex semine, vsque adeò vt non possit sæpe distingui ab epoto veneno. Deinde causam reddit retractionis, aut peruerſionis vteri, quæ per hunc morbum fit, refutans de hac re aliorum sententias. Reddit etiam causas, & refert signa suppressionis menstruum, & nimij fluxus, & abortus.



T Q V E ne hoc quidem loco sollicitos esse oportet, vtrum vuluam, an vterum appellemus, eam partē, quæ mulieribus

mulieribus à natura data est. Nec rursus
 vtrum numero plurali vuluas, aut vteros,
 an singulari vuluam, aut vterum quis no-
 minauerit. Etenim satius fuerit in rebus vti-
libus tempus collocare, ex quibus vel ad no-
titiam, vel præfagia, vel curationem fructū
aliquem decerpere possimus. Veluti in ea
 passione, quàm nonnulli vteri suffocatio-
 nem, alii spirationis ob vterum ablatio-
 nem vocant, volentibus medicis vtraque
 appellatione vnam quãdam passionem ex-
 plicare. Ego verò cùm viderim multas
 mulieres hystericas (vt ipse seipsas nomi-
 nant, medicæ quidem primum à quibus
 æquum est illas nomen habuisse) alias sine
 sensu simul, & motu iacentes, debilissi-
 mum simul, & minimum habentes pul-
 sum, aut omnino apparentes sine pulsu,
 alias sentientes, & cum motu, & ratione
 nihil læsa, tamen deficientes animo, & dif-
 ficili respiratione, alias autem contrahen-

*in p. f. u. a.
 v. t. l. i. d. i. g. n.
 p. i. n. a. n. t. u. r.
 e. u. s. e. n. s. u.
 h. e. q. u. i. d. e.
 a. l. i. q. u. a. n. d. o.
 s. e. n. s. u. m. m. o. t. u.
 r. a. t. i. o. n. e. i. l. l. u. r. a.
 p. i. e. n. t. e. a. n. i. m. o.
 d. i. f. f. i. c. i. l. i.
 p. i. e. n. t. e.
 a. l. i. q. u. a. n. d. o.
 m. o. t. u. d. u. m.*

tes artus differentias inuenio histericarum
 passionum esse plures , vel magnitudinis
 efficientis causæ , vel secundum speciem a-
 liquam diuerfas mutuo. Igitur prima spe-
 cies, cuius Heraclides Ponticus in suo com-
 mentario mentionem fecit, multam exi-
 bet de ortu suo ambiguitatem . Ait enim,
 sub hac specie , nec pulsus, nec spiratio-
 nem mulieris depræhendi potuisse . At-
 que ob id duntaxat , non visam esse mor-
 tuam , quòd exiguum in mediis corporis
 partibus calorem haberet. Est autem li-
 brititulus , Apnus Heraclidæ. Ac astantes
 quæque medicos quesuisse ait, an nondum
 esset mortua . Rursus nonnulli Heracli-
 dæ posteriores credentes seruari aliquid spi-
 rationis, quamuis ipsa non appareat, carptæ
 lanæ flocculos coram naribus suspendi iu-
 bent, vt exactè depræhendatur, num spi-
 ritus aliquis inter spirandum , tùm intro,
 tùm foras, rursus deferatur. Sunt qui
 poculum

*ma perual
 l' Calori n
 mortua.*

*modo Cognos
 l' antituit
 Herian*

poculum aquæ plenum ori ventriculi imponere præcipiunt, quippe immotum omnino seruari humorem aiunt, si tota perierit spiratio. Itaque si omnes ita laborantes mulieres interiissent, simplex esset quaestio: cum verò nonnullæ seruatae videantur, geminam oriri quaestionem necesse est, inuelligantibus nobis tum passionem, ob quâ spirationis munus deperditur, tum vel magis, quomodo viuere possint, quæ nihil omnino spirant, Quippe in confesso est, & spirationem à vita, & vitam à spiratione se parari non posse, adeò vt viuentem nō spirare & spirantem non viuere, sit impossibile. Atque hæc quaestio, quanquam superiore difficilius videtur, non est tamen perinde difficilis. Quippe facillè sustinebitur, si latebris inclusa animalia consideres, nulla apparete in ipsis spiratiōis nota. Hoc enim cognito perspectisque animalibus, vt potè frigidis, atque eo demonstrato quod ma-

*quomodo
intelliget
scilicet*

ximus respirationis vsus est vt intimus calor, & refrigeratione, & ventilatione seruetur, haud ita difficile fuerit perpendere, exiguum illum calorē in ipsis derelictum, arteriarum, cordisque officio conseruari.

Quæ actio à quibusdam medicis perspiratio, veluti ea, quæ à thoracis, pulmonisq; officio prodit, respiratio vocatur. Itaque in vterisuffocatione, quoniã vniuersum corpus refrigeratur, (id enim manifestè videtur) fieri potest, vt nulla prodeat ab ore spiratio, quamuis ea quæ in arteriis sit, nequaquam intercipiatur. Quin & adeò potest esse exigua, vt sensum omnino effugiat.

S C H O L I V M.

MEDICAS mulieres vocat obstetrices. Ex ea historia quam refert ex Heraclide polysis aperte colligere, non statim ac pulsus & respiratio sensum omnino effugiunt, putandum esse mortuum esse hominem, si modo calor quispiam per totum cor

ut sent. lib. 3. trac. 5. cap. 12. ait: quod si per totum corpus cultura eius qui est induratus vltimè 12 horas, in cuius dno air Leniti se videtur quoniam apoplethia potest ad legem hanc qui mortuus est, ex ista videtur: sed Iacobus de galien. ait: id multo huius practica vltimè circa apoplethia, sed amia igitur, huiusmodi illud videtur huiusmodi. Hic est John

pulsu. At. Imò verò cenſco non prius aſſirmandum eſſe animum euolaſſe, in ijs præcipue qui repẽtino caſu intercipiuntur, quam totum corpus æqualiter frigidum, liuensq; ſit. Quanquam cùm ſemel reſpiratione, & pulſu videntur carere, nulla ſpes eſt fore vt reuiuifcant, retinendi tamen homines ſunt ne humo condantur viuentes adhuc. Quod ad primam quæſtiunculam, quàm Gal. mouet, attinet, ita ſentiendum eſt, ſi nomine ſpirationis intelligatur omnis ventilatio, verũ eſt non poſſe hominẽ nõ ſpiratẽ viuere. Tamẽ ſi intelligatur ſola reſpiratio, nõ eſt omnino verũ, ſed quadam expoſitione indiget. Nã animal q̃ viuut, non poteſt non habere pulſum, etſi poſſit tam exiguum habere, vt omnino ſentiri non poſſit. Nam cum ad eam intemperiem cor venerit vt ne tantilum moueatur, proculdubio homo perierit, tamen reſpiratione poteſt omnino carere aliquantulo tempore, præcipue cùm præ frigido affectu ceſſat à reſpiratione, quod in hyſtericis accidit, & in apoplexia fieri poſſe, ſupra monuimus.

quando totus
est equus
filius & liuus
et mortuus

ſine aliqua
filiis in ſol
uere anima
Ergo ſi reſpiratio
in ſol
flexis vide
krix in ſol
apoplexia
27.2. G
Cuius lib. 1.
di. prim. ſit.
65.

ERGO vt nihil ad hanc paſſionem maneat indiſcuſſum, ſuccedit iterum alia quæſtio, quam ob cauſam corpus refrigeretur. Ea verò haud difficulter diſſolui poterit, ſi cauſas, quæ præceſſerunt, diligẽter

quasi reſpiratio
filius in ſol
ſuffocatus ſit
ca. 2

ter intueamur. Sunt autem huiusmodi: cõ-
 uenit inter omnes medicos, hanc passionẽ
 magna ex parte viduis euenire, iis que maxi-
 mẽ, quæ cùm antea probè purgarentur, ac
 parerent, atque virorum concubitu gaude-
 rent, iis omnibus priuantur. Quid igitur ex
 iis quis probabilius coniicere possit, quam
 quod ob retenta menstrua, vel semen cohi-
 bitum, huiusmodi mulieres vteri passioni-
 bus crucientur: siue interceptæ spirationes,
 siue suffocationes, siue etiã cõtractiones sit.
 Idq; fortasse magis à femine retẽto cõtinge-
 re potest, vt pctẽ magnã vim obtinẽte. Vt
 est enim in mulieribus humidius, ita etiã fri-
 gidius, proinde ipsum excerni oportet, præ-
 sertim si naturaliter multo semine exube-
 rat mulier. Proinde in mulieribus, quæ mul-
 to semine abudat, id excerni postulat, haud
 secus atque in viris: quippe non parua est
 etiam horum differentia. Sunt enim nōnul-
 li, quos protinus à iuuentute cõcubitus im-
 becilio-

*Ho actio caat
 et est. Semini
 nentur*

becilliores efficit. Alii, nisi assidue coëant, ca- *inmoderate*
 pitis grauitate molestantur, cibos fastidiunt, *hinc est*
 ac febribus obnoxii fiunt, atque ut deterior est
 ipsis appetentia, ita & concoctio minor.
 Hos Plato arboribus immodicè fructiferis
 comparat. Equidem noui quosdam, quibus
 huiusmodi erat natura, qui per exercitii in-
 stituto à libidinis usu abstinentes, torpidi,
 pigrique ad motum facti sunt: nonnulli e-
 tiam melancholicorum exemplo, præter
 modum mæsti, ac timidi, cibi etiam tum
 cupiditate, tum concoctione vitia. Qui-
 dam uxoris mortem lugens, & à concubitu
 quo antea creberrimè fuerat usus, abstinens,
 cibi cupiditatem amisit, atque ne exiguum
 quidem cibum concoquere potuit. Vbi
 verò plus cibi ingerebat, protinus ad vo-
 mitum excitabatur: mæstus etiam appare-
 bat, non solum has ob causas, sed etiam (ut
 melancholici solent) citra manifestam accu-
 sationem. Verùm hic ad pristinam consue-
 tudinem

rudinem rediens, quàm celerrimè liberatus est. Hæc ergo cōsiderāti mihi apud me ipsum, visum est longè maiorem ex retēto semine, quàm menstruis, corporis noxam euenire posse præsertim in his, quibus suapte natura magis vitiatum id ipsum est, ac redundans, atq; in his qui in otio degūt, qui- que cum antea nihil ad libidinem reliqui fecissent, affatim continere ceperunt. Equidem perpendi in hiis naturalem excernendi ipsum cupiditatem huius rei causam esse.

*semine cōsiderati
entis sumus
qui indulxit
voluptati
ut euitaret
eg, quæ a se
semine
atur.*

Quum enim & tale, & tantum fuerit, neminem non ad sui excretionem vi quadam stimulat. Itaq; Diogenem cynicum narrāt, virum alioqui omnium mortalium, quod ad continentiam pertinet, constantissimum libidini tamen indulgisse, non à copulata illi euacuationis voluptate veluti bono aliquo illectum, sed vt noxam, quæ à retento semine prouenire solet, euitaret. Eum meretrix adire pollicita, cū diutius cessaret, ipse manu

manu pudendis admotâ, semen proiecit, ac
venientem deinde mulierculam remisit, in-
quiens, manus hymenæum celebrando te
præuenit. At planè constat modestos viros
non ob voluptatem, sed ut à vexatione li-
berentur, libidini indulgere, perinde ac si
nulla esset ei voluptas coniugata. Sic etiam
reliqua animalia ad coitum excitari arbi-
tror, non quod existiment voluptatem bo-
ni cuiuspiam speciem præ se ferre, sed ut se-
men, quod ob retentionem ipsa molestat,
excernant, haud secùs, quam deiiciendi ster-
coris, excernendæque urinæ desiderio sua-
pte natura moueri consueuerunt.

SCHOLIUM.

GAL. ob retentum sanguinem aut semen fieri
vteri prefocacionem rectè docet, tamen qua
causa ea retentio frigus faciat, oportet dicere cla-
riùs. Retentus sanguis affatim occludens venas & ar-
terias vteri obstruit sibi ipsi viam spirituum, facta
ergo spirituum interceptione statim refrigeratur,
densaturque sanguis, semen quoque frigidum est sub
iecto

iecto, & substantia sua. Calorē enim & generādi vim habet per spiritus, ergo ex halante ab eo spiritu frigidum manet, quare continui alteratione frigescit. Accedit quod & sanguis & semen cū detinentur, putrescūt, atq; adeo malignē, semē præcipuē, ex eo ergo ascendunt in cor maligni vapores, qui spirituum vitalium temperiem exoluunt, dissipantq; ita innatum calidum, fitq; ita frigus. Hi pravi vapores asserre possunt tentantes caput melācholiæ accidentia, non in mulieribus solum, sed in viris, in illis per consensum cum vtero, in his cum vasis seminarijs, & tentantes os ventriculi, fastidium. Quod de Diogene refert Gale. à vera christianorum religione est alienissimum. Vocat enim hominē quod ad continentiam pertinet constantissimum, eū qui semen in terram fundendo, vel in ipsam naturam incontinenter peccauit. Nec verò licet quancunq; molestiam vtcunque deuitare, sed vt recta ratio dicat. Verum hoc theologi possunt demonstrare nobis, vel ipsa rei turpitudine hoc ita habere indicat. Iam verò non intelligo vnde coniectet Gale. bruta non allici voluptatis desiderio ad libidinem. sed vrgeri tantum irritatione. Quod quidem equus nondum venerem expertus, irritetur multitudine, aut acrimonia, verisimile est, voluptate enim nondum est potitus. sed post modum quis prohibet illū voluptatis recordatioue permoueri? an non equus, qui quietus, ac non lasciuiens vagabatur solus equam intuens hinnit statim, lasciuit, irruiquē in illam?

Quid

Quid ergo auxit equa illi semen aut femini acrimoniam? non arbitror, sed voluptatis recordationem effecit. Certè nisi voluptas bruta ad coitum prouocat, frustra est eis voluptatis illius maximæ & insignis occasio à natura tributa. Fallitur ergo hoc loco Ga. multis modis. Sed quoniam tota hæc disputatio sordida est, de his hætenus.

COGITANTI itaque mihi Super hac re, tale quoddã accidens apparuit in muliere ex longo iam tẽpore vidua quæ præter cætera mala, neruorũ quoq; distentione vexabatur. Ac dicẽte obstetrice, vterũ esse retractum, remediis ad huiusmodi passiones cõsuetis vti decreuit. Quibus adhibitis, partim ob ipsorũ calorẽ, partim etiã quod intercuradũ manibustraheretur partes muliebres, oborta titillatione, cum labore & voluptate, veluti per coitum vsu venire solet, excreuit crassum, plurimũq; semen, atq; ita à molestia sua liberata est mulier. Proinde manifesta coniectura assequutus sum, vitiato femini, maiorẽ quam mēstruis esse vim ad noxam vniuerso corpori

Z inferen-

inferendam. Itaq; licet hæc quidem aliquādo profluāt ē viduis ſuppreſſum nihilominus ſemen moleſtiam, noxām q; ipsis inferre poteſt. Quibus verò nequāquam perſuaderi poteſt, exiguum ſuccū in vna parte cōtentum, tantorū accidentium, quæ vniuerſo corpori eueniunt, eſſe cauſam, ii omnino immemores eſſe videntur eorum, quæ quotidie contingunt. Etenim à phalāgii ictu totum corpus pati videtur, exiguo veneno per minimū foramen iniecto. Sed lōge maiori admiratiōe dignus eſt ſcorpionis ictuſ, quod breui admodū tempore grauiffima infert accidētia: quippe cū ſeſe applicat, aut perquā exiguū eſt id, quod iniicitur, aut nihil omnino, nullo apparente foramine in ipſius aculeo. Atqui fieri nō poteſt, cū primum quis, perinde quaſi ab acu, pūctus eſt, vt vniuerſum corpus veluti grandine percuti videatur, animi ſimul defectione accedente. Nam rationi magis conſentaneū eſt,

vt

vt vel à spiritu quodā, vel tenui humiditate iniecta hæc eueniant accidentia. Sunt qui putant, res quasdā solo tactu, per qualitatis vim, ea quæ eis vicina sunt, alterare posse: idque plane videri in marina torpedine, vt pote cui tam vehemens sit potentia, vt per piscatoirs tridentem transmissa ad manum alteratione, de repente totam reddat torpidam. His coniecturis facilè deprehenditur parux molis res quasdam, solo tactu, maximas inducere alterationes. Id quod in Heraclio quoque lapide, quem magnetem nominant, videre est. Ferrum enim quod tetigerit, ei adhæret, vel nullo adhibito vinculo. Deinde si aliud, id, quod primotactū fuerit, tetigerit, similiter vt primum illi inhærebit. Postea tertium secundo: ita vt planè constet, rebus quibusdam vehemētissimas esse vires. Reliquum est vt inuestigemus, an in animantibus corruptio aliqua nasci possit tanta, vt venenitūm qualitatem, tūm vi

res equet: an id iam à medicis enodatū, discussumque esse videtur, qui hanc solēt proponere quæstionem, vtrum propriè sint notæ veneni, nec ne. Nam, qui de hac quæstione melius disputasse videntur, ii easdem fieri passiones concedunt, & à letalis veneni potione, & corruptione, quæ è corpore ortum habet: non tamen eas discerni nō posse, qui venenum sumpserint, ab iis, qui aliunde passi sint. Quum enim homo suapte natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, de repente moritur, (vt lethali assumpto veneno fieri solet) dein de corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium est, aut diffluēs, aut præ putredine fædum, molestumque reddit odorem, hunc venenum sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi passionibus nos infestari fateamur, quæ ex nobismetipsis accepto suæ originis impetu, similes sint, his, quæ pernicioso epoto veneno eueniunt: nihil mirum, si vitiatum semen

signa Veneni

semen, aut menstruum huiusmodi, cum retinetur, & putrescit, corporibus vt afficiantur idoneis, graua inferat accidentia. Quippe facilè intelligitur in canibus, quantam habeat vim afficiendę rei aptitudo. Quum enim reliquorum animalium nullum rabie capiatur, solus canis ea passione corripiatur, atque tanta fit in ipso humorũ corruptio, vt sola eius saliuā, si humanũ corpus contigerit, rabiem excitare possit. Vt igitur ab exiguo initio, saliuę videlicet qualitate, aucta quędam in corpore passio, quādo ad magnitudinem notatu dignam peruenit, discerni potest, idq; post sex mēses, cū nōnunquam ante id tempus nulla nota depræhendatur: sic eodem modo vitioso humore in animalis corpore genito paulatim tractu temporis, principalium partium aliqua consentit, à qua deinde vniuersum corpus celeriter alteratur. Quod aut à priscis iam inde seculis optimo iure creditum

fuerit, hysterica dicta accidentia, ad vterum
 tamquam ad radicem pertinere, vel maximo
 argumento esse potest. quod & solis viduis
 & iis, quibus menstrua supprimuntur, huius-
 modi passiones euenire collueuerunt. Quod
 verò ad eas excitandos retentum semine ma-
 iorem, menstruum verò minorem vim obti-
 neat, facile intelligitur ab his mulieribus,
 quibus, cum non sint vidue, purgationes sup-
 primuntur. Quamuis enim pluribus infesten-
 tur accidentibus quæ posthac dicentur, spi-
 ratione tamen non priuatur, nec animi defe-
 ctione, neque aliis quoque accidentibus, quæ pau-
 lò antea dicta sunt, laborare videtur. Prete-
 rea ex eo quod sunt viduæ quedam quæ licet eque
 ut antea, aut paulò minus purgentur, nihilomi-
 nus similibus corripiuntur accidentibus. Quip-
 pe medicæ quæ eas exquisitè tetigerunt, faten-
 tur circa vterum notas quasdam apparere. Nam
 ceruix eius inclinata videtur, interdum quidem
 veluti sursum retractus sit totus vterus, interdum
 verò veluti ad latus trahatur.

Scho-

QUANDO QUIDEM feminis effusionē gra-
uissimā vteri mala solere soluere experimēto
sentimus, cōstat in ijs, quas probabile est retētione
feminis laborare, vt virginibus & viduis, optimam
curā di rationē esse aut cōtractatione, aut pessis suc-
cis idoneis intinctis, aut afflictu moliri voluptatem
& femini effusionē. Tamē nō licet nobis, quos in sā-
cta religione Christi gratia retinet, id aliqua ratio-
ne moliri. Non N. licet illas vel p̄ vita ipsa (quantū
intelligo) ad libidinē & turpē voluptatē prouocare
Certē licet alia ratione feminis consumptionē pro-
curare, sunt N. res quādā quæ illud optimē assumūt,
in quibus est imprimis ruta, vtcūq; ea vtaris. Sentē-
tia, quā modo refert, dicēs, sunt qui putāt solo tactu
res quasdā per qualitatis vim, ea quę eis vicina sunt
alterare posse: est sentētia Pelopis, quā 3. lib. retulit,
diximusq; eo loco nō parū esse p̄babilē. Certe posse
in nobis succos ad eā corruptionē venire, vt vene-
nis euadāt similes, inferāntq; omnino eadē sympto-
mata, quæ epotū venenū, idq; cū alijs succis accide-
re possit, maximē accidere retento femini verissi-
mū est, vsq; adeo vt nisi antecedētiū & externarum
quarundā rerū ratio habeatur, nullatenus dijudica-
ri possit, an venenū quis biberit, eorū qui cū grauif-
simis symptomatis repētē moriuntur. Nā q̄ ad inter-
nam causam attinet, nihil malitię nō potest interius
cōparare, si modo corpus paratū est. Sed est vnica

ratio medica cōiectādi, an homo venenū acceperit ex hominis tēperie, & ex victu, quo hucusq; vtebatur. Nā si homo bona tēperie & bonay aletudinde fruēs repētē moriatur, cū grauissimis symptomatis, ac mortui corp⁹ liuidū aut nigrū totū aut cū vibi-
cibus siue alijs partibus liuidū alijs nigrū (nā hoc est quod dicitur rarū) siue diffluēs, i. verū quāq; fluxionē patiēs, vt si fluāt simul mult⁹ sudor & sanguis ē naribus, & succi multi de vētre (hæc omnia facit debilitas facutatis naturalis) & grauitè olēs & fædū, certē venenū accepisse magna cōiectura est, sed si mulier aliqua earum quę venere priuantur, & cui menstrua male fluebāt, & prauis erat succis & præ appetitus corruptiōe, & præ imprudētia cibis mali succi semper vtebatur, & vteri affectibus ac vētriciuli sæpe laborauerat, ita intereat, ego quidē hanc venenum accepisse nūquā suspicabor. Est alia ratio cōiectādi ciuilis magis quā medica, spectat N. ad iudicē magis quā ad medicū, ex cōditione quarūdā rerū externarū, quæ pēdet ex locis, & personis, & factis, & verbis. Sed hūc locū hi tractent ad quos spectat. Rabies species quædā est manię aut furoris, quæ laborātes aquā reformidāt. Hæc canes solū corripere, verū nō est, nisi intelligas primū ac sine alterius cōpassiōe. Nā homines à canibus demorsos in hunc affectū trahi ipsemet affirmat. Sed etsi intelligas, primario, videtur omnino sine exceptionib⁹ trāsigi nō posse. Nā Arist. 8. de part. ani. ca. 22. camelū rabie laborare dicit. Itaq; intelligendū arbitror, solos fere canes atq; eos maximè rabie corripī. Proin-

PROINDE quidam vterum veluti animal esse statuentes, quòd creandæ prolis gratia mouetur, si priuetur his, quæ concupiscit, vniuerso corpori nocere dicunt. Qua de re Platonem ita scripsisse comperimus: ea pars, quæ in mulieribus, & vterus, & vulua nominatur, cùm sit animal prolem generare cupiens, si intempestiue, diuque infructuosum fuerit, succensens ægre fert, errasque per totum corpus & spiritus meatum obstruens, respirareque non sinens, in extremam anxietatem deicit, atque multos alios morbos excitat. Hæc dicente Platone, quidam addiderunt, quòd postea quã ita per corpus vterus errauerit, ad septum transuersum perueniens, respirationem impedire solet. Alii errare ipsum veluti animal negantes, vbi suppræssa sunt mēstrua, & exiccarri aiunt, deinde humectari cupientem, ad viscera vsque ascendere: cùm verò ascendendo nonnunquam septum transuer

Z s sum

sum cōtingat, idcirco animal spiratione priuari. Etenim qui ignorant ea, quæ in dissectionibus apparent, qui quæ nec naturales, nec à voluntate pendentes actiones vnquã considerauerunt, quamuis ea, que iam diximus, nulla audiant demonstratione roborari, fieri tamen posse arbitrantur vt aliquid ex ipsis à veritate nequaquam abhorreat.

At verò qui in vtriusque fuerint exercitati, hanc rationem, vt pote infirmam, vel metacente, despiciunt. Nam si aliquid vteri ascendere videatur, id perexiguum est, nec sufficit ad hoc, vt totum ipsius fundum, ne ad ventriculum quidem ascendisse ostendat, tantum abest, vt hunc prætereundo, ad septum transversum pertingere possit.

Quòd si detur etiam vt attingat, quid momenti habebit, vt spirationem tollere, aut animi defectionem, aut membrorum contractionem, aut integrum soporem, inducere possit? Etenim cum aliquis se impleuerit,

ventriculus

ventriculus intumescens, planè videtur septum transuersum comprimere, atque hãc ob rem spiratio redditur crebrior, sed nullo insuper alio accidente animal infestatur.

Atque prægnatibus quoque vterus adeò intenditur, vt crebrior fiat spiratio, sed neque hic aliam lëtionem inducat. Id autè, quòd dicunt, exiccatos vteros humoris desiderio ad viscera ascendere, nemini non absurdum videri potest. Si N. absolute humorem vterus requirit, vesicam, atque crassi intestini partem inferiorem, totam sibi proximam habet. Si verò non simpliciter humorem desiderat, ad hepar potius, quàm ad septum transuersum, ipsum moueri oportebat. At verò quid opus est vt aliis extrinsecus irruat partibus, cum densum tegmẽ, membranolum indumentum, sibi ipsi circumdatum habeat? Omnia N. quæ ad sècè humorem ex intestinis attrahunt, per ora quamplurima id efficere solèt. Atqui ad vterum multa

ta admodum venarum òra perueniunt per
 quas ex concaua vena, vt pote cui ex hepate
 sanguis influit, sanguinem attrahere potest.
 Etenim quam aliam fistulam hac insignio-
 rem quis inuenerit, qua ex hepate in vterũ
 sanguis deferatur, aut per quam aliam om-
 nino vterus ex iecore quippiam attrahere
 possit? quòd si hunc concauæ venæ riuum
 non maximum, saltem non alium esse fa-
 teamur oportet: quippe sola hæc vna par-
 tibus sub transfuerso septo constitutis ex he-
 pate defert sanguinem. Absurda igitur om-
 nino est illorum ratio, cùm hoc, quòd vte-
 rum esse animal, hac ratione astruere viden-
 tur, sed si hoc ipsis concedatur, ergo ægrè fe-
 ret vterus priuari se eo, quòd concupiscit,
 fortasse autem & sine nutritione tabescet,
 vt quidam dicunt amantes phænices pati.
 Verùm ob hoc nec ad septum tráfuerfum,
 nec ad alium quemuis locum perueniet.
 Nam vt cætera omittamus, perquam arida
 est

est septi transuersi temperies, atqui vterus iuxta illorum placita, qui ipsum exiccare dicunt, humidarum partium communicatione indiget. Sed interrogaueris fortasse, quâ ob causam modo sursum, modo in latus retrahi vterus videatur. Id N. obstetrices aiunt. Aut cur ipso in sua sede sæpenumero manente, nihilominus mulieres quædã ab hysteriis accidentibus corripiantur. Equidem huius rei causam explicare tentabo, ea quæ ab Hippo. dicta sunt, intuendo. Nam simul cum vtero, cervicem quoque ipsius retrahi necesse est.

S C H O L I V M.

SA T I S multis argumentis, & satis dilucide refutat Gal. sententiam Platonis de vteri natura, putantis illum vt animal quodpiam per corpus vagari, & sententias aliorum qui affirmant eum humoris gratia septum trãsuerfum petere. Quare hæc argumenta non videntur mihi indigere illustratione, sed attentione & iudicio lectoris. Phœnices tam incontinententer amabant, vt, cum potiri votis non possent,

possent, præ tedio arescerent sine cibo. Huc respiciens dicit Gal. atque fortasse non nutrietur, ut quidam dicunt amantes phœnices pati.

SUPEREST ergo ut declaremus, quæ ob causam vterus vel sursum, vel ad latum retrahatur. Hoc enim huic sermoni deerat. Ea esse censetur vasorum ad ipsum peruenientium plenitudo, vna cum appendicibus ipsorum. Etenim ostendimus in enarratione eius aphorismi, quo inquit, conuulsionem & à plenitudine fieri, & euacuatione, quòd plenitudo repletorum corpora & in latum, & profundum extendit, sed longitudinem abbreviat. Ergo quo efficiuntur breuiora, eo magis ad originem retrahuntur. Nam Erasistratus musculos quoque, si spiritu impleantur, in latitudine augeri in longitudine verò minui, atque ob id retrahi dicit. Vnde ergo oritur plenitudo tum vena- rum tum appendicum? Nempe ex retentione menstruorum. Nam peruenit quidē ad

ad vterum sanguis, sed ad interna ipsius ingredi non potest, aut quia est crassior, quam ut per ora vasorū possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. Itaque multiplicatus in venis, eas extendit, atque vicinis ipsis appendices madefacit: ad horum autem extensionem, continuo vterum retrahi necesse est. Igitur si æqualiter vndique trahatur, recta erit, sine inclinatione, ipsius transmutatio: si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem extenditur. Non ergo veluti animal errabundum, alias ad alium locum, discurrit in mulieribus vterus, sed ab extensione retrahitur. Quòd si dixerit quispiam vteri corpus tū non pati, sed peruersione laborare, cum alias aliorum trahitur, hic haud absurda dicere videbitur. Nam circa reliquas quoque corporis partes accidit, ut huiusmodi appareant passionnes, & ut sæpenumero decipiantur medici, qui peruersam partem, quia vel incuruari, vel

vel extendi non possit, arbitrantur laborare. Atque hoc docuit Hippo. in eo libro, quem de articulis scripsit, ubi etiam de utrius vocato errore mentionem fecit, ita scribens: si in posteriorem partem caput femoris exciderit, quanquam hoc raro fit, extendi non potest crus, neque adeo secundum luxatum articulum, neque adeo secundum maleolum quoque, iique minimè ubi longo spacio durauerit malum, vel inguinis, vel maleoli articulum extendere possunt. Hoc sermone quamuis maleoli articulus, haudquaquam laboret, quia tamen cum inguine communicat, ipsum extendi non posse ait. Atque deinceps subiungens inquit, sanè animaduvertere hoc oportet. Vt N. utile est, ita magna est ipsius habenda ratio.

Quamuis non paucos lateat, quòd ne fani quidem extendere possunt maleoli articulum, non extenso inguinis articulo, nisi sursum ieuato pede. Ita enim possunt. Neque
etiam

etiam similiter, sed longe maiori cum difficultate flectere possunt maleoli articulum, nisi simul flectant articulum inguinis. His dictis deinceps ait, multa alia quoque iis haud dissimilia in corpore inueniuntur & secundum neruorum distentionem, & musculorum figuras. Quinetiam plurima notatu fortasse digniora, quàm quis putauerit, contingere solent, & secundum intestinorum naturam, & vniuersum ventriculum, atque vteri tum errores, tum extensiones. His verbis Hippocrates de maleoli articulo dicere proposuerat, non potente secundum naturam moueri, idque non ob propriam ipsius passionem, sed quia coxæ consentit. Quinetiam extensionum, quæ vtero accidunt, mentionem fecit: cum videlicet ipse non per se eransmutatur, sed à quibusdam aliis trahitur. Igitur vteri peruersiones, eo quem diximus modo, ad suppressa sequuntur men-

strua : eas tamen ob hoc, accidentium, quæ
 in animalis corpore apparent, causas esse
 nequaquam putandum est. Quippe quæ
 communem habent causam, plenitudinem
 suppressa menstruorum purgatione eue-
 nientem. Quæ verò citra peruersionem,
 aut menstruorum retentionem, viduas mo-
 lestant noxæ, hæ ob retentum semen eueni-
 re putantur. Cæterum pro multitudinis,
 qualitatisque ratione, tum menstruorum, tum
 feminis, aliàs aliæ accidentium species ori-
 ri solent. Etenim affligente causâ vniuer-
 sum corpus refrigerare potente, adeò ve-
 hementer infrigidatur corpus, vt & spira-
 tio, & arteriarum pulsus, sensu depræhen-
 di nequeant. Quæ si vel crassa fuit, vel a-
 cris, conuulsiones : si verò atræ bilis naturâ
 habuerit, mæstitiam inducet: quemadmo-
 dum animi quoque defectiones, & ad for-
 tes extensiones, & perfrigerationes & sto-
 machi afflictiones sequi consueuerunt.

Constat

Constat; autem quòd in huiusmodi sermonibus os ventriculi stomachum solemus appellare. Quippe omnium medicorum mos est, in sincopa stomachica huiusmodi vti appellatione.

SCHOLIUM.

GALENVS plenitudinem appendicum vteri affirmat efficere vteri peruerfionem, si plenitudo altero latere fiat, aut retractionem, si ambobus, non aliter ac membrorum conuulfiones fiunt. Ego verò aliam quoque esse causam arbitror in ipsa vteri natura, quòd is retractus videatur. Nimirum, non aliter ac virile membrum tentiginem pati natum est, & intēditur. Quum ergo mulier veneris cupida eà priuatur, retentione, & titilatione feminis patitur tentiginem, & intumescit Vterus, videturq; sursum repere, non aliter ac si virile membrum intra corpus intumesceret, id verò apertè declarat, quòd ita affectis sæpe succurritur frictione quadā leui, & admota manu, quia semen erumpit, & cessat tumor vteri. Quòd de articulo femoris & maleo li affert ex libello de articulis, non aliorsum affert, quàm vt exemplo declarat non esse mirum hanc v-

teri passionem fieri posse citra vteri propriū morbum; sed per distentionem acetabulorum. Nimirū vt articulus maleoli non potest moueri immoto articulo femoris, ac proinde luxato, aut quauis alia de causa articulo femoris moueri non potente, sit alius immobilis. Causa huius rei in ipsa ossium compositione consistit, licetq; cuius contemplari, & in seipso & in scheleto. Constat ex dictis non esse viduas iuniores potissimum tutas ab vteri retractione, nam & si semen non faciat acetabula tumere, (Neque N. tanta eius est copia) facit tamen tentiginem. Quod ad reliqua, quæ de causis aliorum accidentium dicit, attinet, constat eum loqui de conuulsione nomine latiuscule accepto vt significet nō tantum veram conuulsionem: sed & conuulsioni similes motus. Nam inquit, si crassa fuerit & acris, cōuulsiones facit. Cōstat verò vt crassa causa & acris non pariat eundem affectum. Sed crassities distentione potest conuulsionem veram, acrimonia, irritatione conuulsioni similes motus facere.

PORRO' accidentia, quæ ob adstricta menstrua infestare solent. (Nam de iis quoque nonnihil me dicturum pollicitus sum) nunc enarrare agredior, sumpto initio ab his quæ ab Hipp. in apho. scripta

pta sunt, præcipuè verò cum dicit, si mulier nec prægnans, nec puerpera lac habet, menstrua eius defecerunt. At nullo in mammis apparente lacte, menstrua suppressa hisce notis depræhenduntur: grauitas totum corpus molestat, item fastidium quoque, ut nulla sit cibi cupiditas horror inæqualis. Quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, cupiátque mulier quædam aliena, iube ut obstetrix vteri cervicem tangat. Nam si citra duritiem clausa inueniatur, eam pregnantem esse coniicies. Ex iis nonnullæ cibum præterea euomunt, ac terram, aut extinctos carbones, aut alia quædam huiusmodi edunt. Si verò clausum fuerit os cervicis vteri, ac duritiem quoque habeat, passionem aliquam in vtero esse portendit. Oportet itaque speculari obstetricem, ad quam partem, vel declinet, vel trahatur: nam in ea parte patientem vteri sedem esse coniiciendum est. Atque in quibusdam

Aa 3 buldam

busdam fœminis, eius partis dolor cum gravitate, non nihil significare potest. Quinetiâ in coxam dolor trãsit, ac crus ipsum, quod è regione est, per intellum claudicat, quod si longiori tempore supprimantur menstrua, nullâmq̃ue medicus mulieri vacuationem promoueat, tumor aliquis p̃tæter naturam in inani parte interdum exoritur, ostendens nimirum ex internis partibus quâpiam esse inflammatam. Nonnullis tuberculum in extremo inanis partis excitatur, veluti viris quoque eodem in loco nonnumquam oriri solet, quod vbi suppuratum aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem, siue membrum suppuratum dissectûque vidimus, interdum ignorantibus medicis inexpertis quid inciderent, interdum verò intelligētibus quoq̃. Atq̃ omnia mēbra ita suppurata facilè curantur. Vteri verò sectiones maiori cum difficultate conglutinantur. Huiusmodi accidentia sequi
suppressa

suppressa mēstrua cōsueuerūt , ac præterea lūborum , & colli , & sincipitis dolor qui etiam oculorum fundamenta infestat .

Item febres ardentes , & vrinae nigricantes cum rubra quadam sanie , perinde ac si aque , ex qua nuper mactatae carnes ablutae fuerunt , fuliginem quis miscuisset . Quibusdam vrina , aut difficulter redditur , aut omnino supprimitur . Quum ergo horum aliquod in muliere conspexeris , vterum veluti radicem ipsorum coniicere oportet .

Quòd si per alium quempiam corporis locum sanguis effluxerit , aut inflammatio , aut erysipelas excitatur , an mēstrua purgentur interrogare debes : siquidem nihil horum accidere solet integrè purgatis .

Igitur quibus mēstruorum cohibetur purgatio , iis plerūque huiusmodi eueniunt accidētia .

QUOD mulier per suppressionem mēstruorū
 lac in mammis habeat vt Hippocr. dicit part.
 5 apho. 39. in causa est magna illa communitas ve-
 narum, quæ est mammis & vtero, coeuntibus ijs ve-
 nis, quæ per musculos rectos ventris ascendunt, cū
 descendantibus è mammis. Fit enim vt menstruis
 non erumpentibus regurgitet in mammas, illæque
 ex redundanti alimento lac generent, vt lactantes
 solent. Certè, vt alio loco diximus, difficilè admo-
 dum est primis diebus cognoscere an mulier cōce-
 perit, quia eadem omnino contingunt accidētia ijs
 quibus mēstrua retinētur, puta grauitas totius cor-
 poris, fastidium, horror, qui & appetentia quædam
 alienarum rerum, quam vocamus picam (de huius
 causa scripsi lib. 5. contr. modo nihil dicam) præter-
 quam quòd semen post concubitum ei quæ conce-
 pit non excidit, & vteri os siue duritie, aut tumore
 aliquo præter naturā astrictū est. Hoc ergo oportet
 ipsam mulierē cōsiderasse, & obstetricē tågendo os
 vteri, discere. Ita parte 5. apho. 51. scriptum est. Quæ
 vtero gerunt ijs vteri os comprimitur. Et rursum
 54. quibus os vteri durum est, ijs vteri os comprimi
 est necessarium. Inanis pars est quæ ilia vocamus.
 Vteri inflammationes solere ad coxam extra suppu-
 rari 5. etiam part. aph. 47. his verbis dixit, si vterus
 in coxam vergens suppuratur, necesse est linamen-
 tum fieri. Vteri sectiones curatu esse difficiles, intel-
 liges

liges ex sua substantia. Est N. neruea. Atqui dictum est 6. par. apho. 19. cum discissum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ particula tenuis, aut præputium, neque augetur, nec coalescit. Lumborū dolores & colli, & incipitis & febres ardentes succedere solere suppressioni mēstruorum, res est expertissima neque habet obscuram causam. Vrinæ quoque non rarò suppressi vidimus obstructis vijs renum. Tales verò reddi, quales hic describuntur, scilicet, quasi quis fuliginem dissoluerit in sanguine diluto multa nonnunquam aqua res est expertissima, atque Hippo. mulierem, quæ ad frigidam aquam in Thaso ægrotabat cum filiam peperisset, & non esset purgata, urinam toto morbo habuisse dicit nigram, tenuem & dilutam, quæ certè est quæ hic Gal. describit. Verùm hoc ne ita intellige suppressionis mēstruorum hanc esse semper urinam. nam videmus sæpe tenues & decolores, & ob debilitatem hepatis, & ob renum obstructions. Sanguinis etiam alijs vijs factum effluxum solere significare suppressionem mēstruorum, intelliges ex Hippo. part. 5. apho. 32. mulieri sanguinem euomen ti mēstruis erumpentibus solutio, & rursum, mēstruis deficientibus sanguis & naribus fluēs, bonum.

Q V V M verò immodicè vacuatur, sequitur color fædus, pedes molli tumore attolluntur, corpus totum

subtunidum est, vitiatur ciborum, tùm
 concoctio, tùm cupiditas. Atq; omnino o-
 mia, quotquot immoderatâ sanguinis va-
 cuationem, siue hæmorrhoidæ, siue alio
 quopiam sanguinis fluore eueniētem, sequi
 consueverunt, accidentia huiusmodi fæmi-
 nas infestant. Sed accidit interdum fæminis
 muliebre vocatum profluuium, vel vtero
 haudquaquam patiente, cùm videlicet vni-
 uersum corpus per ipsū expurgatur, quē-
 admodum interdum per renes quoque e-
 uacuatur. Id verò potissimum fit, si mulier
 laxis sit carnibus, & pituitosâ. Huiusmodi
 mulieres intacto quidem vtero, sed vnuer-
 so corpori adhibitis remediis sanauimus.
 Atq; id, quod excernitur, nonnunquam ru-
 ber serosus humor, siue rubra sanies est, in-
 terdum aquosâ, aut subpallida. Quod si pu-
 rus fuerit sanguis, qualis ex dissecta vena
 profluit, diligenter animaduertere oportet
 numerosio sit in vtero. Ea verò magna ex
 parte

parte in ceruice potiùs , quam alibi contingere solet, discerniturq; per excremam faciem, si fuerit profunda. Si verò circa os ceruicis constiterit , non solum per hanc, sed per tactum quoque cognosci potest. Atque pregnantibus quoque cum ora venarum in ceruice apperiantur , sanguinem excernunt.

Quod si mulieri utero graui, mammae subito extenuantur, abortus sequitur. Atq; geminos ferens, si altera mamma extenuetur, alterum amittit, & omnino si dextra mamma extenuata est, marem: si sinistra, feminam amittit. Quippe fœtus, qui mares sunt, parte uteri dextra continentur, at feminae magis sinistra. Atq; rarò aliter euenire compertum est , adeò ut in animalibus quoq; quæ suapte natura geminos ferre solent, itidem accidere videamus, ut in capris, ouibus , atque aliis quadrupedibus non paucis videre est. Si verò mulier promptè quidem conceperit, deinde secundo, aut tertio
aut

aut quarto in pragnationis mense, fatum
eiecerit, circa vteri acetabula humorem pi-
tuitosum abundare, atque idcirco venarum
arteriarumque eius loci, ad ora valorum in
vterum descendendum, nexum debiliorem
reddi coniicendum est, vt fatum ob graui-
tatem ferre nequeat, sed facile abrumpa-
tur.

S C H O L I U M.

MAGNÆ noxas sequi vtrunque menstru-
rum excessum. & suppressionem, & nimium
profluum, docet Hippo. part. 5. apho. 57. his ver-
bis si menstrua plura fiant, accidunt morbi. Atque
si non fiant, ex vtero morbi contingunt. Sanguinẽ
menstruum quibusdam gerentibus vtero profluere
experimento comperimus. Causam Gal. hic reddit
optimẽ, dicens, cum venæ in ceruice vteri appe-
riuntur. Nimirum in vterum inferuntur duplices
venæ, alie per fundum ex vena caua in lumbis, &
his productis generantur secundæ, quæ nisi disrum-
pantur non potest ex eis sanguis fluere, non potest
ergo quin abortus succedat. Aliæ sunt quæ ex ingui-
nibus recurrunt in ceruicem vteri, ex quibus
fluere potest sanguis etiam gerentibus vtero citra
aborsum, hinc fit vt cum vtero gerenti sanguis mē-
struus

*de Men-
stru-
utruy p.
22.*

struus profluit, femora doleant, non lumbi, alijs mulieribus, lumbi non femora. Quod non parum refert considerare, cùm suspitio erat conceptus, & menstrua apparent. Reliqua omnia quæ de signis abortus hic dicuntur 5. part. apho. scripta sunt dilucidè satis.

CAP. VI.

Relectiuneula.

Est cap. hoc de malis membri virilis recusat verò Gal. disputare de euacuationibus, quæ per id membrum cùm fiant aliorum morbos significant, quia de his dictum est in illorum capitibus, & de tumoribus præter naturam, & ulceribus huius membri, quia sunt hi morbi manifesti, & proinde ad hoc opus non pertinent, propterea gonorrhææ & priapismi tantum causas refert, fit gonorrhæa, id est effluuium seminis, aut præ debilitate retentricis in vasis seminarijs, aut præ affectione aliqua in illis, conuulsioni simili, priapismus fit aut flatu in pudendo genito, aut apertis osculis arteriarum, quæ in illud inferuntur, aut præ intemperie calida renum aut testiculorum, aut ipsarum arteriarum. His contraria morbo huic remedia sunt.

Quemadmodum pauca eorum, quæ per sedem excernuntur, passionis in partibus propè ipsam sunt signa, plurima

plurima verò illorum intestinorum & vē-
 tris, & splenis, & hepatis, non rarò autē &
 succorum vniuersi corporis sunt notæ. Eo-
 dem modo pauca eorum, quæ ex cole ex-
 cemuntur, propriam ipsius passionem o-
 stendunt: plurima verò vesicæ, renum,
 hepatisque & splenis, & pulmonis, & tho-
 racis, & affectionis succorum totius corpo-
 ris sunt signa. Verùm huiusmodi signa per
 alia, quæ unicuique parti patienti subserui-
 re diximus, indicia distinguuntur. Igitur pa-
 tientis colis hæc erunt indicia. Nam vlcus
 manifestè deprehenditur à dolore ipsum
 infestante, atque si aliquid ex iis per vrinas
 excernatur, quæ vlcera comitari solent. Id
 verò ab eo, quod ex vesica secernitur, ita di-
 scerni potest. Nam ipsum in primo protin-
 nus exitu apparens, vrinam præuenire cō-
 suevit: quod verò à vesica egreditur, vrinæ
 admistum videtur. Quinetiam assiduè in-
 ter meciendum mordicus dolent pudendo-
 rum

rum vlcera, præcipuè cùm vel crustula, vel sordibus solutis, pura fuerint. Sed longè euidentiùs ipsius inflammationes, ac reliquæ huiusmodi passiones, vel sine indiciis dignoscuntur. Verùm de gonorrhæa, & priapismo diffusè agere satius fuerit. Ergo gonorrhæa est seminis excretio inuita, quam inuoluntariam quoq; nominare licet. Sed significantiùs dixeris, seminis assiduam excretionem, cole haudquaquã extento. Priapismus verò est, cùm coles, & in longitudine, & circulo totus augetur, nullo stimulante ad libidinẽ aut desiderio, aut acquisititio calore, vt quibusdam accidere consuevit, qui supini decubunt. Sic enim aliqui ipsum depinxerunt. At breuiori quoq; compèdio dicere potes, permanentem colis aut augmentationem, aut tumefactionem. Deducta verò denominatio est à priapo. Nam quasi ei suapte natura huiusmodi colis esset, ita eum finxerunt, atque pictura descripserunt homines

mines, gonorrhææ autem nomē planè cōpositum est ex γονῆς quod semē genitale & ρῆν quod fluere significat, etenim semen modo γονῆ modo γόνῳ nominari solet.

Porro quemadmodum omnia corporis nostri excrementa duobus modis vacuantur, (interdum enim à continentibus ipsa corporibus excernuntur, interdum spōtè profluunt, eò quòd ob imbecillitatem ab ipsis corporibus contineri non possunt) ita de semine quoque discendum est. Nam in omnibus huiusmodi ut excernere tempestivè ita continere, naturæ officium est. Verùm secretio quidem fit aperto fluxionis meatu, ac reliquo cōceptabuli spatio & contracto, & ad appertum iam meatū quidquid continente spatio continetur, impellente. Retentio verò fit cū clausus permanet meatus, & contentum à continente haudquam impellitur, sed contrà per cōtractionem comprehenditur, & retinetur. hoc modo

do contenti in cauis instrumentis humores in his , qui integra valetudine degunt, naturaliter & excernentur, & retinentur. In illis autem , qui præter naturam se habent , retentio quidem ob excretivæ virtutis imbecillitatem , excretio verò ob retentricis facultatis infirmitatem euenit, vel ob passionem aliquam , quæ haud secus , quàm naturalis excretoria vis , partes mouere possit. Id quod in seminariis vasis videre licet, ubi aliquis vel comitiali morbo , vel conuulsione violenter irruente fuerit correptus Cæterùm videmus alias quoque partes, vt manus, aut pedes, aut digitos cõuelli, modo simul ipsis solis patientibus. Proinde haudquaquam absurdum fuerit, in seminariis vasis, & quidem solis, aliquando huiusmodi passionẽ excitari huiusmodi ea est, in qua inuita vrinæ excretio , gonorrhææ proportionẽ respondet , quæ vrinæ quam quis inuitus emittit , proportionẽ respondeat ,

Bb cum

cùm contentricem videlicet facultatem resolui contigerit. Igitur gonorrhœa instrumentorum feminis passio est, non pudendorum quæ feminis genitalis via sunt, qua excernatur. Priapismus verò planè colis est accidens. At fieri potest vt nulla præcipua, propriâque ipsum passione infestante, ad arterias referatur, vt potè quæ solæ interdum huiusmodi habeant præter naturam passionem, quali videlicet laborare consueuerunt, cùm naturalis totus coles intenditur, Atqui à spiritu in tumorem ipsum attolli manifestè patet iis, qui celeritatem eius, & cùm intumescit, & cùm interum residet, perpendunt. Quippe nullus humor tam subitam in alterutram partem mutationem efficere posset. His sic se habentibus, cùm in corporû dissectione magnæ videantur arteriæ in pudendum (exiguam scilicet particulam) irruere, sitq; coles essentia talis, qualem in nulla alia parte
videre

videre est, ut potè cuius corpus nervosum sit, ac vndiquaque fistulosum, excepta ea parte, quàm glandem vocant. Quid aliud excogitauerit quis, quam quod à vaporoso spiritu ab arteriis affluente, per extensiones in tumorem attollatur: ideoque glandem æqualem semper habere magnitudinem, quod fistulosus in ipsam nervus non ingreditur. Ergo quid causa est, cum libidinis impetu quis stimulatur, aut ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi, ut coles extendatur: nempe hac inuēta, facile priapismi quoque passionem inuenire nos posse speramus. Quod verò princeps causa sit plenitudo vel arteriarum, vel nervi fistulosi, aut etiam vtriusque, cum ex priori conditione mutantur, palam constat. At verò vtrius magis, aut si etiam amborum, deinceps consideremus, hinc sermonis nostri sumpto exordio: natura corporis partes fingens, perficiensque fecit, ut ipse citra do-

strinam, proprias actiones aggredierentur. Cuius rei exactissimum aliquando fecimus periculum, hædum alendo, sed ita alendo, ut matrem, quæ ipsum in utero gestauerat, nunquam vidisset. Quum enim prægnantes capras discecarem, dissectorum quæstionibus, quibus fætus in utero formationem speculantur, promotus inueni elegantem quendam hædum, quem à matre exolutum, ita pro meo more abstuli, ut ipsam haudquaquam videret: atque in domum quandam, ubi multæ pelues erant, deposui: quarum aliæ vini, aliæ olei, aliæ mellis, aliæ lactis, aut alterius cuiuspiam humoris erant plenæ, aderantque fructus non pauci, tum Cereales, tum ab arboribus decerpti. Hunc itaque hædum conspeximus, imprimis quidem pedibus incedentem, perinde ac si audiisset incessus gratia crura fuisse concessa: deinde excussit, quam à matre contraxe-

traxerat, humiditatem : postea pede latus
scalpere, ac deinde singula vasa olfacere
vidimus. Percepto itaque singulorum o-
dore, lac tandem absorbuit. Quibus visis
omnes exclamauimus, Hippocra. vere di-
xisse animalium naturas esse indoctas.
Sic ergo hædum hunc educando, non so-
lum lac, sed multa insuper alia, quæ for-
tè offerebantur, comesse vidimus. At
quia non longè aberat vernale æquinocti-
um, cùm eriperetur hædus à matre, exa-
ctis duobus deinde mensibus, tenellos, ei
tùm fruticum, tùm aliarum plantarum
ramulos obtuli. Quorum omnium cùm
experiretur odorem, alios quidem con-
tempnit, alios verò gustauit, atque sic ad
adultarum caprarum cibos conuersus est.
Sed hoc fortasse non adeò magnum vi-
detur. At longè maiori admiratione di-
gnum est, quod postea quam & folia, &
teneros ramulos deuorauerat, paulò post

ruminare cepit. Quòd rursus omnes quot-
 quot aderant, videntes exclamarunt, cum
 magna facultatum admiratione, quæ a-
 nimalibus natura insunt. Quamvis enim
 magnum videbatur, quod impellente fa-
 me, per os, atque dentes cibum assume-
 ret, multo tamen vehementius admira-
 ti sumus, quod cibum in ventriculo iam
 contentum, imprimis quidem ad os sub-
 leuando reduceret, deinde multò tempo-
 re mandendo hæreret, postremò rursus
 ipsum deuoraret: idque non in eundem,
 sed in alium ventriculum. Vulgares au-
 tem huiusmodi naturæ munera despici-
 unt, nihil nisi peregrina spectacula admi-
 rantes. Nam quis non miraretur quod me-
 dici in secandis corporibus peritissimi quæ-
 rere solent à qua causa articulus hic ex-
 tenditur (subiiciamus verò exempli gra-
 tia coxæ articulum) aut à qua causa incur-
 uatur, aut quid est, quod ipsum in vtram-
 que

que partem in transuersum abducit, aut quid ipsum utrôque circumuoluit, cum interim hædus singulos articulos, ad quancunque motionem libitum fuerit, possit excitare, quemadmodum homines ipsi, quamuis à quo musculo motus efficiatur non intelligant: Porro de linguæ motionem (nam hanc pro exemplo inducimus) quis non mirabitur si dissectiones inter seipsos, non solum de musculorum numero, sed de ipsorum etiam actione pugnantes viderit, cum infantes quoque quomodo vocem, aut aliud huiusmodi munus imitari debeant, natura docuerit? Quomodo etiam linguam moueant, aut quibus musculis vocem eandem efficiant? Similiter etiam de omni reliquorum animalium tum voce, tum respiratione. Atque (ut summatim dicamus) miraberis fortasse omnium quæ à voluntate, & consilio pendent, actionum instrumenta per se docta esse. De

quibus quidem actionibus, licet acris inter dissecutores fit pugna, quomodo fiant, & quibus instrumentis, nihilominus omnia animalia simul atque genita sunt, & spirant & vocem reddunt. Igitur non mirum esse debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura institutæ sunt, prorsus ab initio cognoscere. Alioqui cum uterus, cum semen genitale conceperit, donec perfectus fueris factus, exactè clausus permanet, perfecto verò fatu plurimum aperitur, ac deinde sic apertus excludit. Populares autem hæc propter crebrum euentum, & contemnunt, & despiciunt, ut potè qui nihil, quod re vera sit admirabile, sed ea duntaxat, quæ rarò vident, admirari consueuerunt. Quid enim in rerum natura potest esse admirabilius, quam quod nouem perpetuis mensibus clauditur os vteri adeò exactè ut ne specilli quidem acumen admittat: perfectò

perfectò autem fætu, vsque adeò distenditur, vt totum animal per ipsum egredi possit? Non igitur dubites puerorum facultatem per se doctam esse, vt fistulosum hoc, neruosumque corpus, vbi ad coitum insurgit, animal, à naturali facultate, quæ ipsum attollere potest, protinus distendatur. Cuius rei simile & in corde, & arteria planè videre est, nisi quòd horù motus perpetuus est, eo quòd semper necessaria sit nobis eorum actio, fistulosus verò neruus nō semper mouetur, sed cum vsus requirit.

Quum ergo sic fuerit extensus, sequitur ex arteriis spiritus, quemadmodū pulmo thoracem ob eam, quam habet ad motum ipsius, sequelam. Verū posses fortasse replentis fistulosum neruum spiritus vim, cū ad coitum irrupit animal, ad arterias quoque referre, quanquam multo fatius est, vt huiusmodi actionem ad neruum, non ad arterias referamus, cū præsertim actiones,

ex propria partium essentia, non ex earum
positu prouenire, rationi consonum sit.
Nam cor si in alia quapiam parte poneretur,
nihilominus actionem suam obtineret.
Neque aliter de iecore quoque, liene, ac reliquis
omnibus sentiendum est. Quare vniuersi corporis
arterias eandem habere actionem probabile est.
Quippe eodem tempore omnes totius animalis
arteriæ inter sese similiter distenduntur.
Itaque haudquaquã par esse videtur, vt
arteriæ pudendis innate, aliam aliquam
habeant facultatem, præter eam, quam antea
in toto corpore habebant. Sed ampliora sunt
ipsis quàm cæteris arteriis, ora: & quidẽ optimo iure,
ad celeritatem sequelæ ad id, quòd euacuatur,
sic preparata. Semper N. natura quòd vnicuique
actioni vtile est, vndiquaque explere videtur.
Cæterum nullam aliam insuper præcipuam
habent actionis facultatem, cū ad pudendum
peruenerint, licet calfactis lumbis,

lumbis, par sit, vt & arteriæ calidiores red-
dantur, & magis pateant ipsarū ora. Quā-
obrem non exiguam tunc spiritus essentiā,
in fistulosum neruum effundunt: qui pau-
latim impletus colem extendit, ita vt tota
ipsius essentia in fistuloso neruo consistere
videatur. His itaque cognitis ad priapismi
passionem veniamus. Quippe ex iis quæ su-
pra proposita sunt, constat, vel ob arteria-
rum ora immodicè dilatata, vel vaporoso
spiritum in fistuloso neruo ortū, hanc
fieri passionem. Sed vtrum potius pro cau-
sa sit habendum, inquirere oportet. Ego qui-
dem ab vtriusque ipsam fieri posse existi-
mo, crebrius tamen arteriarum ora dilata-
ta sequi. Quippe facilius est hæc distendi,
quàm flatuosum spiritum in neruo fistulo-
so generari. Ac memini me huiusmodi qui-
dem nerui passionem semel vidisse, arteria-
rum verò sæpenumero. Cuius rei coniectu-
ram feci, tū ex iis, quæ præcesserunt, acci-
dentibus,

dentibus, tùm ex modo curationis. In illo enim cui assidue colis palpitatio præcesserat, causa erat spiritus flatuosus. Ad quem cum omnem curationem conuertissem hominem sanaui. Quibus verò supra modum arteriarum ora dilatata erant, in iis nullum huiusmodi accidens præcedere solebat.

Porro accidit cuidam, vt longo tempore præter consuetudinem à concubitu abstineret, alteri verò vt mali succi alimentis, acribusque vteretur, alii etiam vt duobus mensibus præcinctus peregre proficisceretur, cum antea nunquam cingi cõsueuisset.

Coniecimus itaque arteriarum ora nimis dilatata, aliis quidem ob humorum vitia, & acrimoniam, aliis verò ob flatuosum spiritum generatum, & sine ordine, & violenter commotum. Etenim medicamenta excitandæ tentiginis vim obtinentia, tùm epota, tum etiam fæmini (quæ est inter anum, & pudendum intercapedo) lumbisque adhibita,

hibita, calida omnino, atque flatuosa sunt, quemadmodum contraria omnia, flatus discutunt, & infrigidant potius quàm cal faciant. Sed aduerte ne obiter hunc sermonem percurras. Quippe de medicamentis, non de cibis locutus sum: quoniam sunt quædam alimenta, quæ ob id, quòd plurimum feminis pariunt, impetum ad libidinem excitare possunt. Hæc ergo sermonem illum, quem nuper dicebamus, probabiliorem reddere possunt, quòd à concubitu abstinentes interdum priapismo vexari solent: siquidem accidit his, qui plurimo semine abundant, & præter consuetudinem à coitu abstinent, præsertim cum nō student ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipetur: maximè verò iis, qui à libidinis cogitatione nondum liberi evaserunt: veluti sunt quidam suapte natura cocti, qui cum longo iam tempore huiusmodi continentia sese exercuerunt libidinis imaginem

imaginem concipiunt ob spectacula, quæ
 illam mouere & ad memoriam reducere
 possunt. Nam quæ in horum hominum
 pudendis generatur passio, eorum passio-
 ni longe contraria est, qui nullo pacto libi-
 dinis cogitationis sunt obnoxii. Atque fuit
 mihi amicus quidam, cui præteream, quã
 antea habuerat, consuetudinem, omnino à
 concubitu abstinenti adeò rigidus, tumi-
 dúsque factus est penis, vt mihi accidens
 ipsum declarare cogeretur. Miror, inquit,
 quòd huic (athletam indicans) ob continen-
 tiam rugosus, collapsúsque penis euaserit,
 mihi verò, ex quo continentiam seruare stu-
 diu euenerit contrarium. Tum equidem
 illi consului, vt collectum iam genitale se-
 men excerneret, postea verò & à narratio-
 nibus & spectaculis, & meditationibus li-
 bidem suscitare potentibus, summo opere
 caueret. At vocis exercendæ studiosi, &
 athletæ qui iam inde ab initio nullam vi-
 tæ

tæ partem veneris illecebris contaminauerunt, nullam admittentes huiusmodi, vel cogitationem, vel imaginationem, iis pudenda, & exilia, & rugosa, veluti semibus, fieri consueuerunt. Nam præter ea, quæ accidere solent iis, qui protinus à prima iuuentute, immodicè libidini sese permiserunt, id etiam euenit, vt horum locorum vasa, amplius dilatata maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & coecundi cupiditas magis increseat ea videlicet ratione, quã in ceteris quoque facultatibus videre est, & quæ à Platone etiam notata est, cum inquit: ignauia quidem exoluit, proprii autem officii exercitatio, robur augere solet. Sic mammæ quoq; in iis, quæ nondū impregnatae fuerunt, cōtractæ permanent, in aliis verò à partu infantulos lactantibus, vastissimæ redduntur, atque ita magnæ permanent lac emittentes, donec puer fuerit ab lactatus. Tunc enim haud ita multo post
à lactis

â lactis generatione quiescunt. Agitur omnia hæc, si bene considerentur, ac præterea causæ, ob quas in singulis patientibus partibus, passio ipsa consistit, definiantur, non inutilem ad curationis rationem animam præbere poterunt. Atqui non est nunc tempus ea tractare. Quare adepto hoc opere finem, orationi quoque nostræ hic finem imponimus.

SCHOLIUM.

QUIDAM laborant sola gonorrhæa, quidam solo priapismo, quidam ambobus malis, qui scilicet & intentum habent membrum, & effundunt semen. Causam, qua membrum virile erigitur & tumescit, cum concitatur animal ad coitum, aut venerea cogitat, Gal. hoc loco diligenter & satis multis verbis inuestigat, tamen non videtur mihi eam satis assequi, imò ea perspecta ad deteriorem declinare. Nam inquit fit, quia membrum hoc intumescit adeò, ut dilatentur in eo fistulæ, & arteriæ, cum sit membrum neruo simile, atque dilatabile & fistulosum, illis dilatatis succedit multus spiritus, ut dilatatis follibus succedit aer. Dilatatur verò & erigitur vi quadam naturali quam dilactandi habet, vtitur

titur ea, cum subit mentio aut recordatio, aut imaginatio libidinis nullo docente, sed suapte natura, quia ad id est natura comparatum. Nimirum naturæ omnium non doctæ, vt inquit Hippo. lib. de alimento, id est, sine doctore perinde operantur, ac si essent doctæ. Itaque membrum virile perinde se erigere cum occurrit veneris imaginatio, quasi ab aliquo esset edoctum, idq; esse sui officij. Hæc docet Galenus sed vt vera loquar, videtur hoc fabulam sapere. Nam quod dicit naturas omnium sine doctore operari verum pfectò est, & Hippocrate digna sententia, tamen de hijs membris intelligi debet, quæ voluntatis imperium exequuntur, nō de ijs quæ natura operantur. Nam quamprimum ego volo proferre nomen hoc homo aut blitiri, musculi insurgunt ad motum, musculi inquam, quos moueri oportet & quousque oportet, quanquam ego ignorem quibus hæc & quo versus aut quousque motis, & quibus illa proferatur. Quamprimum volem crus circumducere aut membrum aliud vtcunque mouere, facerem, etsi quibus hic motus, aut quibus ille nunquam cogitarem. Itaq; idonea instrumenta quidquid in voluntatem aut imaginationē subiit (modo sint animalia instrumenta) incipiunt exequi. Tamen etsi ego velim multum serosi sanguinis in renes descendere illi nihilo plus trahent, nec verò arteriæ pulsabunt celerius, & si ego velim. Neque ergo si membrum virile dilataretur vi propria & suæ substantiæ natura insita, quæ naturalis esset

Cc imaginatio

imaginatio rerum venerearum faceret ad tentiginem, tamen facit. Quam itaque esse causam erectionis ego putem, iam dico. Spiritus vitales sunt instrumentum proprium animi. Quia quicumque motus animo accidat spiritus motu representatur. Non aliter ac qui manu ensẽm cepit, eum mouet vt afficitur, nimirum cùm irascitur, vibrat, cùm timet, contrahit: ita animus spiritum mouet. Perturbatur verò animus imaginatione, fitq; vt spiritus moueatur, vt imaginatio animum perturbat, vt imaginatione rei terribilis timet animus & spiritus refugit ad cordis cauernulas, imaginatione contemptus irascitur animus spiritus feruet, imaginatione aut cõsciẽtia turpitudinis pudet, & spiritu & sanguine suffunditur facies, ita imaginatione venereę voluptatis irretitur animus, & spiritus mittitur ad pudenda, influẽs ergo replet fistulosum mẽbrum, & tumescere facit. Itaque ego nõ dixerim quia membrũ intumescit succedit spiritus, sed quia influit spiritus, membrum intumescit. Quare non tantum arcẽdi sunt ægrotantes plariquẽ à concubitu, sed & à venerea imaginatione, naturam non tantum lædit seminis effusio motu vehementi, & effusione alimentĩ, sed etiã tumor mẽbri dissipatione spiritũũ vitaliũ. Erectionis mẽbri virilis hæc est causa, quę naturalis est. Tamen habet erectio etiam exiguum quiddam voluntarij quatenus iuuatur duobus musculis paruis qui in duos testiculos veniunt, & musculo illo qui per totum colem protensus est, & iuuat etiam ad mictum,

ad mictum,

ad mictum, vt fiat perpetuo vnoque impetū, & expressionē feminis. Reliqua huius capitis vera sunt & aperta satis, quare caput hoc non indiget longiore commentatione, nec verò totum hoc opus, quo nullum scripsit Gal. medicis vtilius. Facit Deus vt id cum nostris commentarijs studiosi amplectantur, posito liuore.

FINIS TOTIVS
OPERIS.

EMANVELIS PHAVORINI

MEDICI GALLI CENSURA DE

Francisco Vallesio Medico excellentissimo. Ad Hispaniam.

SAECVLA quæ mundi præsentia luminæcernunt:
 Sæcula suis præcis exulta, & sæcula quondam,
 Progeniem ingentem, serosq; datura nepotes,
 Chaldaeq; senes, tellusq; Aegyptia cæli,
 Herbarumq; potens: & magnus Græcia felix:
 Inuentus: Tyberisq; fluens per sancta Quirini,
 Mœnia, quamq; olim venerata est India diues:
 Gymnosophilæ series iam porrigat herbam,
 Vallesio, & lapsosuperati tempore manes:
 Et veteres Medicorum umbræ genyq; sepulti,
 (Siquis adhuc sensus manet immortalibus umbris):
 Vallesium agnoscant supremum numine Phœbi,
 Hic est qui seriem morborum pollice voluit:
 Paucaq; ferrati producit sæcula pensi,
 Inq; colos vacuas animos migrare paratos
 Restituit, donis superum, & medicamine lecto,
 Hic est ille: tuæ ô felix Hispania gentis:
 Rarus honos, & Laus, cui si pia numina longas,
 Concedant in luce moras miracula mundi
 Excedet, rerumq; potens super astra feretur,
 Ut Chiis ille senex cuius stetit aurea imago.

Vale.

AD LECTOREM.

Indicem hunc libri primi voces aliquot continentem, author ipse in ordinem digessit : nos verò nullum alium adscribere volumus, hac præcipuè ratione moti, quòd inexhaustæ atque infinitæ operæ fuisset, omnia notatu digna indicare: tum quòd verè affirmare possum, hos G. libros Scholiis D. Vallesii illustratos dignos esse, qui ad Litteras singulas euoluantur, ediscantur, & quotidiana lectione consignati, in sinu, atque oculis gestentur. Quisquis igitur benè volet suis studiis consultum faciliè carebit, indice ampliore: collaturus videlicet operam suam, ad relegenda singula quæ eruditionis, & antiquioris doctrinæ monumenta complectuntur.

Vale.

Cc 3

Primo libro occurrent hæc notatu digna.

Ratio huius operis	cap. 1
Passio & affectus quomodo differunt	pa. 10
Pharynx quæ particula sit	pag. 14
Glottis & epiglottis, quæ particule	eadem pag.
Caruncule renum substantiæ partes sunt	pa. 16
Cotyle & hemina quæ mensuræ sint	pag. 18
Phyma qui tumor sit	pag. 19
Panus qui tumor sit	pag. 19. eodem loco
Sanguis arteriarum an biliosus cum sit tenuis & calidus & flavus	pag. 21
Fungus quid sit	pag. 23
ὀφελῆς quid sit eodem loco.	pag. 23
Dilatatio musculi non est actio sed otium	pag. 27
Musculus vesicæ an ferietur inter meiendum	pag. 28
Expultrice excrementorum facultate qua ratione quædam membrorum careant	pag. 29
Sensus resolutio suppressæ vrinæ causa est	pag. 29
Convulsio est suppressæ vrine causa	pag. 34
Lapis vesicæ pueris est familiaris	pag. 35
Obstructio quomodo afferat vrinæ tenuitatē	pa. 35
Lapide vesicæ laborantibus cur pudendum semper aut la- xum nimis aut intentum	pag. 35
Femen quæ particula sit	pag. 45
Coniectura artificiosa quæ sit	eadem pag. 43
Syndromes signorum morbos indicant	pag. 44
Actio & vsus quomodo differant	eodem loco, pag. 44
Propriæ passionis definitio	pa. 40. & 45

